



وزارة التربية

الرياضيات

الصف العاشر
الفصل الدراسي الثاني

كتاب المعلم

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيات

أ. إبراهيم حسين القحطان (رئيساً)

أ. فتحية محمود أبو زور

أ. حصة يونس محمد علي

الطبعة الثانية

١٤٣٦ - ١٤٣٥ هـ

٢٠١٥ - ٢٠١٤ م

فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الرياضيات للصف العاشر

أ. رضيّة ناصرقطان (رئيساً)

أ. نجوى محمد وسيم

أ. السعيد فوزي إبراهيم

أ. منيرة علي العدوانى

أ. مجدي محمد الكواوى

دار التَّرَبِّيَّون House of Education ش.م.م. وبيرسون إديوكيشن ٢٠١٢

◎ جَمِيعُ الْحَقُوقِ مَحْفُوظَةً : لَا يَجُوزُ نُشُرُ أَيِّ جُزْءٍ مِّنْ هَذَا الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرِهِ أَوْ تَخْزِينِهِ أَوْ تَسْجِيلِهِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ دُونَ مُوَافَقَةِ خَطِيَّةٍ مِّنَ النَّاشرِ .

الطبعة الأولى ٢٠١٢ م

الطبعة الثانية ٢٠١٤ م



صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت



سَيِّدُ الْشَّيْخِ نَفَافُ لِلْحَمَادِ الْجَبَرِ الصَّابِحِ

وَلِيُّ عَهْدِ دُولَةِ الْكُوَيْتِ

مقدمة من كتاب المعلم

توجيهات عامة للمعلم

هذه السلسلة تعمل على تنمية أساليب التفكير، وذلك بتركيزها على بناء المفاهيم الرياضية وربطها بالواقع الحياتي من خلال:

- الأنشطة العملية في استكشاف المفاهيم ودعم إحساس الطالب بهذه المفاهيم، وذلك باستخدام عدّة طرائق مختلفة: العمل في فريق.

عمل مجالات رياضية.

استخدام المحسوسات وشبه المحسوسات.

التعبير الشفهي (التواصل) - التفكير الناقد.

الاعتماد على المصوّرات، وذلك من خلال التمثيل البياني للمعلومات وقراءة البيانات الممثلة بيانياً.

الاعتماد على المواقف والقصص الحياتية وربطها بالموضوعات، وكذلك توظيف الموضوعات الرياضية في حل المسائل الحياتية.

التأكد على فهم المفاهيم واستيعابها، والربط بين الرياضيات وباقى المواد.

تطبيق السلسلة

لتطبيق السلسلة، يجب مراعاة ما يلي:

وجود ملفين لكلّ تلميذ بحيث يُخصص أحدهما للأنشطة الصفيّة واللاصفيّة، أمّا الآخر فيُخصص للاختبارات والملحوظات الميدانية على أداء الطالب، ويدوّنها المعلم، وهذا أولّ ما يقوم به، مقرّوناً بتواريخ المتابعة.
يُنّوّع المعلم في طرائق التدريس، وخاصةً التي تشمل الاستكشاف وحلّ المشكلات.

نماذج المعلم لتقييم الطلاب تشمل:

- تقييم الأداء في حل المسائل.
- التقييم المستمر في حل المسائل والملاحظة والتعليم التعاوني.
- التقييم الفردي في الملاحظة والمراقبة.
- التقييم العام للطالب.

تقييم الأداء في حل المسائل

الاسم التاريخ

تقييم الأداء في حل المسائل

١ ضع إشارة قرب العبارة التي تصف بدقة أداء الطالب.

فهم

- يقرأ المسألة بتأنّ.
- يقرأ أيّ جدول أو أيّ تمثيل بياني.
- يستطيع أن يصوغ المسألة من جديد وبطريقته وعباراته الخاصة.
- يستطيع فهم وإدراك المعلومات المعطاة.
- يستطيع فهم وإدراك السؤال الذي يجب الإجابة عليه.

خطّ

- يختار الخطّة الأنسب لحل المسألة.
- يقدّر الإجابة الصحيحة.

حلّ

- يعمل وفقاً لمنهجية معينة.
- يعرض الحلّ بطريقة منظمة وسليمة.
- يحسّب بطريقة صحيحة.
- يعطي الإجابة بجملة كاملة صحيحة، مراعياً الوحدات.

راجع ولاحظ

- يُلاحتُ معقولة الإجابة.
- يجرّب طرقاً أخرى لحل المسألة.

٢ اتبع الموصفات التالية لتقييم أداء الطالب:

مستوى ٤ (يتقن الطالب ١١-١٣ من المهامات السابق ذكرها). يُظهر الطالب فهماً عميقاً للمسألة ويفسّرها بشكل موجز وواضح ويكون قادرًا على ربط المسألة بعمل سبق أن أنججزه.

مستوى ٢ (يتقن الطالب ٨-١٠ من المهامات السابق ذكرها). يفهم الطالب المسألة ويعرض الحل الصحيح بطريقة منظمة وواضحة.

مستوى ٢ (يتقن الطالب ٤-٧ من المهامات السابق ذكرها). يُظهر الطالب فهماً إجماليًا للمسألة غير أنه قد يرتكب بعض الأخطاء في تفاصيل معينة.

مستوى ١ (يتقن الطالب ٠-٣ فقط من المهامات السابق ذكرها). لا يُظهر الطالب إلا فهماً سطحيًا أو جزئيًا للمسألة وهو ليس قادرًا على إتمام العمل المطلوب أو حتى اعتماد المنهجية الصحيحة، كما أنه لا يعطي إجابة صحيحة أو تكون خطّته غير مناسبة، وفي أغلب الأحيان لا نجد حلاً ولا تجاويبًا مناسباً أو إجابة صحيحة مرفقة بجهد ما.

التقييم المستمر: حل المسائل

التّارِيخ

قدر كلّ بند به:

التقييم المستمر: الملاحظة

التّاريـخ

فقر كل بند به:	
+ إذا كان ممتازاً	<input type="checkbox"/>
✓ إذا كان مقبولاً	<input checked="" type="checkbox"/>
- بحاجة للتطوير	<input type="checkbox"/>
غ.ت غير قابل للتطبيق	<input type="checkbox"/>
.	<input type="checkbox"/>
. ١	<input type="checkbox"/>
. ٢	<input type="checkbox"/>
. ٣	<input type="checkbox"/>
. ٤	<input type="checkbox"/>
. ٥	<input type="checkbox"/>
. ٦	<input type="checkbox"/>
. ٧	<input type="checkbox"/>
. ٨	<input type="checkbox"/>
. ٩	<input type="checkbox"/>
. ١٠	<input type="checkbox"/>
. ١١	<input type="checkbox"/>
. ١٢	<input type="checkbox"/>
. ١٣	<input type="checkbox"/>
. ١٤	<input type="checkbox"/>
. ١٥	<input type="checkbox"/>
. ١٦	<input type="checkbox"/>
. ١٧	<input type="checkbox"/>
. ١٨	<input type="checkbox"/>
. ١٩	<input type="checkbox"/>
. ٢٠	<input type="checkbox"/>
. ٢١	<input type="checkbox"/>
. ٢٢	<input type="checkbox"/>
. ٢٣	<input type="checkbox"/>
. ٢٤	<input type="checkbox"/>
. ٢٥	<input type="checkbox"/>
. ٢٦	<input type="checkbox"/>
. ٢٧	<input type="checkbox"/>
. ٢٨	<input type="checkbox"/>

التقييم المستمر: التعلم التعاوني

التّارِيخ

فقر كل بند به:	
+ إذا كان ممتازاً	<input type="checkbox"/>
✓ إذا كان مقبولاً	<input checked="" type="checkbox"/>
- بحاجة للتطوير	<input type="checkbox"/>
غ. ت غير قابل للتطبيق	<input type="checkbox"/>
. ١	
. ٢	
. ٣	
. ٤	
. ٥	
. ٦	
. ٧	
. ٨	
. ٩	
. ١٠	
. ١١	
. ١٢	
. ١٣	
. ١٤	
. ١٥	
. ١٦	
. ١٧	
. ١٨	
. ١٩	
. ٢٠	
. ٢١	
. ٢٢	
. ٢٣	
. ٢٤	
. ٢٥	
. ٢٦	
. ٢٧	
. ٢٨	

المحتويات

الوحدة السادسة: هندسة الدائرة.....	١٣
الوحدة السابعة: المصفوفات.....	٤٣
الوحدة الثامنة: حساب المثلثات (٢).....	٧٦
الوحدة التاسعة: الهندسة التحليلية.....	٩٩
الوحدة العاشرة: الإحصاء والاحتمال.....	١٣٠

Geometry of a Circle

الوحدة السادسة: هندسة الدائرة

قسمت الدروس في هذه الوحدة إلى أجزاء.

٦ - ١ (أ) : الدائرة، ٦ - ١ (ب) : ماس الدائرة

جزء ١ : العلاقة بين الماس ونصف قطر الدائرة.

جزء ٢ : العلاقة بين ماسين من نقطة واحدة خارج الدائرة.

٦ - ٢ : الأوتار والأقواس

جزء ١ : العلاقة بين الأوتار المتطابقة والأقواس المقابلة لها والزوايا المركزية.

جزء ٢ : خصائص الخطوط المستقيمة التي تمر في مركز الدائرة.

٦ - ٣ : الزوايا المركزية والزوايا المحيطية

جزء ١ : الزوايا المركزية - الزوايا المحيطية - الزوايا المماسية على الدائرة.

جزء ٢ : العلاقة بين قياس الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس نفسه.

جزء ٣ : العلاقة بين قياس الزاوية المماسية وقياس القوس المحصور بين ضلعيها.

٦ - ٤ : الدائرة: الأوتار المتقطعة، الماس

جزء ١ : الأوتار المتقطعة.

جزء ٢ : الماس.

جزء ٣ : العلاقة بين وترتين متقطعتين في الدائرة .

جزء ٤ : العلاقة بين طول القطعة المماسية المحصورة بين نقطة خارج الدائرة ونقطة الماس والقاطع على الدائرة.

مقدمة الوحدة

الوحدة السادسة

هندسة الدائرة

Geometry of a Circle

مشروع الوحدة: أهمية الدائرة في تصميم الزينة والزخارف الهندسية
المقدمة: منذ قرون عديدة، استخدم الفنانون سطحة الدائرة ورونقها في التزيين، بعضهم صنع أحشاماً في الدائرة مستعيناً من عدم وجود بدایة لها أو نهاية، وبضمهم الآخر استفاد من كثرة خطوط النهايات فيها لفتح خطاماً بصرية.

الهدف: ابحث عن بعض التقنيات المستخدمة خلال المصور الماضية لإنتاج الفن الدائري عندما استخدم الفنانون الدائرة كأداة لبلوغ أهدافهم في التزيين.

اللوازم: أوراق رس، شبكة مربعات، أقلام تلوين، قلم، فرجار.

أسئلة حول التطبيق:

١. عن نقطة الأصل على شبكة مربعات (دون رسم المحاور).

٢. ارسم ٤ دوائر مركزها (٥، ٥)، (٥، ٥)، (٥، ٥)، (٥، ٥) بنصف قطر يساوي ٢٧٥. مستخدماً المراكز نفسها.

٣. ارسم ٤ دوائر ينصف قطر يساوي ٢٧٤.

٤. صل بين المراكز الأربع لتشكل مربعاً ولوّنه بالأخضر.
صل بين نقاط تقاطع الدوائر الكبيرة والدوائر الصغرى ولوّن الشكل بالأحمر. امح الأقواس، ولوّن تصميمك.

٥. اتبع الخطوات التالية لتصميم نمط من الفن الإسلامي من القرن الرابع عشر.



الخطوة ١: اجمع هذه المربعين على مراكز الدائرة.

الخطوة ٢: ارسم مربع يحيط بالدوائر.

الخطوة ٣: ارسم في كل المربعات المراكز الأربع.

الخطوة ٤: ارسم دائرة ورميًّا رؤوسه على الدائرة، ثم ارسم قطره.

الخطوة ٥: ارسم الشكل الناتج من دوائر المربع رباعية، حول مركز الدائرة.

التقرير: ضع تقريراً مفصلاً حول تنفيذ المشروع مستعيناً من دروس الوحدة، وأعرض تصاميم التي حصلت عليها.

دروس الوحدة					
الدائرة الابتدائية	الدائرة المركزية	الزوايا المحطة	الأوتوهات والأقواس	مساس الدائرة	الدائرة
المنقطة، المساس	والزوايا المحطة		ـ ٦	ـ ٦	ـ ٦

١٠

مركزها نقطة تلاقى منصفات الزوايا الداخلية للمثلث.

(ب) الدائرة الخارجية الماسة لمثلث:

Escribed Circle of a triangle

هي دائرة تمس أحد أضلاع المثلث من الخارج وتتمس امتداد الضلعين الآخرين لهذا المثلث، ويكون مركزها نقطة تلاقى منصف زاوية داخلية بمنصف زاويتين خارجيتين الآخرين في المثلث.

ملاحظة: لكل مثلث ثلات دوائر خارجية ماسة.

دائرة النقاط التسع أو دائرة أولير: Euler's Circle

هي دائرة مميزة في المثلث تعود إلى عالم الرياضيات أولير (Euler) حيث إنها تمر من خلال تسعة نقاط مميزة في المثلث، تقع ست نقاط منها على المثلث (إذا لم يكن منفرج الزاوية) والنقط التسع موزعة كما يلي:



- ثلات نقاط، كل منها متتصف بصلع من أضلاع المثلث.

- ثلات نقاط، كل منها نقطة تقاطع ارتفاع المرسوم من رأس المثلث بالضلع المقابل.

- ثلات نقاط، كل منها متتصف بقطعة المستقيمة التي تصل رأس المثلث ب نقطة تقاطع ارتفاعات المثلث.

تعتبر الدائرة واحدة من أهم الأشكال الهندسية التي أعطاها علماء الرياضيات اهتماماً خاصاً، وبنوا عليها مسائل مهمة، وتوسعوا كثيراً في خصائصها ومميزاتها. ثم أكمل المهندسون المعماريون والفنانون وأخصائيو التصميم العمل مع الدائرة، فجاءت إبداعاتهم قبلاً نصف كروية تعلو سطوح القصور الكبيرة، وأقواساً تعلو الشبابيك والأبواب، وسطوحاً دائرية تعلو أيضاً الشبابيك والأبواب وأبراج القلاع إلى جانب ما نراه في تصاميم الزينة والرسوم والفنون كلها. والأهم من ذلك هو ما شغل علماء الرياضيات في العلاقة بين المضلعات والدائرة، فكانت الدائرة المحاطة بالمضلع والدائرة المحاطة بمضلع. فمثلاً، يوجد رباعي دائري ورباعي غير دائري، خماسي دائري وخماسي غير دائري، سداسي دائري وسداسي غير دائري ...

دائرة خارجية ماسة للمثلث



الدائرة الداخلية والدوائر الخارجية لمثلث.

(أ) الدائرة الداخلية لمثلث أو الدائرة المحاطة بمثلث:

Inscribed Circle of a triangle


هي أكبر دائرة تمس أضلاع المثلث من داخله، ويكون

مشروع الوحدة

أسئلة حول التطبيق:

شجع الطلاب على إجراء أبحاث تتناول الرسوم وتصاميم الزينة والمهندسة المعمارية (أبراج وقصور وجامع وكنائس ...)، وعرض هذه الابحاث، ثم التركيز على دور الدوائر وأنصاف الدوائر والأقواس من الدوائر.

إجابات «أسئلة حول التطبيق»



أضف إلى معلوماتك

الوحدة السادسة

ابن إنت الـ (المعرف السابقة المكتسبة)

- تعلمت إيجاد محيط دائرة ومساحتها.
- تعلمت إثبات تطابق المثلثات وخصائص العناصر المستنيرة وتشابه المثلثات ويعنى القطع المموجة في المثلث.

تتميز الأنوار المتقاطعة عند نقطة داخل الدائرة أو خارج الدائرة بعلاقة محددة تربط بين أطوال أجزاءها، يمكن إيجاد هذه العلاقات باستخدام ما تعلمه سابقاً عن المثلثات المتطابقة والمثلثات المشابهة، المعنى الذي سوف تكتسبها من هذه العلاقة لها تطبيقات عملية في الصوير، والهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، والصور المتحركة.

ماذا سوف تتعلم؟

- سوف تستخدم العلاقة بين المماس ونصف قطر الدائرة المار بخطة التمساح لحل المسائل.
- سوف تستخدم العلاقة بين مماسين من نقطة واحدة في حل مسائل حياتية.
- سوف تستخدم الأنوار المتقاطعة وألقيات الزوايا المركزية لحل مسائل في الدائرة.
- سوف تعرف خصائص المستقيمات والقطع المستقيمة التي تمر بمركز الدائرة والتي لا تمر بمركز الدائرة.
- سوف تعرف العلاقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحاطية المشرطة في القوس نفسه.
- سوف تعرف العلاقة بين الزاوية المعاكسية والقوس الممحض بين ضلعيها.
- سوف تعرف العلاقة ما بين الزاوية المعاكسية والزاوية المحاطية والقوس الم المشترك بينهما.
- سوف تعرف العلاقة بين قطرين متقاطعين في الدائرة والملاعة بين طول المماس وطول القطع.
- سوف تعرف خصائص الشكل الرباعي الدائري.

المصطلحات الأساسية

مماس الدائرة - أوتار - أقواس - زاوية مركزية - زاوية محاطية - أنوار متقاطعة - القاطع - رباعي دائري - زاويتان متقابلان - زاويتان متكاملتان.

١١

تحقق من عمل الطالب

سلم التقييم

٤. الرسم دقيقة. الألوان معبرة ومتناسبة. القياسات صحيحة. التقرير واضح.
٣. معظم الرسم دقيق. الألوان معبرة ومتناسبة إلى حد ما. أخطاء قليلة في القياسات. التقرير مقبول.
٢. بعض الرسم دقيق. الألوان باهتة ومتناسبة إلى حد ما. أخطاء عديدة في القياسات. التقرير بحاجة إلى تعديلات.
١. معظم عناصر المشروع ناقصة وبحاجة إلى إعادة.

٦-١: (٤) الدائرة

(ب) مماس الدائرة

الدائرة
The Circle


(١-١)

هل تعلم؟

عرفت الدائرة منذ القدم. استخدم الأقدمون الدوّاب والأسطوانة لضخ المياه وطحون الحبوب ودرجية الأشياء الثقيلة. في مصر الفرعونية سألة تربيع الدائرة، أي إنشاء مربع مساحته تساوي مساحة دائرة معطاة، حتى أثمن أثرياؤها أكثاراً حول حل هذه المسألة.

شغلت هذه المسألة الباحثين في الرياضيات لمدة طويلة حتى العام ١٨٨٢ عندما أثبت العالم الرياضي الألماني فريدريان فون ليندeman استحالة هذا الإنشاء.

هل يمكن أن تساوى
مساحات الربيع والدائرة
مع مساحات الربيع
المحمراء؟




تعريف الدائرة

الدائرة هي مجموعة نقاط المستوى التي تبعد كل منها عن نقطة ثابتة في المستوى بمسافة ثابتة.

تسمى النقطة الثابتة **مركز الدائرة** ويسمى بعد الثابت طول نصف

القطر ويرمز إليه عادة بالرمز **ق**.



نظريه (١)

كل ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة تمر بها دائرة واحدة.

١٢

١ الأهداف

- يرسم ماساً من نقطة موجودة على الدائرة.
- يوجد العلاقة بين الماس ونصف قطر الدائرة المار ببنقطة التمسك ويستخدمها في حل المسائل.
- يوجد العلاقة بين ماسين من نقطة خارج الدائرة ويستخدمها في حل المسائل.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

ماس للدائرة - شعاع ماس - قطعة ماسية - نقطة التمسك - نصف قطر التمسك.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة - فرجار - منقلة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show)

٤ التمهيد

أسأل الطالب:

- كيف تُعرّف الدائرة؟ قطرها؟ نصف قطرها؟
- هل المثلث $\triangle ABC$ ، حيث $AB = 24$ سم
- $BC = 7$ سم، $AC = 25$ سم هو قائم الزاوية؟
- ما مجموع قياس الزوايا في الشكل الرباعي؟
- ما منصف الزاوية؟
- ما خاصية نقطة تقاطع منصفات الزوايا الداخلية في المثلث؟

٥ التدريس

وضّح للطلاب من خلال عملية الانسحاب مستخدماً مثلاً خشبياً (أو بلاستيكياً) قائم الرواية كيف أن نصف قطر الدائرة يكون متعمداً مع المستقيم الذي هو ماس عند نقطة موجودة على الدائرة (نظريه ٢).

أخبرهم أن هذا ليس برهاناً علمياً ولكن يعطي فكرة عن هذه العلاقة بين الماس ونصف القطر في نقطة تقاطعهما على الدائرة. أكد لهم أن البرهان في النظرية (٢) يعتمد على افتراض معكوس ما هو مطلوب إيجاده «البرهان غير المباشر» (Indirect Proof). وهو كما يلي:



مثال (١): علم الآثار: وجد عالم آثار قطعاً صغيراً من جرة خزفية بالإضافة إلى قطعة كبيرة دائرة الشكل من نوع الجرة، كيف تستطيع مساعدة العالم ترميم الجرة، وذلك بإيجاد مركز وطول نصف قطر القطعة الدائرية الكبيرة؟

الحل:

المعطيات: جزء من فوهة الجرة الدائرية.

المطلوب: إيجاد مركز الدائرة وطول نصف قطرها.

العمل: تأخذ نقاط A , B , C على قوس الدائرة المرسومة والتي تمثل جزءاً من فوهة الجرة.

نرسم محوراً لكل من AB , BC , CA اللذان يتقاطعان في نقطة.


البرهان: ... ولـ محور AB

... وـ محور BC


... وـ محور CA

من (١), (٢) تستنتج أن النقطة وهي مركز الدائرة.

... طول $\frac{1}{2}AB =$ طول نصف قطر الدائرة.



١) استخدم المفهوم السابق في مثال (١) لإثبات برهان نظرية (١) وتحديد مركز الدائرة المحضية بثلاث قائم الزاوية.



استنتاج

في الشكل المقابل، $AP \perp AB$ وجـ $BP \perp BC$.

يفرض أن المستقيم AP يمر بالنقطة A عمودياً على AB .

يصبح مجموع قياسات زوايا $\angle A + \angle B$ أكبر من 180° (١) $(\angle A + \angle B) > 180^\circ$.

وهذا يتناقض مع النظرية: مجموع قياسات زوايا المثلث = 180° .

.. \therefore أحد أليس عمودياً على AB .

استنتاج ١: من نقطة خارج مستقيم يوجد مستقيمتان وتحتاج بهذه النقطة عمودي على المستقيم المعلوم.

لاحظ أنه في $\triangle ABC$ ، $AP \perp AB$ لأنها كان موضع النقطة A على المستقيم BC (لا تتطابق على BC).

استنتاج ٢: أقصر بدد بين نقطة ومستقيم هو بعد المضendi.

كلما ابتعدت جـ عن على المستقيم أصبح طول AP أكبر.

١٣


١-١(ب)

مماض الدائرة Tangent of the Circle

سوف تتعلم

- استخدام العلاقة بين الماس ونصف قطر الدائرة المار ب نقطة الماس
- استخدام العلاقة بين ماسين من نقطة واحدة خارج الدائرة

عمر تعلمي



عمل تعلمي

الماس للدائرة هو مستقيم في المستوى ينطاط مع الدائرة في نقطة واحدة.
نقطة القطع تسمى **نقطة التمسك**.
أو ماس.
أو شعاع ماس.
أو خط مماسية
أو نصف قطر الماس

نظرة (٢)

الماس عمودي على نصف قطر التمسك.
إذا كان ماساً للدائرة، فإنه يكون متعمداً مع نصف القطر المار بنقطة الماس.
أي أن $\angle D = 90^\circ$.

١٤

المعطى: دائرة مركزها و، المستقيم N مماس للدائرة في S ،
و نصف قطر التمسك.

المطلوب: إثبات أن
المستقيم $N \perp W$
البرهان:

الخطوة ١: لنفرض العكس،
أي أن المستقيم N ليس متعمداً
مع W .

سوف ثبت أن هذا الافتراض يوصلنا إلى تناقض.

الخطوة ٢: إذا لم تكن W متعمداً مع المستقيم N ، فإنه توجد قطعة مستقيمة أخرى متعمداً مع المستقيم N .

ولتكن O ، تقطع الدائرة في S ، أي أن $O(N) = 90^\circ$

$$\therefore O = OS + SN = W + SN$$

$\therefore O < W$

ولكن W وتر للمثلث O قائم الزاوية L وهذا ينافق الفرض.

الخطوة ٣: الافتراض أن المستقيم N ليس متعمداً مع W هو افتراض خطأ. وبالتالي فإن المستقيم $N \perp W$ صحيح.

في المثال (٢)، إذا تحركت M في المستوى بحيث $M = \text{ثابت}$ ،
فإن قياس الزاوية M ثابت لا يتغير.

في المثال (٣)، ساعد الطالب على فهم الخطوط المستقيمة الإضافية في الرسم، والتي استخدمت لإيجاد الحل.

أ ماس مشترك للدائرتين، DAB هو مستطيل.

شجع الطالب على التعامل دائمًا بموضوعية مع الإنشاءات الهندسية باستخدام المسطرة والفرجار لما لها من أهمية في دقة أعمالهم مستقبلاً.

أسأل الطالب: ما عدد الماسات على دائرة ما والتي تمر في نقطة معينة؟

ساعدهم على الوصول إلى فكرة أن عدد الماسات مرتبط بموقع النقطة بالنسبة إلى الدائرة.

إذا كانت النقطة داخل الدائرة فلا ماسات ممكنة، بينما إذا كانت النقطة على الدائرة فهناك ماس واحد، ولكن يمكن رسم ماسين للدائرة من نقطة خارج الدائرة. دعم ذلك برسوم على السبورة.

مثال (٢)

في الشكل المقابل M ، M ماسان للدائرة التي مركزها O .
أوجد قياس الزاوية LMN .

الحل:

المعطيات: M ، M ماسان للدائرة التي مركزها O .

المطلوب: إيجاد قياس الزاوية LMN .

البرهان:

M ماس

ولنصف قطر الماس

$\therefore N(M) = 90^\circ$

وبالمثل: $N(M) = 90^\circ$

L و N وinkel ينافي

$\therefore N(L) + N(M) + N(N) = 360^\circ$

بالتعويض

بالتبسيط

$\therefore N(L) + 90^\circ + 90^\circ = 360^\circ$

$\therefore N(L) = 180^\circ - 180^\circ = 0^\circ$

$\therefore N(L) = 0^\circ$

$\therefore N(L) = 0^\circ$

$\therefore N(L) = 0^\circ$

حاول أن تحل

في الشكل المقابل، M ماس للدائرة التي مركزها O .
أوجد قيمة M .

مثال (٣)

تطبيق حياتي

يمثل المخطط إداري المراجع.

أوجد درجة المسافة بين محوري هذين الإطارات.

إذا كان $A = 32^\circ$ سم، $B = 40^\circ$ سم، $C = 96^\circ$ سم.



١٥

قبل البدء بالمثال (٤) ناقش مع الطالب طريقة الحل في النظرية (٣) حيث تعتمد على افتراض أنه يوجد زاويتان قائمتان في مثلث واحد وهذا خطأ.

لإثبات النظرية (٣) سنفرض وجود نقطتي تقاطع بين المستقيم m والدائرة التي مركزها O ثم نبرهن أن النقطتين منطبقتان. المعطى: المستقيم m متواز مع وج، النقطة J تنتمي إلى الدائرة. المطلوب: إثبات أن المستقيم m مماس للدائرة.


البرهان: لنفرض وجود نقطتي تقاطع J, G بين المستقيم m والدائرة (J نقطة على المستقيم).

المثلثان JOG و JGD فيه زاويتان قائمتان في J .

$\angle J = \angle G = 90^\circ$


هذا لا يمكن إلا إذا انطبقت G على J ومنه المستقيم m يقطع الدائرة في نقطة واحدة.
 \therefore المستقيم m مماس للدائرة.

في المثال (٤)، قد يطرح بعض الطالب فكرة استخدام مثلث خشبي (قائم الزاوية) للتحقق من أن m مماس للدائرة. أشر إلى أن هذه الطريقة غير مناسبة إذا كان قياس الزاوية قريباً من 90° .




تحقق: في كل من الطريتين، أثبت أن AB مماس للدائرة.

١٧



٩




١٦

١٨

في المثال (٦)، اطلب إليهم إيجاد العلاقة بين نصف قطر الدائرة وطول ضلع المثلث في حالة مثلث متطابق الأضلاع. مثلاً:

$$\text{مساحة المثلث } \frac{1}{2} \times ب \times ج = \frac{1}{2} \times ب \times نه + \frac{1}{2} \times ج \times نه$$

مساحة (BGM)



$$\text{مساحة المثلث } = \frac{1}{2} \times ب \times نه + \frac{1}{2} \times ج \times نه$$

$$\text{مساحة المثلث } = \frac{1}{2} \times نه \times محـيط \quad BGM$$


وفي حالة المثلث المتطابق الأضلاع الذي طول ضلعين له

$$\text{مساحة المثلث } = \frac{1}{2} \times ل^2 \times \frac{1}{3}\sqrt{7}$$


$$\text{أيضاً مساحة المثلث } = \frac{1}{2} \times نه \times 3l \text{ ومنه } نه = \frac{l}{\sqrt{7}}$$

١٩


في التمرين (٧)، يحيط المضلع بدائرة، أوجد محيط المضلع.





في التمرين (٨)، بـ جـ مسامـسـ لـ دائـرـةـ، أـوـجـ مـحـيطـ



* (٩) التحدي: بين الشكل المقابلين مترافقـاـ، بـ جـ مـساـسـ لـ دائـرـةـ، أـوـجـ مـحـيطـ



* (١٠) التحدي: بـ جـ مـساـسـ لـ دائـرـةـ التي مـرـكـزـهاـ، بـ جـ مـساـسـ لـ دائـرـةـ التي مـرـكـزـهاـ، أـثـبـتـ أنـ تـ، تـ، //ـ لـ، لـ.



* (١١) التحدي: بـ دـ ظـنـ الدـائـرـةـ التي مـرـكـزـهاـ، بـ جـ مـساـسـ لـ دائـرـةـ، أـوـجـ طـولـ نـصـفـ قـطـرـ الدـائـرـةـ.

(أ) أـوـجـ مـسـاحـةـ المـثـلـثـ بـ كـ دـ.

(ب) أـوـجـ مـسـاحـةـ المـثـلـثـ بـ كـ دـ.

١٠

مثال (٤)

في الشكل المقابل، $N = L = 7$ سم، $L = M = 24$ سم، $M = N = 25$ سم.
أثبت أن $\triangle NLM$ مسامـسـ لـ دائـرـةـ التي مـرـكـزـهاـ.

الحل:

المطلوب: إثبات أن $\triangle NLM$ مسامـسـ لـ دائـرـةـ التي مـرـكـزـهاـ.

البرهان: باستخدام عكس نظرية فيتاغورث

$$(N-L)^2 = (M-L)^2 + (M-N)^2$$

$$225 = 225$$

نـسـتـتجـ أنـ المـثـلـثـ مـلـ نـ قـائمـ فيـ لـ.

$$\therefore M-L=L-N$$

$\therefore NLM$ مـسـامـسـ لـ دائـرـةـ فيـ النـقطـةـ لـ.

نظرية

حاـلـ أـنـ تـحلـ

٤) في الشكل المقابل، إذا كان $N = L = M = 7$ سم، $N = M = 8$ سم.
نهـلـ مـلـ مـسـامـسـ لـ دائـرـةـ؟ فـئـرـ إـجـابـتكـ.

مثال (٥)

في الشكل المقابل، $D = E = F = 5$ سم، D, E, F أـنـصـافـ دـوـاـرـاتـ أـنـظـلـارـهاـ عـلـىـ التـرـيـبـ.

الحل:

حدد المسامـسـ لأـنـصـافـ الدـوـاـرـاتـ، وـفـيـرـ إـجـابـتكـ

المطلوب: D, E, F أـنـصـافـ دـوـاـرـاتـ أـنـظـلـارـهاـ عـلـىـ التـرـيـبـ.

الحل:

المطلوب: D, E, F أـنـصـافـ دـوـاـرـاتـ أـنـظـلـارـهاـ عـلـىـ التـرـيـبـ.

الحل:

تحديد المسامـسـ لأـنـصـافـ الدـوـاـرـاتـ معـ تـسـهـيلـ الـإـجـابـةـ.

١٨

١٩

٦. الربط

انظر المثلين (٣) ، (٨) فهما يؤكdan العلاقة والربط بين الدوائر وعجلات الدرجة.

في المثلين أعلاه، لا تتقاطع الدائيرتان بينما في حالات أخرى تتقاطع الدائيرتان (مثل التروس) وفي هذه الحالة تكون المسافة بين مراكز الدائيرتين أصغر من مجموع طولي نصف قطر القطر.

٧. أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يعتقد بعض الطلاب بأنه يمكن إيجاد أكثر من مماس من نقطة على الدائرة.

اشرح لهم أن من نقطة على مستقيم يوجد مستقيم عمودي واحد فقط على هذا المستقيم. وبالتالي لا يوجد إلا مماس واحد من نقطة موجودة على الدائرة.

٨. التقسيم

(أ) تابع الطلاب وهم يتعاملون مع فقرات «حاول أن تحل» كونها تعطيك فكرة واضحة عن مدى استيعابهم المفاهيم والمهارات في هذا الدرس.

مثال (٦)

محيط المثلث = $أ + ب + ج + ج = 66$
 $= أ + ب + ب + ل + ج + ج + ج + ل = 66 = 15 + 10 + 8 + 15 = 48$
 محيط المثلث = 66 سم.

حاول أن تحل

في الشكل المقابل إذا كان محيط المثلث $أ + ب + ج = 50$ سم،
 فماجد طول $ب$ جـ.

نتائج النظرية

١- $ب$ أخذ متطابق الضلعين من النظرية السابقة.
 ٢- $ب$ ونصف الزاوية $أ + ج$
 ٣- $ب$ ونصف الزاوية $ج + ج$
 ٤- $ب$ وـ $أ + ج$

مثال (٧)

في الشكل المقابل، أوجد $ن$ (أو $ج$) ، $ن$ (أو $ج$) .
 إذا كانت $ل = ن$ ، هل تماس الدائرة حيث وـ قطر للدائرة.


الحل:

لـ مماس للدائرة
 $\therefore \angle L = 90^\circ$
 $\therefore \angle N = 90^\circ$
 نـ مماس للدائرة
 $\therefore \angle N = 90^\circ$
نتيجة للنظرية ٤
 $\therefore \angle N = \angle L$
 $\therefore \angle N = 90^\circ$
 $\therefore \angle N = 90^\circ$
 ومنه $ن = ل$
 $\therefore \angle N = 90^\circ$


٢١

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) المستقيم $ب$ جـ في الشكل المقابل مماس للدائرة، أوجد قيمة $س$.




(٢) حدد ما إذا كان المستقيم $ب$ جـ مماس للدائرة.




(٣) حدد ما إذا كانت الدائرة مخاطبة بمثلث (داخلة) أو خارجية بمثلث (خارجية).



(٤) بيان الشكل؛ قطع مماسية من نقطة مشتركة إلى ٣ دوائر، ما الذي يمكنك استنتاجه حول أطوال القطع الأربع؟ فسر.



(٥) $ب$ جـ $أ$ دـ مماسان للدائرة.
 (أ) أوجد قيمة $س$.
 (ب) أوجد عيـط الشكل الرباعي بـ $أ + ج$.
 (ج) أوجد $ب$ جـ.



١٩

البرهان:

٠. $ج$ ـ $ب$ ـ مماس للدائرة، \therefore جـ ونصف قطر النمساـ جـ \perp جـ
 المثلث وجـ قائم الزاوية $جـ \perp$ جـ
نظرية
 $ب$ ـ $ج$ ـ \perp (أو $ب$ ـ $ج$ ـ) \therefore
 وبالمثل المثلث $أ + ب$ ـ قائم الزاوية $أ + ب$ ـ \perp (أو $ب$ ـ $ج$ ـ)
 \therefore $ب$ ـ $ج$ ـ \perp (أو $ب$ ـ $ج$ ـ)
برهان آخر:
 في المثلين $ب$ ـ $أ$ ـ وـ $ب$ ـ $ج$ ـ:
 $ب$ ـ $و$ ـ $ب$ ـ وـ $ب$ ـ $ج$ ـ
 $ن$ ـ (أو $ج$ ـ) $=$ $ن$ ـ (بـ $ج$ ـ) $= 90^\circ$
 $أ + وـ جـ = 90^\circ$
 \therefore $أ + ب$ ـ $ج$ ـ $= 90^\circ$
 \therefore $أ + ب$ ـ $ج$ ـ متساوية \therefore $ب$ ـ $ج$ ـ \perp جـ

مثال (٦)

في الشكل المقابل، أوجد محيط المثلث $أ + ج$.

الحل:

المقطبات:
 دائرة مركبها وـ
 $ب$ ـ مماس للدائرة فيـ L ، حيث $B, L = 8$ سـ
 $أ + ج$ ـ مماس للدائرة فيـ L ، حيث $J, L = 10$ سـ
 $أ + ج$ ـ مماس للدائرة فيـ M ، حيث $A, M = 15$ سـ.
 المطلوب: إيجاد محيط المثلث $أ + ج$.
البرهان:
 $أ + L = 15 = 10$ سـ
 $جـ + L = 10$ سـ
 $جـ + M = 10$ سـ
 $بـ + L = 8$ سـ

٢٠

اختبار سريع

- ١ من نقطة خارج دائرة رسم \overleftrightarrow{AB} مماس للدائرة. إذا كان $AB = 12$ سم، فـ $r = 5$ سم فأوجد البعد بين A ومركز الدائرة. 13 سم
- ٢ ارسم دائرة ثم ارسم \overleftrightarrow{AB} مماس لها. ارسم $\overleftrightarrow{CD} \perp AB$ بحيث تكون \overleftrightarrow{CD} مماس للدائرة أيضاً. بين خطوات عملك.
- ٣ من مركز الدائرة نرسم مستقيماً عمودياً على \overleftrightarrow{AB} يقطع الدائرة في H . من H نرسم مستقيماً يوازي \overleftrightarrow{AB} .

٩ إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

١ ، ٢ ، ٣ قد تختلف الإجابات.

بطرخ المعاذلين

هـ جـ - هـ بـ = هـ فـ - هـ ئـ
بـ جـ = أـ فـ.

حاول أن تحل

من المطالع السابق يفرض أن الدائريتين متطابقان.
أثبت أن $B = F$ إن لم ينطأ $\angle B$ مع $\angle F$.

الدائرة المحاطة بثلث (الداخل) (Inscribed Circle of a Triangle)
هي دائرة ملائمة لأضلاع المثلث الثلاثة من الداخل.
مركز هذه الدائرة هو نقطة تلاقى منصفات الزوايا الداخلية للمثلث Circum Center.

الدائرة المحاطة بثلث (الخارجية) (Circumscribed Circle of a Triangle)
هي دائرة تمر برؤوس المثلث الثلاثة.
مركز هذه الدائرة هو نقطة تلاقى المحاور الثلاثة لأضلاع المثلث (نقطة تلاقى منصفات العمودية لأضلاع المثلث).

نذكر:

الحلثان أول، أول، متطابقان.
 $r(A) = r(B) = r(C)$
 $\therefore \text{ومنصف الزاوية } \hat{A}$.
أثبت بالطريقة نفسها أن C من M ، $\text{ومنصف الزاوية } \hat{B}$. \hat{B} على الترتيب.

لماذا؟


لماذا؟
لماذا؟
لماذا؟
لماذا؟
لماذا؟
لماذا؟

نوج:

وبـ = وجـ
وبـ = وجـ
ماذا تستنتج؟

٢٣


في التمرين (٧-٦)، أجد مماس للدائرة في A ، B (أ) (ب) (ج) (د) (هـ).
أوجد r (ج).




(٧) إذا كان r (ج) = س، فأوجد r (ج) بمعلومية س.

في التمارين (١١-٨)، اختبر الإجابة الصحيحة:


(٨) إذا كان D ، دجـ مماسان للدائرة، فإن س = (د) ١١٤ (ج) ٥٦٧ (ب) ٥٥٧ (أ) ٥٢٦




(٩) إذا كان D ، دجـ مماس للدائرة، فإن س = (ج) ٥٣٤ (ب) ٥٢٨ (أ) ٥٢٢



(١٠) إذا كان D ، دجـ مماس للدائرة، فإن س = (ج) ٩ (ب) ٨ (أ) ١٥



(١١) إذا كان D ، دجـ مماس للدائرة، فإن س = (ج) ٤ (ب) ٣ (أ) ٢




٢١


١٢

لـ \hat{A} نصف الزاوية (وـ \hat{D})
نـ D (جـ) = نـ (G) (جـ)
 $\therefore \hat{D} = \hat{A}$ $\therefore \triangle DAB \sim \triangle GAB$
نـ (G) (جـ) = نـ (D) (جـ)
 $\therefore r = \frac{60 - 18}{2} = 21$
نـ (G) (جـ) = $60 - 18 = 42$
نـ (D) (جـ) = $180 - (60 + 42) = 78$
 $\therefore r = 39$

حاول أن تحل



في الشكل المقابل لـ $\triangle ABC$ ، دـ مماسان للدائرة، دـ جـ مماس للدائرة عند النقطة D . أثبت أن المثلث ABC متطابق الضلعين.



مثال (٨) تطبيقات هندسية
يمثل الرسم المقابل دولاب (طار) دراجة.
يرجع أن $B = F$.

الحل:
ويجد، يـ بـ عموديان على بـ جـ.
وقـ، يـ أـ عموديان على فـ.

المطلوب: إثبات أن $B = F$.

العمل:
نـ D \hat{B} ، فـ \hat{F} حتى ينطأ في هـ.

البرهان: دـ جـ \perp بـ جـ، يـ بـ \perp بـ جـ **مطـ**

دـ جـ \hat{B} ، دـ جـ مماس شـ \hat{B} للدائرة، دـ جـ \hat{F} ، دـ جـ \hat{F} مماس شـ \hat{F} للدائرة.

هـ جـ - هـ فـ = دـ جـ \hat{B} ، دـ جـ \hat{F} \therefore هـ جـ = هـ فـ

ذلك هـ جـ، دـ جـ \hat{B} ، دـ جـ \hat{F} \therefore هـ جـ = هـ فـ

٢٢

حاول أن تحل

١ في المثلث $\triangle ABC$ القائم الزاوية

٢ المنصف العمودي للضلع AB

يمر بمنتصف BC ، والمنصف

العمودي للضلع AC يمر بمنتصف

BC فيكون منتصف BC هو

مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث $\triangle ABC$.

$$2 \times 52 = 104 \text{ سم}$$

$$N^2 = N^2 + N^2 = 40 + 50 = 90 \text{ سم}$$

$$BC = \sqrt{N^2 - (40 - 50)^2} = \sqrt{8000} \text{ سم}$$

$$\approx 89,44 \text{ سم.}$$

$$(NM)^2 = 28^2 = 64$$

$$(NL)^2 + (LM)^2 = 27^2 + 24^2 = 65$$

$(NM)^2 \neq (NL)^2 + (LM)^2$ ، لذا المثلث NL ليس قائماً في L . ومنه $M \perp L$ ليس مماساً للدائرة في L .

٥ \leftrightarrow مماس للدائرة التي تمر برؤوس المثلث BCD .

$$MS^2 = 10^2 = 100 \text{ سم}$$

$$BS^2 = BL^2 = 7^2 = 49 \text{ سم}$$

$$20 + 14 = 50$$

$$JS^2 = 16 \text{ سم} \quad AJ^2 = 8 \text{ سم}$$

فيكون طول $JB = 15 = 8 + 7$


$$JB = 15 \text{ سم.}$$

في المثلث BLB

$$LB \perp BL \quad LB \perp BJ$$

LB منصف الزاوية B .

\therefore المثلث BLB متطابق الضلعين ($LB = BL$)



تدريب توضيحي (١):

أب ج زاوية قياسها 60° . أنشئ دائرة مركزها و طول نصف قطرها ٢ سم بحيث تكون مماسة لشعاعي الزاوية A ، B ، C .

الحل:

المطلوب: إنشاء دائرة مركزها و طول نصف قطرها = ٢ سم

يجعل تكون مماسة لشعاعي الزاوية A ، B ، C .

العمل: من نقطة N تنتهي إلى A نرسم $LN \perp AB$ عمودية على AB

طولاها ٢ سم. من L نرسم $LM \perp AC$ عمودية على AC

من نقطة N تنتهي إلى C نرسم $NC \perp BC$ عمودية على BC

طولاها أيضاً ٢ سم.

من L نرسم $LC \parallel NC$ ، وهي مركز الدائرة.

L هي O (نقطة مركز الدائرة).

نرسم الدائرة التي مركزها و طول نصف قطرها ٢ سم.

تدريب (٢):

أب ج زاوية قياسها 75° . أنشئ دائرة مركزها و طول نصف قطرها ٣ سم بحيث تكون مماسة لشعاعي الزاوية A ، B ، C .


الحل:

٢٤

٨ في حالة عدم تقاطع JB ، AF الشكل $\triangle ABC$ له خط تماثل وهو المستقيم الذي يمر بمركزى الدائرتين.
تمثال A هو B ، تمثال F هو J .
 $\therefore B \sim F$.

تدريب ٢

يكسر العمل في تدريب توضيحي مع فارق أن $ML = 3$ سم، $NK = 3$ سم وقياس الزاوية A ج هو 97.5° .



المنصف العمودي للضلع AB يمر بمنتصف BC ، والمنصف

BC فيكون مننصف BC هو

مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث $\triangle ABC$.

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٦-٢: الأوتار والأقواس

١ الأهداف

- يربط بين الأوتار المتطابقة والأقواس والزوايا المركزية على دائرة أو على دوائر متطابقة.
- يتعرف خصائص الخطوط المستقيمة التي تمر في مركز الدائرة.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

قوس - وتر - قطر - نصف قطر - زاوية مركزية - منصف عمودي - منصف زاوية - قطعة متوسطة.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة - فرجار - منقلة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show)

٤ التمهيد

أسأل الطالب:

- ما هي حالات تطابق مثلثين؟
- ما هو منصف الزاوية؟ ما هو العمود المرسوم من رأس المثلث إلى الضلع المقابل؟ ما هو المنصف العمودي لقطعة مستقيمة؟ ما هي القطعة المتوسطة في المثلث؟
- ما طول قوس على الدائرة بدلالة نصف قطرها وقياس زاويته المركزية بالراديان؟

٥ التدريس

اطلب إلى الطالب أن يستخدموا المسطرة والفرجار والمنقلة ليرسموا نماذج متعددة من الدوائر ويرسموا في كل دائرة زاويتين مركزيتين متساويتي القياس، ثم يقارنوا أطوال الأوتار المقابلة، وباستخدام القاعدة $L = \frac{1}{2}d$ فهو يوجدوا أطوال الأقواس المقابلة. يمكنهم أيضاً استخدام الأوتار متساوية الطول، ثم بواسطة المنقلة يقيسون الزوايا المركزية المقابلة. سوف يساعدهم ذلك على فهم نظرية (١).

من المهم جداً أن يتمكن الطالب في فهم النظريتين (٢)، (٣) اللتين تحددان العلاقة بين بعد الأوتار عن مركز الدائرة وعلاقة قطر الدائرة العمودي على أي وتر في الدائرة.

أسأل الطالب: كيف يمكن معرفة مركز الدائرة باستخدام الأوتار؟ نرسم المنصف العمودي لوترتين غير متوازيتين. نقطة تقاطع المنصفين هي مركز الدائرة.

٦-١

الأوتار والأقواس Chords and Arcs

سوق تعلم

- استخدام الأوتار المتطابقة والأقواس والزوايا المركزية.
- خصائص الخطوط المستقيمة التي تمر بمركز الدائرة.

عمل تعاوني (استخدم الأدوات الهندسية)
في الشكل المقابل وـ \overline{AB} وـ \overline{CD} .
قارن بين طولي \overline{AB} ، \overline{CD} . ماذَا تلاحظ؟
قارن بين قياس الزوايا $\angle A$ وـ $\angle C$. ماذَا تلاحظ؟
أعد رسم الشكل المقابل بحيث يكون $\overline{AB} > \overline{CD}$.
قارن بين $\angle A$ وـ $\angle C$. ماذَا تلاحظ؟

الوتر (Chord) هو قطعة مستقيمة بتنبي طرفاها إلى دائرة.
يبين الشكل المقابل الوتر \overline{AB} والقوس (\widehat{ACB}) $\widehat{(\text{المانظر لهذا الوتر})}$.

تمحور النظرية التالية على العلاقة بين الزوايا المركزية في دائرة والأوتار والأقواس التي تحصرها.

نظريّة (١)

- في دائرة أو في دوائر متطابقة:
لزوايا المركزية المتطابقة أوتار متطابقة.
الأوتار المتطابقة تغلق أقواساً متطابقة.
للاتقاس المتطابقة زوايا مركزية متطابقة.

إثبات نظرية (١)

المعطيات: دائرة مركزها O ، $\overline{AB} = \overline{CD}$.

المطلوب: إثبات أن $\angle A = \angle C$.

البرهان: المثلثان $\triangle AOB$ وـ $\triangle COD$ فيهما:
 $\angle AOB = \angle COD$
 $OA = OC$
 $OB = OD$
 $\angle OAB = \angle OCD$
المثلثان متطابقان ($A.S.A$)
 $\angle A = \angle C$

معطى:
تطابق الأضلاع الم対اظرة

٢٥

الخطوات: $\angle A \cong \angle C$
المطلوب: إثبات أن $\overline{AB} \cong \overline{CD}$.

البرهان:

لماذا؟
 $\angle AOB \cong \angle COD$. . . $\triangle AOB \cong \triangle COD$
 $\therefore \overline{AB} = \overline{CD}$

باستخدام القانون $L = \frac{1}{2}d$:

طول القوس = قياس الزاوية المركزية (بالإvidence) \times طول نصف قطر.

نستنتج أن $\overline{AB} \cong \overline{CD}$.

الخطوات: $\angle A \cong \angle C$
المطلوب: $\overline{AB} = \overline{CD}$

البرهان: $\angle A \cong \angle C$
 $\therefore \text{طول } \overline{AB} = \text{طول } \overline{CD}$
 $\overline{AB} = \overline{CD}$

بالقسمة على d

مثال (١)

في الشكل المقابل الدائرة T متطابقتان، $\overline{AB} \cong \overline{CD}$. ماذَا تستنتج؟

الحل:
باستخدام النظرية السابقة
 $\angle A \cong \angle C$
 $\overline{AB} \cong \overline{CD}$
 $\angle B \cong \angle D$

حاول أن تحل:

١) في الرسم أعلاه، إذا كان $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ ، فماذا تستنتج؟

٢٦

أشر إلى أن كل مستقيم مار في مركز الدائرة يشكل خط تنازلا لها.
قد تساعده هذه الخاصية في إثبات بعض النظريات والتطبيقات.

- في المثال (١)، يمكن أن يكون القوسان $\overset{\frown}{AB}$ ، $\overset{\frown}{CD}$ على دائرة واحدة وتبقي النتيجة ذاتها.


- في المثال (٢)، إذا عرف البعد بين مركز الدائرة والوتر بمعلومية r ، نستطيع معرفة طول الوتر والعكس صحيح.

نناقش مع الطالب الحلول الموجودة لإثبات النظرية (٣)
وذلك في الحالات الثلاث:

النظرية (٣):

١- المعطيات: دائرة مركزها O ، LN قطر، $LN \perp AB$
حيث AB وتر في الدائرة.

المطلوب: إثبات أن $M \cong M$.



العمل: نصل O ، وب

البرهان: ΔOAB متطابق الضلعين $OB = OA$ و $AB = AB$


$\therefore O$ منصف العمودي LN
 $\therefore M \cong M$.

في الدائرة، الممنصف العمودي على الوتر خواص هندسية مهمة.

نظريه (٣):

- ١) القطر العمودي على وتر في دائرة ينصفه وينصف كلّاً من قوسيه.
- ٢) القطر الذي ينصف وترًا (ليس قطرًا) في دائرة يكون عموديًّا على هذا الوتر.
- ٣) العمود الممنصف لوتر في دائرة يمر بمركز الدائرة.

٢٨



في الشكل المقابل ليكن M مركز الدائرة، M \perp AB . أوجد طول AB .

الحل:

المعلميات: جد، M وتران في الدائرة.

B متصف $\overset{\frown}{AB} = 12,5^\circ$.

M جد حيث $M \perp AB$.

المطلوب: إيجاد طول AB .

البرهان: $\overset{\frown}{AB} = M$ جد = $12,5^\circ$.

مخطى: $AB = M$ جد = $12,5^\circ$.

بالتعويض: $AB + M = 12,5^\circ$.

مقطى: $M = 12,5^\circ$.

نظريه: $M = 12,5^\circ$.

بالتعويض: $M = 12,5^\circ$.

حارل أن تحمل: $M = 12,5^\circ$.

دائرة مركزها.

أوجد قيمة S في الشكل المقابل، وفسر إجابتك.

في الدائرة، الممنصف العمودي على الوتر خواص هندسية مهمة.

نظريه (٣):

- ١) القطر العمودي على وتر في دائرة ينصفه وينصف كلّاً من قوسيه.
- ٢) القطر الذي ينصف وترًا (ليس قطرًا) في دائرة يكون عموديًّا على هذا الوتر.
- ٣) العمود الممنصف لوتر في دائرة يمر بمركز الدائرة.


٢٩




التاريخُ المجريُّ: التاريخُ المجريُّ:

الأوتار والأقواس Chords and Arcs

المجموعة # تمارين أساسية



(١) أوجد قيمة S في الأشكال التالية:




(٢)

في الشكل المقابل إذا كان:

AB دائره، $AB \perp CD$. ماذا تستنتج؟

.....




(٣) أوجد قيمة S في الأشكال التالية:



(٤)

تحليل الخطأ: نظر سلطان إلى الشكل المقابل واستنتج أن $AB \cong CD$. ما الخطأ في استنتاجه؟



(٥) إذا كان AB مرتكزاً على دائرة ثانية. جد وتر مشترك للدائرةتين.

(٦) إذا كان $AB = 8$ سم، $CD = 6$ سم. فما طول نصف القطر؟




(٧) إذا كان $AB = 24$ سم، نصف القطر = ١٣ سم. فما طول CD ؟

٢٩

تبين النظرية التالية العلاقة بين وترین وبعد كلّيًّا عن مركز الدائرة.

نظريه (٢):

- ١) الأوتار المتطابقة في دائرة على أبعاد متساوية من مركز الدائرة.
- ٢) الأوتار التي على أبعاد متساوية من مركز دائرة تكون متطابقة.



معلومة علمية:

إذا تطابق مثلثان فإن الأضلاع المرسمة من الرأس إلى القاعدة الم対اظنة تكون متطابقة.

البطاطس: $AB \cong CD$.

المطلوب: $ON = OM$.

البرهان: $AB \cong CD$.

بسط ووتر: $ON^2 = OM^2$.

المطلوب: $AB \cong CD$.

البرهان: $AB \cong CD$.

البطاطس: $AB \cong CD$.

المطلوب: $AB \cong CD$.

البرهان: $AB \cong CD$.

بسط ووتر: $AB^2 = ON^2 - OM^2$.

المطلوب: $AB \cong CD$.

البرهان: $AB \cong CD$.

البطاطس: $AB \cong CD$.

المطلوب: $AB \cong CD$.

البرهان: $AB \cong CD$.

بسط ووتر: $AB^2 = ON^2 - OM^2$.

المطلوب: $AB \cong CD$.

البرهان: $AB \cong CD$.

البطاطس: $AB \cong CD$.

المطلوب: $AB \cong CD$.

البرهان: $AB \cong CD$.

٢٧

٢٤

وَمُنْصَفُ الْعَمْدِيِّ لِأَبْ

$\therefore \text{وم منصف الزاوية } \angle \text{وب}$

$\angle \text{ون} \cong \angle \text{ن}$

$\therefore \angle \text{ن} = \angle \text{ن}$

٢- المعلميات: لـ $\overline{\text{ن}} \text{ قطري نصف } \overline{\text{أب}}$

البرهان: المثلث $\triangle \text{أب} \text{ متطابق الضلعين}.$

القطعة المتوسطة $\overline{\text{ن}}$ هي المنصف العمدي $\text{لـ } \overline{\text{أب}}$

وبالتالي $\angle \text{ن} = \angle \text{أب}$

٣- المعلميات: لـ $\overline{\text{ن}} \text{ منصف } \overline{\text{أب}}$, لـ $\overline{\text{ن}} \perp \overline{\text{أب}}$

المطلوب: إثبات أن $\text{ن}\text{م}$ بمركز الدائرة.

البرهان: لـ $\angle \text{ن} = \angle \text{أب}$, لـ $\overline{\text{ن}} \text{ مننصف } \overline{\text{أب}}$

$\angle \text{ن} = \angle \text{أب}$

$\therefore \text{ن} = \text{ن}$


و تنتهي إلى المنصف العمدي للقطعة $\overline{\text{أب}}$.

و منه لـ $\text{ن}\text{م}$ بالمركز.

في المثال (٣)

تطبيق مباشر على النظرية (٣).


لدينا وـ $\angle \text{أب}$ لـ ن النقطة ج منتصف الوتر $\overline{\text{أب}}$.



- ٢- استخدم الشكل المقابل لإيجاد:
- ١- طول الوتر $\overline{\text{أب}}$.
 - ٢- المسافة من منتصف الوتر إلى منتصف القوس الأصغر ن .

نتيجة

خط المركبين الدائريتين متقاطعين يكون عمودياً على الوتر المشترك بينهما وينصفه.



مثال (٤)

بمثل الشكل المقابل دائريين متطابقين، جـ دـ وـرـ مشترك. إذا كان $\overline{\text{أب}} = 24$ سم، $\text{ن} = 13$ سم، فما طول جـ دـ؟

الحل:

المعلميات: دائريان متطابقان مركزاهما أ، ب .

جد وـرـ مشترك.

$\overline{\text{أب}} = 24$ طول نصف قطر كل من الدائريـن = 13 سم.

المطلوب: إيجاد طول جـ دـ

العمل: نرسم $\overline{\text{أج}} \perp \overline{\text{أب}}$, بـ جـ, دـ, بـ.

البرهان:

في الشكل $\triangle \text{أب} \text{ جـ دـ}$ $\overline{\text{أب}} = \overline{\text{جـ دـ}}$, $\overline{\text{بـ جـ}} = \overline{\text{جـ دـ}}$, $\text{ن} = 13$ سم

$\therefore \angle \text{أبـ جـ} = \angle \text{جـ دـ}$.

والنظران $\triangle \text{أبـ جـ}$, $\triangle \text{جـ دـ}$ دـ عـامـدانـ وـيـنـصـفـ كـلـ مـنهـمـ الـآخـرـ.

في $\triangle \text{أبـ جـ}$, $\text{ن} = 13$: $\therefore \angle \text{أبـ جـ} = 90^\circ$.

$\angle \text{أبـ جـ} = \angle \text{جـ دـ}$ قائم زاوية.

نظـرـةـ فـيـ ظـلـ

(وـجـ) = $25 - 13 = 12$ سم.

(وـجـ) = $25 - 12 = 13$ سم.

(وـجـ) = $12 \times 2 = 24$ سم.

وـجـ = $12 \times 2 = 24$ سم.

طـوـلـ جـ دـ يـساـويـ 24 سم.

٣٠

(٦) نفكـرـ نـاقـدـ: طـوـلـ قـطـرـ دـائـرـةـ يـسـاـويـ 20ـ سـمـ، وـطـوـلـ دـوـرـينـ مـواـزـينـ هـذـاـ القـطـرـ 16ـ سـمـ وـ16ـ سـمـ.


أـوـجـ المسـافـةـ بـيـنـ الـوـتـرـيـنـ لـأـقـرـبـ جـزـءـ مـنـ عـشـرـةـ مـنـ السـيـمـيـتـرـ.

(٧) إذاـ كانـ الـوـتـرـ فيـ جـهـةـ وـاحـدـةـ مـنـ الـمـركـزـ.

(بـ) إذاـ كانـ الـوـتـرـ فيـ جـهـيـنـ خـلـفـيـنـ مـنـ الـمـركـزـ.

(٧) الـبـيـنـ مـرـكـزـ الدـائـرـةـ وـمـطـولـ طـوـلـهـ 9ـ سـمـ يـسـاـويـ 11ـ سـمـ تـقـرـيـباـ.

أـوـجـ طـوـلـ نـصـفـ قـطـرـ الدـائـرـةـ لـأـقـرـبـ عـدـدـ كـلـ.



(٨) دائـيـنـ مـرـكـزـاهـاـ عـلـىـ التـرـيـبـ لـأـبـ تـقـاطـعـانـ بـالـنـقـطـيـنـ جـ، دـ.

وـطـوـلـ نـصـفـ قـطـرـ كلـ دـائـرـةـ 6ـ سـمـ.

أـوـجـ طـوـلـ جـ دـ إـذـاـ كـانـ طـوـلـ أـبـ يـسـاـويـ 8ـ سـمـ.

فيـ التـصـرـيـنـ (٩ـ،ـ ١٠ـ،ـ ١١ـ)ـ اـخـتـرـ الـإـجـاهـ الصـحـيـحةـ:


(٩) إذاـ كانـ طـوـلـ قـطـرـ دـائـرـةـ يـسـاـويـ 25ـ سـمـ وـطـوـلـ أـبـ أـوـتـارـاـهاـ 16ـ سـمـ فـانـ الـبعـدـ بـيـنـ مـرـكـزـ الدـائـرـةـ وـالـوـتـرـ هوـ

تقـرـيـباـ:

(أـ) ٩ـ سـمـ (بـ) ٩ـ،ـ ٦ـ سـمـ (جـ) ٨ـ سـمـ (دـ) ٢ـ سـمـ

(١٠) فيـ الشـكـلـ المـقـابـلـ عـبـارـةـ الخـاتـمـةـ فـيهـ بـلـيـ هيـ:

(أـ) جـ = بـ (بـ) دـ = جـ (جـ) جـ + هـ = بـ (دـ) هـ = دـ



١ فيـ الشـكـلـ المـقـابـلـ، أـوـجـ طـوـلـ نـصـفـ قـطـرـ الدـائـرـةـ يـيـ مـرـكـزـهاـ وـ.

الحل:

المعلمـياتـ:

أـبـ وـرـ فـيـ دـائـرـةـ مـرـكـزـهاـ وـ، أـبـ = 14ـ سـمـ، وـجـ لـأـبـ، وـجـ = 3ـ سـمـ

المطلوبـ: إيجـادـ طـوـلـ نـصـفـ قـطـرـ الدـائـرـةـ

العملـ:

الـبرـهـانـ:

$\text{بـ جـ} = \frac{1}{2} \text{أـبـ} = \frac{1}{2} \times 14 = 7$ سـمـ

$(\text{وـجـ})^2 = (\text{جـ} + \text{هـ})^2 = (\text{جـ})^2 + 2 \times \text{جـ} \times \text{هـ} + (\text{هـ})^2 = 9 + 2 \times 3 \times 4 + 4 = 58$

$\text{وـبـ} = \sqrt{58} \approx 7.6$ سـمـ

طـوـلـ نـصـفـ قـطـرـ الدـائـرـةـ يـسـاـويـ 7.6 سـمـ.

٢ فيـ الشـكـلـ المـقـابـلـ أـوـجـ الـبـيـنـ بـيـنـ مـرـكـزـ الدـائـرـةـ وـالـوـتـرـ.

الحل:

المعلمـياتـ:

وـأـنـقـضـ قـطـرـ الدـائـرـةـ وـ، أـبـ = 15ـ سـمـ، أـبـ وـرـ فـيـ الدـائـرـةـ.

$\text{بـ جـ} = \text{جـ هـ}$

المطلوبـ: إيجـادـ الـبـيـنـ بـيـنـ مـرـكـزـ الدـائـرـةـ وـالـوـتـرـ.

الـبرـهـانـ:

$\text{بـ جـ} = \sqrt{(\text{جـ})^2 + (\text{هـ})^2}$

$(\text{وـجـ})^2 = (\text{جـ})^2 + (\text{هـ})^2 = 9 + 4 = 13$

$\text{وـبـ} = \sqrt{13} \approx 3.6$ سـمـ

٣ الجـدرـ التـرـيـعـيـ لـكـلـ الـطـرـفـينـ

الـبـعـدـ بـيـنـ مـرـكـزـ الدـائـرـةـ وـالـوـتـرـ = 10.2 سـمـ.

١٤

في المثال (٤)

جد وتر مشترك في الدائريتين، \overline{AB} يمر بالنقطة M مركز دائرة ويمر بالنقطة B مركز دائرة أيضاً وهو عمودي على \overline{GD} وبالتالي تطبيقاً للنظرية (٣) تكون وتر GD متتصف.

٦ الرابط

يؤكد المثال (٥) على العلاقة بين مماس الدائرة الذي يشكل مع القطر في نقطة المماس زاوية قائمة وهي القاعدة التي تحدد ما إذا كان مستقيم ما يشكل مماساً دائرة معينة.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

يعتقد الطلاب أن الوتر المتعامد مع وتر آخر في الدائرة نفسها يمر في منتصف هذا الوتر.

وضوح هذه الفكرة لدى الطلاب مؤكداً لهم أن القطر إذا ما كان متعامداً مع أي وتر ليس قطراً في الدائرة فإنه يمر في منتصفه.

٨ التقييم

رافق الطلاب وهم يتعاملون مع فقرات «حاول أن تحل» لتأكد من أنهم قد توصلوا إلى فهم كيفية إيجادهم الحلول.

حاول أن تحل

٤ في مثال (٤)، إذا كان $GD = 4$ سم، $CD = 3$ سم، فأوجد طول \overline{AB} .

مثال (٥) تطبيقات حياتية

يريد راشد وضع إطار خشبي مربع الشكل داخل نافذة دائرة الشكل بحيث تلامس رؤوس المربع النافذة. إذا كان طول قفر دائرة النافذة = ٦، متر، فما طول ضلع المربع الخشبي؟ ثم أوجد طول العمود النازل من مركز الدائرة على أحد أضلاع المربع.

الحل:

المعطيات: لدينا طول قطرها ٦، م.م.
مربع نعم رؤوسه على الدائرة
المطلوب: إيجاد طول ضلع المربع.
إيجاد طول العمود النازل من مركز الدائرة على أحد الأضلاع
البرهان:
لكن المربع \overline{AB} .
طول قطر الدائرة يساوي طول قطر المربع.
 $\therefore \overline{AB} = 6$ م.
ولكن $\overline{AB} = \frac{1}{2}$ (العلاقة بين طول ضلع مربع وطول قطره)
 $\therefore \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 6 = \frac{1}{2} \times 13 = 6.5$ متر تقريبا.
 \therefore طول ضلع المربع يساوي ٦.٥ متر تقريبا.


حاول أن تحل

٥ في مثال (٥) أعلاه، أوجد طول نصف قطر الدائرة إذا كان طول ضلع المربع يساوي ١،٥ سم.


٢١

اختبار سريع

١ في الشكل المقابل أوجد طول \overline{BG} **٨ سم**



٢ في الشكل المقابل أوجد طول \overline{AB} **٦ سم**



٩ إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

١ ، ٢ ، ٣ تحقق من عمل الطلاب.

«حاول أن تحل»

١ المثلثان متطابقان (ض.ض.ض)،

لذا $\angle F \cong \angle J$ (جوب)،

وبالتالي $F \cong J$.

٢ الوتران متساويا الطول (٣٦) لذا: س = ١٦.

$$30 - 24 = 24 - 2(8, 6)$$

$$\text{س ب} \approx 5, 5 \text{ سم}$$

$$\text{أب} \approx 5, 5 \text{ سم}$$

$$(ب) \text{ المسافة: } 8 - 6 = 2, 8 \text{ سم.}$$

$$120 - 7 = 13(7 - 2) \therefore \text{ وج} = 7 \text{ سم، (وب)} = 2(7 - 2) \text{ سم.}$$

$$\text{ وب} = \sqrt{30^2 - 11^2} \approx \sqrt{30^2 - 22^2} = 22 \text{ سم.}$$

٥ طول القطر = $\sqrt{271, 5}$ متر

$$\text{ن} = \frac{\sqrt{271, 5}}{2} \text{ متر}$$

$$\therefore \text{ ن} = \frac{\sqrt{273}}{4} \text{ متر} \approx 1, 06 \text{ متر.}$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) أوجد قيمة س في الأشكال التالية:




(٢) مستخدما الشكل المقابل، أعلاه الفراغ يبا هو مناسب.

$\therefore \overline{AB}$ منصف عمودي لـ \overline{CD} .

\therefore يمتد \overline{AB} بـ _____.


(٣) أوجد قيمة س في كل من الأشكال التالية:



(٤) في الشكل المقابل، أوجد قيمة س إلى أقرب جزء من عشرة.

(٥) طول نصف قطر دائرة يساوي ١٠, ٨ سم، وطول الوتر ١٢ سم.

ما البعد بين مركز الدائرة والوتر؟



١٩

(٦) في الشكل المقابل، م، ن مراكزا دائرتين متطابقتين، طول نصف قطر كل دائرة يساوي ١٣ سم، \overline{LK} ووتر

مترتك للوارتدين، حيث $LK = 24$ سم.

أوجد طول MN على \overline{MN} $\cap \overline{LK} = \{O\}$.

٦-٣: الزوايا المركزية والزوايا المحيطية

الزوايا المركزية والزوايا المحيطية
Central and Inscribed Angles

دعا نذكر ونتناول

- الزاوية المركزية.
- الزاوية المحيطية.
- الزاوية المماسية على الدائرة.
- العلاقة بين قياس الزاوية المركزية وقياس الزاوية المحيطية المشتركة في القوس نفسه.
- العلاقة بين قياس الزاوية المماسية وقياس القوس المحصورين ضلعيها.

الأدوات المستخدمة: سطارة، مقلة، فرجار

تعريف:

- الزاوية التي رأسها مركز الدائرة وضلعها يقطعان الدائرة تسمى بالزاوية المركزية.
- الزاوية التي رأسها إحدى نقاط الدائرة وضلعها يقطعان الدائرة تسمى بالزاوية المحيطية.

١ - الزوايا المركزية والزوايا المحيطية

٢ - تعريف:

- في الشكل (١) في السادس المستقيم المقابل (شكل ١)، أثبت أن قياس القوس \widehat{AB} يساوي 60° .
- ما قياس الزاوية المركزية $\angle AOB$ ؟
يسنكت استخدام المسقلة.
- ما قياس كل من الزوايا المحيطية: $\angle ACB$ ؟
 $\angle ABC$ ؟
 $\angle CAB$ ؟
ماذا نلاحظ؟
- في الشكل الخامس المستقيم (شكل ٢)، أثبت أن قياس القوس \widehat{AB} يساوي 72° .
- ما قياس الزاوية المركزية $\angle AOB$ ؟
ما قياس كل من الزوايا: $\angle ACB$ ؟
 $\angle ABC$ ؟
 $\angle CAB$ ؟
ماذا نلاحظ؟
- في الشكل (٣) هل توجد علاقة بين قياس الزاوية $\angle ACB$ وقياس الزاوية $\angle AOB$ ؟
وقياس القوس \widehat{AB} ؟

٣ - Central Angle and Inscribed Angle

- ١ الأهداف**
- يربط بين قياس الزاوية المركزية وقياس القوس الذي تحصره بين ضلعيها.
 - يربط بين قياس الزاوية المحيطية وقياس القوس الذي تحصره بين ضلعيها.
 - يتعرف العلاقة بين قياس الزاوية المركزية وقياس الزاوية المحيطية المشتركة في القوس نفسه.
 - يربط بين قياس الزاوية المماسية للدائرة وقياس القوس المحصور بين ضلعيها.

- ٢ المفردات والمفاهيم الجديدة**
- زاوية مركزية - زاوية محيطية - زاوية مماسية - زاوية داخلية - زاوية خارجية.

- ٣ الأدوات والوسائل**
- مسطرة - فرجار - منقلة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show)

٤ التمهيد

أسأل الطالب:

(أ) زاوية مركزية في دائرة قياسها 40° . ما قياس القوس المقابل لها على الدائرة نفسها؟

(ب) إذا أخذنا منصفاً داخلياً لهذه الزاوية، فما قياس كل زاوية؟

(ج) إذا ضاعفنا قياس هذه الزاوية، فما قياس الزاوية المضاعفة؟

(د) ما قياس زاوية خارجية في المثلث مقارنة بمجموع قياس الزاويتين الداخليةين في المثلث غير المجاورتين مع هذه الزاوية؟

إذا رسمنا مماساً AB للدائرة التي مركزها و عند النقطة M و رسمنا الوتر HM والزاوية HDM والزاوية المحيطية HMN المحيطية MHN كما بالشكل

فإن HDM تسمى زاوية مماسية و HMN تسمى أيضاً زاوية مماسية أخرى و سنكتفي في مناقشتنا مع الزاوية ذات القياس

الأصغر \widehat{AB} وعلاقتها بالزاوية \widehat{AD} التي تقابل الوتر AB والجهة الأخرى كما بالشكل وتظل النظرية صحيحة بالنسبة إلى الزاوية المماسية الأخرى \widehat{ACB} وعلاقتها بالزاوية المحيطية \widehat{AN}

٥ التدريس

رسخ لدى الطالب فكرة العلاقة بين قياس الزاوية المركزية وقياس الزاوية المحيطية وقياس القوس المقابل لها على الدائرة. توسيع في هذه العلاقة مع الزاوية المماسية والزاوية الداخلية والزاوية الخارجية وذلك من خلال أمثلة متعددة.

اعرض على السبورة أمثلة مشابهة لهذا المثال:

$$\angle JCB = 40^\circ$$

$$\angle HCD = 100^\circ$$

و = مركز الدائرة

أوجد:

$$\angle BAH = \angle DEM$$

$$\angle BDC = \angle DBC$$

$$\angle GCB = \angle DCH$$

(ب) \overleftrightarrow{SC} مماس للدائرة عند النقطة H . أوجد $\angle DHC$.

أ. أشر إلى أنه كلما ابتعدت النقطة خارج الدائرة صغر قياس الزاوية.

ب. اسأل الطلاب: A ثابتة، M نقطة تتحرك في المستوى بحيث $\angle MAB = 90^\circ$ ثابتة. أين تتحرك النقطة M ؟

ناقش مع الطلاب المثال (٤) لأهميته فيربط المفاهيم الهندسية. في النظرية (٢) ركز لدى الطلاب الربط بين الحالات الثلاث لوضعية الزاوية المحيطية بالنسبة لمركز الدائرة وقياس هذه الزاوية بالمقارنة مع الزاوية المركزية المناظرة لنفس القوس.

إثبات نظرية (٢)

الحالة ١: المعطيات:

$$\angle WJC = \text{زاوية محيطية.}$$

«و» مركز الدائرة ينتمي إلى BD .

$$\text{المطلوب: } \angle BDC = \frac{1}{2} \angle BJC$$


العمل: نصل وج

$$\text{البرهان: } \angle BWC = \angle BJC$$

$$\angle BWC = \angle WGD + \angle WDG$$

$$\therefore \angle WGD = \angle WDG$$

$$\therefore \angle BWC = 2\angle BDC \text{ أي } \angle BDC = \frac{1}{2} \angle BJC$$



نظريّة (١): قياس الزاوية المركزية يساوي قياس القوس الممحض بين ضلعيها على الدائرة.

مثال (١): في الشكل المقابل دائرة مركزها O . إذا كان $\angle AOB = 90^\circ$ ، فأوجد $\angle ACB$.

الحل:

المعطيات: دائرة مركزها O .

$\angle AOB = 90^\circ$.

المطلوب: إيجاد $\angle ACB$.

البرهان:

و هو مركز الدائرة.


$\angle AOB$ زاوية مركزية تقابل $\angle ACB$.

$\therefore \angle ACB = \angle AOB$.

$\therefore \angle ACB = 90^\circ$.

حاول أن تحل:


إذا كان قياس زاوية مركزية 35° ، فأوجد قياس القوس على الدائرة الممحض بين ضلعيها.



نظريّة (٢): في الدائرة قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس الممحض بين ضلعيها.

$$\angle JCB = \frac{1}{2} \angle AOB$$


قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في القوس نفسه.



أ. أشر إلى أنه كلما ابتعدت النقطة خارج الدائرة صغر قياس الزاوية.

ب. اسأل الطلاب: A ثابتة، M نقطة تتحرك في المستوى بحيث $\angle MAB = 90^\circ$ ثابتة. أين تتحرك النقطة M ؟

ناقش مع الطلاب المثال (٤) لأهميته فيربط المفاهيم الهندسية. في النظرية (٢) ركز لدى الطلاب الربط بين الحالات الثلاث لوضعية الزاوية المحيطية بالنسبة لمركز الدائرة وقياس هذه الزاوية بالمقارنة مع الزاوية المركزية المناظرة لنفس القوس.



$$\begin{aligned} \text{الحالات ١: المعطيات:} \\ & \angle WJC = \text{زاوية محيطية.} \\ & \text{«و»} \text{ مركز الدائرة ينتمي إلى } BD. \\ & \text{المطلوب: } \angle BDC = \frac{1}{2} \angle BJC \\ & \text{العمل: نصل وج} \\ & \text{البرهان: } \angle BWC = \angle BJC \\ & \angle BWC = \angle WGD + \angle WDG \\ & \therefore \angle WGD = \angle WDG \\ & \therefore \angle BWC = 2\angle BDC \text{ أي } \angle BDC = \frac{1}{2} \angle BJC \end{aligned}$$

الحالة ٢: المعطيات:

(ب) زاوية محاطة. (و) مركز الدائرة داخل الزاوية.

$$\text{المطلوب: } n(\widehat{BHD}) = \frac{1}{2}n(\widehat{BG})$$

العمل: نرسم القطر الذي يمر بال نقطتين د، و، يقطع الدائرة في هـ.

$$\text{البرهان: } n(\widehat{BHD}) + n(\widehat{HGD})$$

$$= n(\widehat{BHD})$$

$$= \frac{1}{2}n(\widehat{BG}) + \frac{1}{2}n(\widehat{HG})$$

الحالة ٣: المعطيات:

(ب) زاوية محاطة. (و) مركز الدائرة خارج الزاوية.

$$\text{المطلوب: } n(\widehat{BHD}) = \frac{1}{2}n(\widehat{BG})$$

العمل: نرسم القطر هـ

$$\text{البرهان: } n(\widehat{BHD}) =$$

$$n(\widehat{HGD}) - n(\widehat{HDG})$$


$$= \frac{1}{2}n(\widehat{HG}) - \frac{1}{2}n(\widehat{HD})$$

$$= \frac{1}{2}n(\widehat{BG})$$

المطلوب: إيجاد قياس كل من الأقواس آب، بـ جـ، هـ.

البرهان:
زوايا المثلث هي زوايا محاطة في الدائرة: $n(\widehat{AB}) + n(\widehat{AH}) = \frac{1}{2}n(\widehat{BG})$
ومنه: $\frac{1}{2}n(\widehat{BG}) = 40^\circ \Rightarrow n(\widehat{AB}) = 40^\circ$
 $n(\widehat{AH}) = 40^\circ \times 2 = 80^\circ$
 $n(\widehat{AB}) = 80^\circ - 360^\circ = 280^\circ$
 $n(\widehat{AH}) = 280^\circ - 140^\circ = 140^\circ$

حاول أن تحل:
في المثال (٣) إذا كان $\widehat{BHD} = 90^\circ$ ، منصف الزاوية الداخلية الجيب ويقطع الدائرة في النقطة هـ.
ما قياس القوس الأقصى لها؟



مثال (٤):
في الشكل المقابل دائرة مركبها، أثبت أن $n(\widehat{BHD}) = 90^\circ$.

الحل:
المعطيات: ١- بـ جـ مثلث قائم الزاوية، ٢- رؤوس الثالثة تنتمي إلى الدائرة التي مركبها.
٣- منصف (آبـ) وينقطع الدائرة في دـ.

المطلوب: إثبات أن $n(\widehat{BHD}) = 90^\circ$.

البرهان:
 $n(\widehat{AB}) = 90^\circ$
 $\therefore \widehat{AB}$ منصف الزاوية آبـ.
 $n(\widehat{AB}) = 45^\circ$
 $n(\widehat{AB}) = \frac{1}{2}n(\widehat{BG})$
 $n(\widehat{BG}) = 90^\circ$
 $n(\widehat{BG}) = 90^\circ$
 $n(\widehat{BG}) = 90^\circ$
 $\therefore n(\widehat{BHD}) = 90^\circ$

حاول أن تحل:
في المثال (٤)، إذا كان $n(\widehat{AB}) = 30^\circ$ ، أوجد $n(\widehat{BHD})$.

٣٥




التاريخ الميلادي التاريخ المجري: التاريخ المجري:

الزوايا المركزية والزوايا المحاطة

Central Angles and Inscribed Angles

المجموعة ٢: تمارين أساسية


(١) أوجد قيمة المجهول في كل من الأشكال التالية:



(٢) أوجد قيمة المجهول في كل من الأشكال التالية بمعلومية أن الشعاع في كل رسم يمثل مماساً للدائرة.



(٣) أوجد قياسات الزوايا والأقواس التالية مستخدماً الرسم المقابل:



١٦

هناك ٣ حالات يجب أخذها في الاعتبار.

الحالة ١: يتسم مركز الدائرة إلى أحد ضلعين الزاوية المحاطة.

الحالة ٢: مركز الدائرة داخل الزاوية المحاطة.

الحالة ٣: مركز الدائرة خارج الزاوية المحاطة.

مثال (٢): في الشكل المقابل: إذا كان $n(\widehat{B}) = 80^\circ$ فما هي قيمة $n(\widehat{AHD})$.

الحل:
المعطيات: دائرة مركبها، ١- بـ جـ، جـ نقاط تنتمي إلى الدائرة، $n(\widehat{B}) = 80^\circ$.
المطلوب: إيجاد $n(\widehat{AHD})$.
البرهان:
الجيب زاوية محاطة في الدائرة: $n(\widehat{AHD}) = \frac{1}{2}n(\widehat{BG})$
 $n(\widehat{BG}) = 80^\circ = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ$
وبالتالي $n(\widehat{AHD}) = 40^\circ$

حاول أن تحل:
إذا كان قياس زاوية محاطة في دائرة يساوي 5° ، فما هي قيمة القوس المحصور بين ضلعيها.

مثال (٣): في الشكل المقابل $\triangle ABC$ مثلث متوازي الضلعين حيث ١- بـ جـ نقاط على الدائرة التي مرکبها، ٢- $n(\widehat{A}) = 40^\circ$.
أوجد قياس كل من الأقواس آبـ، بـ جـ، هـ.

الحل:
المعطيات: دائرة مركبها، ١- بـ جـ، جـ نقاط تنتمي إلى الدائرة.
٢- بـ جـ متوازي الضلعين، $n(\widehat{A}) = 40^\circ$.
 $n(\widehat{B}) = 40^\circ$

٣٤

في المثال (٥)

يربط قياس زاوية داخلية من الدائرة بقياس القوسين المحصورين بين ضلعيها على الدائرة.

شدد على فقرة «نتائج» في الصفحة ٣٧. اطلب إلى الطالب رسم أمثلة تطبيقية على السبورة بعد مراجعة المثال في هذه الصفحة. اعرض أمام الطالب المثال التالي وهو تطبيق مباشر على النتيجة (٤) في الصفحة ٣٧ من كتاب الطالب: نقش معهم الإجابة وكيفية إثبات أن رباعي دائري باستخدام هذه النتيجة.

$$\text{ا} \overset{\circ}{\text{ب}} \text{ ج} \overset{\circ}{\text{د}}, \text{ م} \overset{\circ}{\text{ن}} \text{ ج} \overset{\circ}{\text{ل}} \text{ رباعي حيث } \text{ج} \in \text{ن} \text{ د}.$$

هل ب دل ن هو رباعي دائري؟ فسر إجابتك.

الحل: $\text{ن}(\text{د} \overset{\circ}{\text{ب}} \text{ ل}) = \text{ن}(\text{د} \overset{\circ}{\text{n}} \text{ ل}) = 45^\circ$
حيث إن دل هي قاعدة مشتركة للزوايتين وهم تقعان في ناحية واحدة منها.
لذا: دل ن هو رباعي دائري.

٦ الرابط

لا يوجد.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخاطئ الطالب في تحديد موقع نقطة مع شروط محددة بالنسبة إلى الدائرة.

ساعد الطالب من خلال أمثلة متعددة على تحظى هذه المشكلة.

٨ التقييم

راقب الطالب باهتمام وهم يتعاملون مع فقرات «حاول أن تخل» لتكون فكرة واضحة عن مدى استيعابهم مفاهيم هذا الدرس ومهاراته.

مثال (٥)

في الشكل المقابل، أثبت أن: $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{م}} \text{ د}) = \frac{1}{2}(\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{A}} \text{ C}) + \text{ن}(\text{ج} \overset{\circ}{\text{D}}))$.

الحل:
المعطيات: أ، ب، ج، د نقاط تنتهي إلى الدائرة التي مركزها. $\text{أ} \overset{\circ}{\text{ج}} \text{ د} = \text{م}$. $\text{ب} \overset{\circ}{\text{ج}} \text{ د} = \text{ن}$. $\text{أ} \overset{\circ}{\text{B}} \text{ C} = \text{A}$. $\text{ج} \overset{\circ}{\text{D}} \text{ D} = \text{D}$.
المطلوب: إثبات أن $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{M}} \text{ D}) = \frac{1}{2}(\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{A}} \text{ C}) + \text{ن}(\text{ج} \overset{\circ}{\text{D}}))$.
الرهان: $(\text{ب} \overset{\circ}{\text{M}} \text{ D})$ هي زاوية خارجية عن المثلث $\text{A} \text{ M} \text{ D}$.
 $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{M}} \text{ D}) = \text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{A}} \text{ C}) + \text{ن}(\text{ج} \overset{\circ}{\text{D}})$.
 $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{M}} \text{ D}) = \frac{1}{2}(\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{A}} \text{ C}) + \text{ن}(\text{ج} \overset{\circ}{\text{D}}))$.
حاول أن تخل
في المثال (٥)، أثبت أن $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{M}} \text{ D}) = \frac{1}{2}(\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{A}} \text{ C}) + \text{ن}(\text{ج} \overset{\circ}{\text{D}}))$.

مثال (٦)

أثبت أن $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{D}} \text{ L}) = \text{ن}(\text{D} \overset{\circ}{\text{N}} \text{ L})$.

الحل:
المعطيات: أ، ب، ج، د، م، ن، ل، ملائمة. $\text{أ} \overset{\circ}{\text{J}} \text{ D} = \text{L}$. $\text{B} \overset{\circ}{\text{J}} \text{ D} = \text{N}$.
المطلوب: إثبات تساوي قياسي الزاويتين $(\text{ب} \overset{\circ}{\text{D}} \text{ L})$ ، $(\text{D} \overset{\circ}{\text{N}} \text{ L})$.
الرهان: أ ب ج د مثلث رباعي دائري.
المطلوب: $(\text{ب} \overset{\circ}{\text{D}} \text{ L}) = \text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{D}} \text{ L})$.
 $(\text{D} \overset{\circ}{\text{N}} \text{ L}) = \text{ن}(\text{D} \overset{\circ}{\text{N}} \text{ L})$.
 $(\text{ب} \overset{\circ}{\text{D}} \text{ L}) = \text{ن}(\text{D} \overset{\circ}{\text{N}} \text{ L})$.
من (١)، (٢) تستنتج أن $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{D}} \text{ L}) = \text{ن}(\text{D} \overset{\circ}{\text{N}} \text{ L})$.
حاول أن تخل
في المثال (٦)، أثبت أن $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{D}} \text{ L}) = \text{ن}(\text{D} \overset{\circ}{\text{N}} \text{ L})$.

٣٦

(٤) في الشكل المقابل، أوجد قياس كل من:
(١) القوس الأصغر $\text{ج} \overset{\circ}{\text{B}}$.
(٢) $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{C}} \text{ D})$.
(٣) $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{G}} \text{ D})$.

(٥) في الشكل المقابل فيه الوتر $\text{B} \overset{\circ}{\text{C}}$.
أثبت أن: $\text{أ} \overset{\circ}{\text{B}} \text{ ج} \cong \text{ب} \overset{\circ}{\text{D}}$.

(٦) ما نوع شبه المترافق المحاط بدائرة؟

(٧) في الشكل المقابل أوجد $\text{ن}(\text{ج} \overset{\circ}{\text{D}} \text{ B})$.


(٨) في الشكل المقابل، أوجد قياس القوس الأصغر $\text{أ} \overset{\circ}{\text{B}}$.

(٩) مستخدماً معلميات الشكل، حيث وهي مركز الدائرة،
و $\text{ن}(\text{ب} \overset{\circ}{\text{C}} \text{ D}) = 2$ سم، $\text{ن}(\text{ج} \overset{\circ}{\text{E}} \text{ F}) = 3$ سم.
أوجد:
(١) $\text{ن}(\text{H} \overset{\circ}{\text{G}} \text{ N})$.
(٢) $\text{ن}(\text{J} \overset{\circ}{\text{N}} \text{ L})$.


١٧

اختبار سريع

- ١ في الشكل المقابل، ومركز الدائرة ب
 $\angle M \hat{B} = 30^\circ$
 أوجد $M(L \hat{M} B)$
 $M(B \hat{W} M)$



- ٢ في الشكل المقابل، ومركز الدائرة A
 الدائرة ABD معدة زسدياسي
 منتظم محاط بالدائرة.
 أوجد $D(D \hat{W} H)$.



٩ إجابات وحلول

دعنا نفك ونناقش»

٥ - ١ تحقق من عمل الطالب.

«حاول أن تخل»

٥٧٠

٣

٥١٨


٢

٥٣٥

١

١٠) في الشكل المقابل إذا كان \hat{A} منصف الزاوية \hat{A} .

(أ) أثبت أن المثلث BDC جد متطابق الضلعين.




(ب) ماذا يمكننا أن نقول عن $\triangle BDC$ إذا كان $\triangle BDC$ قائم الزاوية في $\triangle BDC$ ؟


١١) مستخدماً معطيات الشكل المقابل حيث ومركز الدائرة:

(أ) ما نوع المثلث RLT ؟

(ب) أوجد $M(L \hat{R} T)$.




(ج) أوجد محيط TRL بدلالة r .



١٢) أب قطري دائرة مركزها O . C ، G ، H ماسان للدائرة يتقاطعون في G .

أثبت أن \hat{C} / \hat{H} . (إرشاد: صل WT أو BT).




١٣) في الشكل المقابل، $A \hat{B} = 6$ سم، و $W \hat{S} = 6$. أوجد:

(أ) طول نصف قطر الدائرة.


(ب) قياس القوس الصغير AB .

١٤) إذا كان \hat{A} قطري دائرة التي مركزها O . G الدائرة،
 أثبت أن $M(\hat{A} \hat{B})$ زاوية قائمة.



١٥) س ص رباعي دائري.

أثبت أن $M(S \hat{C} M) + M(L \hat{C} S) = 180^\circ$.



نتائج


١ كل زوايا محيطيتين في دائرة تحصران القوس نفسه بتطابقان.

٢ كل زاوية محيطية في دائرة تحصر نصف دائرة تكون زاوية قائمة.

٣ كل رباعي دائري (محاط بدائرة) تكون زواياه المقابلة متساوية.

٤ في الشكل إذا طبقت الزوايا \hat{A} ، \hat{B} المرسومات على القاعدة بجدوى

جهة واحدة منها، كان الشكل AB جد رباعي دائري.




أثبت $M(\hat{A} \hat{B})$ (نصف دائرة)

$\therefore M(\hat{A} \hat{B}) + M(\hat{C} \hat{D}) = 180^\circ$

أثبت $(\hat{A} \hat{G})$ زاوية محيطية مرسمة على قطر

الدائرة وهي زاوية قائمة



أثبت $M(\hat{A} \hat{B})$ (نصف دائرة)

$\therefore M(\hat{A} \hat{B}) + M(\hat{C} \hat{D}) = 180^\circ$


أثبت $(\hat{A} \hat{G})$ زاوية محيطية مرسمة على قطر

الدائرة وهي زاوية قائمة

$$\text{نـ (جـ) } = 60^\circ \quad \text{نـ (بـ) } = 60^\circ$$

$$\text{نـ (دـ) } = \frac{1}{2} \text{ نـ (بـ)}$$

٥ بـ جـ هي زاوية خارجية في المثلث بـ جـ هـ .
نـ كـ بـ (بـ جـ) = نـ (جـ هـ) + نـ (هـ جـ).



$$\frac{1}{2} \text{ نـ (بـ)} = \text{نـ (جـ هـ)} + \frac{1}{2} \text{ نـ (جـ)}$$

$$\text{وـ مـ نـ: } \text{نـ (بـ هـ)} = \frac{1}{2} \text{ نـ (بـ)} - \frac{1}{2} \text{ نـ (جـ)}$$

$$= \frac{\text{نـ (بـ)} - \text{نـ (جـ)}}{2}$$

مثال (٨)

أـ قـ طـ فـ في دـاـرـةـ مـرـكـزـهاـ وـ. نـرـسـمـ أـجـ مـمـاـشـ لـلـدـاـرـةـ بـجـيـتـ يـكـونـ

$$\angle B = 2x$$

الـجـلـ: بـ جـ تـقـطـعـ الدـاـرـةـ فـيـ دـ. أـلـيـتـ أـنـ $\angle A = \angle C$.

الـمـعـلـيـاتـ: أـقـ طـ فـ في دـاـرـةـ مـرـكـزـهاـ وـ. أـجـ مـاسـ لـلـدـاـرـةـ، $\angle A = 2x$, بـ جـ تـقـطـعـ الدـاـرـةـ فـيـ دـ.

الـمـطـلـوبـ: أـلـيـتـ أـنـ $\angle A = \angle C$

الـجـلـ: نـرـسـمـ أـجـ

الـبرـهـانـ:

$\text{نـ (بـ جـ)} = \text{نـ (أـجـ دـ)}$ (نظـرـيـةـ الزـاوـيـةـ الـمـسـاـبـةـ وـ الـزاـوـيـةـ الـمـحـيـطـيـةـ الـمـشـتـرـكـةـ مـعـهـاـ فـيـ الـقوـسـ نـفـسـهـ) (١)

$\text{أـجـ جـ} = \frac{1}{2} \text{ بـ جـ}$

$\text{أـجـ جـ} = \frac{1}{2} \text{ بـ جـ}$

$\therefore \Delta AGB \cong \Delta CGB$ (أـجـ جـ مـتـبـاـيـنـ الضـلـعـيـنـ)

وـ مـنـهـ $\text{نـ (أـجـ جـ)} = \text{نـ (أـجـ دـ)}$ (٢)

مـنـ (١), (٢) نـسـتـجـ $\text{نـ (أـجـ جـ)} = \text{نـ (أـجـ دـ)}$

$\Delta AGB \cong \Delta CGB$ (أـجـ جـ مـتـبـاـيـنـ الضـلـعـيـنـ) $\therefore \angle A = \angle C$

حاـولـ انـ تـحلـ

أـثـيـتـ أـنـ $\Delta AML \cong \Delta CML$ (أـلـيـتـ أـنـ M مـسـاـشـ لـلـدـاـرـةـ مـرـكـزـهاـ وـ M وـ تـرـيـ فيـ الدـاـرـةـ بـجـيـتـ يـكـونـ $M = L$. (مـ نـقطـةـ الـمـاسـ) تـنـ تـقـطـعـ الدـاـرـةـ فـيـ L)

مثال (٩)

فيـ الشـكـلـ المـقـابـلـ، دـمـ مـاسـ لـلـدـاـرـةـ عـنـ النـقـطـةـ Mـ.

أـجـ جـورـ فيـ الدـاـرـةـ موـازـ لـلـمـاسـ دـمـ.


أـلـيـتـ أـنـ الـمـلـكـتـ أـجـ جـ مـتـبـاـيـنـ الضـلـعـيـنـ.

الـجـلـ: دـمـ مـاسـ لـلـدـاـرـةـ عـنـ النـقـطـةـ Mـ $\therefore \angle D = \angle B$

الـمـعـلـيـاتـ: دـمـ مـاسـ لـلـدـاـرـةـ عـنـ النـقـطـةـ Mـ $\therefore \angle D = \angle B$

الـمـطـلـوبـ: أـلـيـتـ أـنـ $\Delta ABD \cong \Delta CBD$

٤٠



(٢) أـوجـدـ قـيـاسـ الـمـجهـولـ فـيـ كـلـ مـنـ الـأـشـكـالـ التـالـيـةـ بـعـلـمـوـهـ أـنـ الشـعـاعـ فـيـ كـلـ شـكـلـ يـمـلـعـ عـاـشـلـاـ لـلـدـاـرـةـ.



(٣) فـيـ الشـكـلـ المـقـابـلـ، أـوجـدـ قـيـاسـ الـقـوـسـ الأـصـغـرـ بـ.



$$\begin{aligned} \text{نـ (لـ بـ)} + \text{نـ (هـ بـ)} &= \text{نـ (بـ دـ)} + \text{نـ (لـ بـ)} \\ \therefore \text{نـ (هـ بـ)} &= \text{نـ (بـ دـ)} \\ \text{وـ لـكـنـ} \text{نـ (بـ دـ)} &= \text{نـ (بـ مـ)} \\ \therefore \text{نـ (هـ بـ)} &= \text{نـ (بـ مـ)} \text{ وـ هـوـ الـمـطـلـوبـ} \end{aligned}$$

برهان (٢):

$\text{نـ (هـ بـ)} = \text{نـ (بـ مـ)}$ من (١).

خاصـيـةـ الـزاـوـيـةـ الـمـحـيـطـيـةـ:

$\therefore \text{نـ (بـ مـ)} = \frac{1}{2} \text{ نـ (بـ كـ)}$

$\therefore \text{نـ (هـ بـ)} = \frac{1}{2} \text{ نـ (بـ كـ)} \text{ وـ هـوـ الـمـطـلـوبـ}$

مثال (٧)

فيـ الشـكـلـ المـقـابـلـ إـذـاـ كانـ دـمـ مـاسـ لـلـدـاـرـةـ عـنـ ١ـ، فـأـوجـدـ بـ(جـأـبـ).

الـجـلـ: دـمـ مـاسـ لـلـدـاـرـةـ عـنـ ١ـ.

الـمـعـلـيـاتـ: دـمـ مـاسـ لـلـدـاـرـةـ عـنـ ١ـ

$\text{نـ (هـ أـبـ)} = 45^\circ$ نـظـرـيـةـ

$\therefore \text{نـ (جـ أـبـ)} + \text{نـ (جـ بـ)} + \text{نـ (بـ جـ)} = 180^\circ$

$\therefore \text{نـ (جـ أـبـ)} = 180^\circ - \text{نـ (جـ بـ)} - \text{نـ (بـ جـ)}$

$\therefore \text{نـ (جـ أـبـ)} = 180^\circ - 45^\circ - 35^\circ = 100^\circ$

حاـولـ انـ تـحلـ


٧ فيـ الشـكـلـ المـقـابـلـ، لـدـيـنـ: $\text{نـ (أـجـ)} = 40^\circ$, $\text{نـ (هـ أـبـ)} = 50^\circ$

أـوجـدـ قـيـاسـ زـواـيـةـ الـمـلـكـتـ بـ جـ

أـثـيـتـ أـنـ جـ بـ قـطـرـ لـلـدـاـرـةـ.


١٩

٣٩




البرهان
..
 $\therefore \text{ن}(\text{د}\hat{\text{ج}}\text{ب}) = \text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ب}})$
 $\therefore \text{ن}(\text{د}\hat{\text{أج}}) = \text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ج}})$ (١)
زاوية ساقية وزاوية محاطة تحيطان نفس القوس نفسه $\text{ج}\hat{\text{ج}}$. (٢)
(١)، (٢) تتطابق: $\text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ج}}\text{ب}) = \text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ب}}\text{ج})$
ومنه: $\text{ج}\hat{\text{ج}} = \text{ج}\hat{\text{ب}}$
أي أن المثلث متطابقان الصاعدين
حاول أن تحل
في الشكل المقابل، إذا كان لدينا $\text{د}\hat{\text{م}}$ ماس للدائرة عند النقطة م .
المثلث أب ج متطابقان الصاعدين ($\text{أب} = \text{ج}\hat{\text{ج}}$).
أثبت أن $\text{د}\hat{\text{م}} // \text{ب ج}$.


٤١




(٤) $\text{أب ج د رباعي دائري (محوط بدائرة)}.$ $\text{ن}(\text{ج}) = ٥٧٠$, $\text{ن}(\text{ب}) = ٥١٣٠$ = .
أوجد $\text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ج}})$, $\text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ب}})$.




(٥) $\Delta \text{أب ج}$ متطابقان الأضلاع عبّط به دائرة.



(٦) في الشكل المقابل، إذا كان $\text{ن}(\text{ب}\hat{\text{ج}}) = ٥٧٢$, $\text{ن}(\text{ب ج}\hat{\text{ه}}) = ٥٥١$
فإن قياس القوس $\text{ه}\hat{\text{ج}} = ?$
 $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٧٢$ (ج) $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٦٨$ (د) $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٧٢$ (ب) $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٩٠$ (أ) $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٣٠$ (ج).



(٧) في الشكل المقابل، إذا كان $\text{ن}(\text{ب}\hat{\text{د}}) = ٥١٤٠$, فإن $\text{ن}(\text{ب}\hat{\text{ج}}) = ?$
 $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٧٠$ (ج) $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٥٦$ (د) $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٠$ (ب) $\text{ن}(\text{ب}) = ٥١٢٤$ (أ).



(٨) في الشكل المقابل، قيمة كل من س، ص على الترتيب هما:
 $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٣٥$, $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٧٠$ (ب) $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٤٠$, $\text{ن}(\text{ب}) = ٥١٤٠$ (ج) $\text{ن}(\text{ب}) = ٥٤٠$, $\text{ن}(\text{ب}) = ٥١٤٠$ (د).

٤٠

٦ $\text{ن}(\text{أب ج}\hat{\text{ب}}) = \frac{1}{2} \text{ن}(\text{أب ج})$.

٧ $\text{ن}(\text{ج}\hat{\text{أب}}) = ٥١٨٠ - (٥٥٠ + ٥٤٠)$.

$\text{ن}(\text{ج}\hat{\text{أب}}) = ٥٩٠$

$\text{ن}(\text{ج}) = \text{ن}(\text{ه}\hat{\text{أب}}) = ٥٥٠$

$\text{ن}(\text{ب}) = \text{ن}(\text{د}\hat{\text{أج}}) = ٥٤٠$

(ب) بما أن الزاوية المحيطية $\text{ج}\hat{\text{ب}}$ قياسها ٥٩٠

فيكون $\text{ن}(\text{ب}\hat{\text{ج}}) = ٥١٨٠$ وبالتالي أب ج هو

قطر للدائرة.

٨ $\text{ت م ماس على الدائرة. م ت} = \text{م}$, لذا المثلث م ت ن متطابقان الصاعدين ومنه: $\text{ن}(\text{ت}) = \text{ن}(\text{م})$ ولكن n هي زاوية خارجية في المثلث م ن ت لذا:

$\text{ن}(\text{n}) = \text{ن}(\text{ت}) =$

$\text{ن}(\text{n م ل}) + \text{ن}(\text{n ل م})$

$$\frac{\text{ن}(\text{n ل}) + \text{ن}(\text{n م})}{2} = \frac{\text{ن}(\text{م ل})}{2} = \text{ن}(\text{م ل})$$

وأيضاً $\text{ن}(\text{ت م ل}) = \text{ن}(\text{ت م ل})$.
 $\therefore \text{ن}(\text{ل ت م}) = \text{ن}(\text{ت م ل})$ والمثلث ل ت م متطابقان

الصاعدين $\therefore \text{ل ت} = \text{ل م}$

٩ $\text{ن}(\text{ج}) = \text{ن}(\text{ب})$ (أب ج) مثلث متطابقان الصاعدين

ومنه: $\text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ج}}) = \text{ن}(\text{أب ج})$

$\text{ن}(\text{د}\hat{\text{أج}}) = \text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ج}}) = \frac{1}{2} \text{ن}(\text{أب ج})$

الزواياتان متبادلتان داخلياً ومتتساوياًقياساً، فيكون $\text{د}\hat{\text{ه}} \leftrightarrow \text{مواز}\hat{\text{ل}} \text{ب ج}$.

«تدريب ١»

$\text{ن}(\text{أب ج}\hat{\text{ب}}) = \frac{1}{2} \text{ن}(\text{أب ج}) = ٥٩٠ = ٥١٨٠ \times \frac{1}{3}$

«تدريب ٢»

$\text{ن}(\text{ل س}\hat{\text{ص}}) + \text{ن}(\text{ل ع}\hat{\text{ص}}) = \frac{1}{2} \text{ن}(\text{ل ع ص})$

$٥١٨٠ = ٥٣٦٠ \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{ن}(\text{ل س}\hat{\text{ص}})$

«تدريب ٣»

$\text{ن}(\text{أب ج}\hat{\text{ب}}) = \frac{1}{2} \text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ب}})$

$\text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ه}}\text{ب}) = \frac{1}{2} \text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ب}})$

$\therefore \text{ن}(\text{أب ج}\hat{\text{ب}}) = \text{ن}(\text{ج}\hat{\text{ه}}\text{ب})$

٦-٤: الدائرة: الأوتار المتقطعة، المماس

٤-١

الدائرة: الأوتار المتقطعة، المماس Circle: Intersecting Chords and Tangent

سوف تتعلم

- الأوتار المتقطعة.
- المماس.
- العلاقة بين وترتين متقطعتين داخل الدائرة.
- العلاقة بين طول القطع المماسي وطول القاطع.

عمل تعاوني

- ١ ارسم دائرة مركبها، ثم ارسم وترتين دد، بج يتقاطعان في نقطة أ.
- ٢ قس طول أب، أجد، هـ، آه.
- ٣ أوجد نوائح الضرب أب × أجد × آه.
- ٤ كرر الرسم والقياس واكتب مالاحظه.
- ٥ حاول أن تكتشف علاقة ما بين نوائح الضرب.
- ٦ خذن العلاقة بين نوائح ضرب أطوال الأجزاء التي ينقسم إليها وتران متقطعتان في دائرة.

الأدوات المستخدمة:

مسطرة، مثلث، فرجار

٣ من نقطة خارج دائرة ارسم أب ج يقطع الدائرة في ب، ج ثم مماشًا للدائرة آن يسمى في د. ابحث عن العلاقة بين أب × أجد (آن) مستنيدًا من تجربتك السابقة.


Intersecting Chords Inside the Circle

١ - تقاطع الأوتار داخل الدائرة


نظريّة (١)

إذا تقاطعت وتران داخل دائرة، فإن نوائح ضرب طولي جزءي أحد الوترتين يساوي نوائح ضرب طولي جزءي الوتر الآخر.

آن × ب = دن × ج



٤٢



برهان نظرية (١)
المطلبات: أب، جد وتران متقطعتان في النقطة ن.
المطلوب: إثبات أن: آن × ب = دن × ج × ن د.
العمل: نرسم أجد، بـ د.
البرهان:


$$\begin{aligned} آن(A\hat{C}\hat{G}) &= دن(D\hat{C}\hat{B}) \\ آن(آج) &= دن(ج) \\ آن &= دن \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} آن \times ب &= دن \times ج \\ آن \times ب &= آن \times ج \times ن د \end{aligned}$$

$$\therefore آن \times ب = دن \times ج \times ن د$$

زاوية مقابلان بالرأس
زاوية محيطيان مرسومتان على القوس آن نفسه

طريق الروابي
تناسب أطوال الأضلاع المتناظرة في المثلثين المتشابهين



مثال (١)

في الشكل المقابل، أوجد قيمة س.

الحل:

$$آن \times ب = دن \times ج$$

$$7 \times 2 = س \times 2$$

$$14 = 2س$$

$$س = 7$$

$$س = \frac{14}{2}$$

$$س = 7$$

حاول أن تحل

في الشكل المقابل، أوجد قيمة س.

١ الأهداف

- يوجد العلاقة بين أطوال أجزاء الأوتار المتقطعة داخل الدائرة.
- يوجد العلاقة بين أطوال أجزاء الأوتار المتقطعة خارج الدائرة.
- يوجد العلاقة بين طول قطعة مماسية للدائرة وأطوال أجزاء القاطع من الدائرة.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

مماس - قاطع.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة - فرجار - منقلة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show)

٤ التمهيد


أسأل الطلاب:

- ما هي حالات تشابه مثلثين؟
- ما قياس الزاوية بين المماس ونصف قطر الدائرة عند نقطة المماس؟
- ما العلاقة بين قياس الزاوية المرسومة من مماس ووتر على الدائرة وقياس القوس المحصور بين هذين الضلعين؟

٤٣

٥ التدريس

حُفِّز الطلاب على رسم
دوائر متعددة واطلب
إليهم رسم أوتار متقطعة
بزوايا مختلفة وأوتار
متقطعة متعامدة.



أعطهم بعض القياسات لأجزاء من هذه الأوتار، واطلب
إليهم إيجاد المجهول.

يتعلق المثال (١) بالنظرية (١). شدد على أن ناتج ضرب
طولي القطعتين ثابت عندما تتغير النقاط A, B, C, D على
الدائرة، شرط أن تبقى النقطة N ثابتة.

في المثال (٣)

ساعد الطلاب على فهم النتيجة (١) ليتعرفوا على العلاقة
الموجودة.

برهان نتيجة (١)

المعطيات: M, B, M, D قاطعان يلتقيان في النقطة N خارج الدائرة.

المطلوب: إثبات أن $M \times B = M \times D$

العمل: نرسم AD, CB.

البرهان: المثلثان MAD, MCB فيهما:

$$\angle(MAD) = \angle(MCB)$$

$$\angle(MCD) = \angle(MBC)$$

$$\therefore \Delta MAD \sim \Delta MCB$$

$$\frac{M}{M} = \frac{D}{B}$$

$$M \times M = M \times D$$

$$\therefore M \times B = M \times D$$

برهان نتيجة (٢)


المعطيات: دائرة مركزها O، MD قطعة ماسية، MC قاطع

المطلوب: إثبات أن $(MD)^2 = MB \times MJ$


البرهان: $\Delta DBM \sim \Delta JDM$

\hat{M} زاوية مشتركة

$$\angle(MDB) = \angle(DJM)$$



مثال (٢)
هندسة معمارية: أثني جسر مشاة لمبور أحد الأنبار وكان
على شكل قوس دائرة مع دعامات جانبية. وهذه الدعامات مهمة لأنها
تحمّل كل نقل الجسر.



الحل:
المطابقات: طول الوتر = ٢١ م

المطلوب: إيجاد طول قطر الدائرة

البرهان: الممود المنصف لوتر يمر بمركز الدائرة (نظريه)

..
Δ DCB في الدائرة.

من تقاطع القطر والوتر نجد أن:

$$DC \times CB = DB \times BA$$

$$45 \times 45 = 45 \times 45$$

$$DC = 45 \text{ مترًا}$$

$$CB = 43 \text{ مترًا}$$

$$DB = 43 \text{ مترًا}$$

$$DC = 117 \text{ مترًا}$$

$$\text{طول القطر} = 117 \text{ مترًا تقريباً}$$

طريق الحل:

في الدائرة المقابلة التي مر بها:

$$DC = 6 \text{ سم}, CB = 3 \text{ سم}, DB = 3 \text{ سم}, BA = 6 \text{ سم}.$$


أوجد قيمة س.

أوجد المعدن بين المركز والوتر D.

إذا علمت أن طول نصف قطر الدائرة يساوي 6 سم.

٢ - تقاطع الأوتار خارج الدائرة

نتيجة (١)



[إذا رسم قاطعاً من نقطة خارج دائرة، فإن ناتج ضرب طول أحد القاطعين في طول جزءه
الخارجي يساوي ناتج ضرب طول القاطع الآخر في طول جزءه الخارجي.
 $M \times B = M \times D$.

٤٤




التاريخ الميلادي: التاريخ المجري:

الدائرة: الأوتار المتقطعة، المسار

Circle: Intersecting Chords and Tangent

المجموعة ١ تمارين أساسية



(٢) في الشكل المقابل:

لـ كـ عاصي الدائرة.

لـ كـ ٨؛ لـ M.


أوجد: M, N.

$$N = 15$$

$$M = 25$$

أوجد: D.

في التمرين (٣-٤)، أوجد قيمة كل متغير.



(٤)

في التمرين (٤-٥)، أوجد طول قطر كل دائرة.

(٥)

في التمرين (٦-٧)، استخدم معطيات الشكل لإيجاد قيمة كل من: ص، ض.

(٦)

في التمرين (٦-٧)، استخدم معطيات الشكل لإيجاد قيمة كل من: ص، ض.

(٧)

في التمرين (٨-٧)، استخدم معطيات الشكل لإيجاد قيمة كل من: ص، ض.

(٨)

٤٤

$$\frac{م}{م} \cdot \frac{ب}{ب} = \frac{م}{م} \cdot \frac{د}{د}$$

نكتب التناوب $\frac{م}{م} \cdot \frac{ب}{ب}$ ومنه نأخذ: $\frac{م}{م} \cdot \frac{د}{د}$

باستخدام الضرب التقاطعي نجد:

$$(م \cdot د)^2 = م \cdot ب \times م \cdot ج$$

في المثال (٤)، اطلب إليهم إيجاد طول قطعة الماس من نقطة إلى الدائرة.

$$\text{أو جد } د، \text{ إذا كان } م = ٥، م \cdot ب = ٢٠.$$


يرتبط المثال (٤) بالنتيجة (٢). أشر إلى أن:

$$(م \cdot د)^2 = م \times د = م \cdot ج \times م \cdot د = \dots$$


يمكن رسم أكثر من قاطع للدائرة يمر في $م$ ويبقى ناتج الضرب نفسه.

٦ الرابط


انظر المثال (٢)، بنيت بعض الجسور، منذ القدم، على شكل قوس من دائرة. ويتنوع بناء هذه الجسور وفق المسافة المسموح بها. كلما صغرت المسافة صغر طول الوتر الذي بين طرفي الجسر، وصعب عبوره. الاتجاه الحالي في بناء الجسور هو تكبير طول الوتر، وهكذا يصبح عبوره أسهل.




(٤) تخليل الخطأ: لإيجاد قيمة $س$ كتب أحد الطلاب المعادلة التالية:
أ. في الخطأ الذي وقع به؟




(٥) في الشكل أدناه:
 $ل = ٩$ ، $هـ = ٤٠$ ، $هـ جـ = ٣٨$.
أوجد $هـ جـ$.




(٦) أ. في الماس للدائرة عند جـ.
هـ متضمن الوتر لـ.
أثبت أن: $م \parallel جـ$.



(٧) أوجد قيمة $س$.



(٨) في الماس للدائرة: أ. في الماس للدائرة.
 $ل = ١٢$ ، $هـ = ٨$ ، $هـ جـ = ١٠$.
أوجد $هـ جـ$.
ب) أوجد $هـ$.



(٩) في الشكل المقابل، أوجد قيمة $س$.
الحل:

المعطيات: $ب = ٤$ ، $د = ٨$ وتران للدائرة التي مركزها ويتقاطع امتدادهما خارجها عند النقطة $م$.

المطلوب: إيجاد قيمة $س$ من:

البرهان:

$$س = م \times د = (س + ٤) \times ٨ = ٤٨ - س$$

$$س = \frac{48 - س}{8} = 6 - \frac{س}{8}$$

$$س = 6 - 8 = -2$$

فتكون قيمة $س = 6$ لأن $س = 8$ مرفوضة

حاول أن تحل

(١٠) في الشكل المقابل، دائرة مركزها $و$. طول نصف قطرها يساوي ٤ سم.
أوجد قيمة $س$.

٣ - تقاطع ماس وقاطع دائرة من نقطة خارج دائرة

Intersection Between Tangent and Secant from any Point Outside of a Circle


(١١) إزارسم من نقطة خارج دائرة قاطع ومساس، فإن ناتج ضرب طول القاطع في طول جزءه الخارجي يساوي مربع طول القطعة الماسية.
 $(م \cdot د)^2 = م \cdot ب \times م \cdot جـ$.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطالب في استخدام العلاقة بين أجزاء القواعط على الدائرة من نقطة خارج الدائرة، فيكتبون:

$$م \times ب \times ج = م \times ه \times و.$$

أعد رسم المثلثين المتشابهين، واطلب إليهم استخدام ألوان مختلفة لكل مثلث ليروا جيداً الأضلاع المتناظرة ونتائج الضرب التقاطعي.



ألفت انتباه الطلاب إلى القراءة دائمًا من نقطة التقاطع M فيكون:

$$م \times ج = م \times ه \times و$$


حتى لو كان التقاطع داخليًا وبالتالي ستقل نسبة الخطأ.

٨ التقييم

تابع الطلاب وهم يحلون فقرات «حاول أن تحل» لتأكد من صحة استخدامهم هذه العلاقات.



اختبار سريع

١ في الشكل المقابل أوجد M . $247 \approx 4,9$ سم



٢ في الشكل المقابل أوجد قيمة S .

٦ سم



الحل: جبرياً
المعطيات: $أ = 4$ سم، $د = 9$ سم، $ب$ قطعة متساوية.
المطلوب: إيجاد طول $أب$.
البرهان:
 $(أب)^2 = أ^2 + ج^2$
 $(أب)^2 = 4^2 + 9^2$
 $(أب)^2 = 36$
 $أب = 6$
فيكون طول $أب$ يساوي 6 سم
نتيجة
بالتوسيع
بالتبسيط
بإيجاد الجذر التربيعي
حاول أن تحل


٥

في المثال (٥). أوجد طول نصف قطر الدائرة إذا كانت $ه = 2$ سم.


٤٧

المجموعة ب تمارين تعزيزية


١) في الشكل أدناه:
 $أب$ مماس للدائرة.
 $أب = 6$ ، $ج = 5$.
أوجد $أد$ ، $جـد$.
٢) في الشكل أدناه:
 $أب = 3$ ، $ه = 4$ ، $ج = 5$.
أوجد $هـب$.




٣) في المثلفين (٣)، أوجد قيمة كل من S ، C .




٤) أوجد طول قطر الدائرة،
استخدم الشكل المقابل للإجابة.



٥) في الشكل المقابل، إذا كان $أك = 14$ ، $هـك = 17$ ، $بـك = 7$.
أوجد $دـك$.



٦) في الشكل المقابل،
 $أب$ مماس للدائرة، $أب = 12$ ، $جـد = 32$.
أوجد $أجـ$.



٤٣

٩ إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

١ ، ٢ ، ٣ تحقق من عمل الطالب.

«حاول أن تحل»

$$1 \quad س = 36, س = 6.$$

$$2 \quad (أ) س = 8 \text{ سم}$$

$$(ب) \frac{د}{ج} = \frac{11}{2} = 5,5 \text{ سم}$$

$$\text{البعد} = \sqrt{(5,75)} - \sqrt{(5,5)} = 7\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \text{ سم}.$$

$$3 \quad س \approx 4,2 \text{ سم}$$

$$4 \quad 11 \times 3 = 33 \text{ سم} \quad (أ) س = 25 \text{ سم}.$$

$$4 \quad هـ ج = 100 \quad (ب) 5 + 5 هـ ج = 100.$$


$$5 \quad نـ هـ = 8 \text{ سم} \quad (ج) 2 + 2 نـ هـ = 36.$$

٨) في الشكل المقابل، بـ هـ، دـ جـ يتقاطعان في لـ.

جـ بـ ، دـ هـ يتقاطعان في مـ.

أثبت أن:


(١) لـ جـ = لـ هـ عـلـيـ بـانـ: دـ لـ = جـ بـ.



* (ب) بـ جـ = دـ هـ عـلـيـ بـانـ: دـ بـ = جـ دـ.

المرشد لحل المسائل

مخطط تنظيمي للوحدة السادسة



٤٩

إجابة «مسألة إضافية»

و \overline{AT} نـ

إذا كان نصف قطر قطر في الدائرة عمودياً على وتر في الدائرة، فإنه يمر في منتصف هذا الوتر.
وبالتالي، \overline{A} هي منتصف الوتر \overline{N} .


ملخص

- المساس دائرة هو مستقيم في المستوى ينطاطع مع الدائرة في نقطة واحدة.
- إذا كان مستقيم مماساً للدائرة، فإنه يكون متعمداً مع نصف القطر المار بهذه النقطة.
- إذا تعادل مستقيم مع نصف قطر دائرة وكانت نقطته التعادل تقع على الدائرة، تكون المستقيم مماساً للدائرة.
- إذا تناطع مسامان دائرة في نقطة، تكون القطعتان المماسيتان متطابقتين.
- الدائرة المحاطة بمثلث هي دائرة مماسة لأضلاع المثلث من الداخل ومركزها تقع في تقاطع مساقط الزوايا الداخلية للمثلث.
- في دائرة أو في دوار متطابقة:

 - لزوايا المركزية المتطابقة أوتار متطابقة.
 - الأوتار المتطابقة تقابل أقواساً متطابقة.
 - للأقواس المتطابقة في دائرة زوايا مركزية متطابقة.
 - الأوتار المتطابقة في دائرة هي على أبعد متساوية من مركز الدائرة.
 - في الدائرة: القطر العمودي على وتر ينصفه وينصف كلّاً من قوسيه.
 - القطر الذي ينصف وتراً ليس (ليس) عمودي على الوتر.
 - المعدو المنصف لوتر يمر بمركز الدائرة.
 - الزوايا المركزية زوايا رأسها مركز الدائرة.
 - الزوايا المحاطة زوايا رأسها إحدى نقاط دائرة وضلوعها يقطعان الدائرة.
 - قياس الزاوية المركزية يساوي قياس القوس المحصور بين ضلعيها.
 - قياس الزاوية المحاطة يساوي نصف قياس القوس المحصور بين ضلعيها.
 - كل زاويتين محاطتين تحصراً في قوس نفسه متطابقتان.
 - كل زاوية محاطة تحصر نصف دائرة هي زاوية قائمة.
 - كل شكل رباعي دائري (محاط دائرة) تكون زواياه المقابلة مكاملات، أي كل زاويتين م مقابلتين في مكاملاتان.
 - الزاوية المكونة من مmas ووتر تسمى زاوية مماسية، وقياسها يساوي نصف قياس القوس المحصور بين المساس والوتر.

٤٩

المرشد لحل المسائل



تذكر:
إذا تناطع مسامان دائرة
في نقطة، تكون القطعتان
المماسيتان متطابقتين.

(خاصية المسامين المتطابقين على الدائرة)

فكرة هندسية:
نقطة منحرفة على القوس الأصغر $\overset{\frown}{AB}$.
مساس دائرة في يقطع $\overset{\frown}{AB}$ في A ، B ، في D .
ساق سلوى:
أين نضع D بحيث يكون محيط المثلث $\triangle ABC$ هو أكبر ما يمكن؟


نقطة ثابتة:
استخدم خواص مسام الدائرة.
محيط المثلث $= \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$
 $= جم - جم + جم + جم - جم$
ولكن، $جم = جم + جم = جم$
 $- جم + جم = جم$
 $- جم + جم = جم$
 \therefore محيط المثلث $= جم + جم + جم = 2 جم$.

انتاج:


محيط $\triangle ABC$ ثابت ولا يتغير مع تغير موقع النقطة D .

مسألة إضافية:


$\odot O$ ، دائرة متحدة المركز O .
نقطة على $\odot O$.
مساس AD المار في يقطع $\odot O$ في N .
أثبت أن M منتصف DN .




٤٨




(١٤) في الشكل المقابل، أوجد قيمة \widehat{B} جد.



(١٥) في الشكل المقابل، أوجد قيمة m .



(١٦) أوجد محيط المثلث ABC جد.



(١٧) أوجد $p(n)$.



(١٨) في الشكل المقابل، $\triangle ABC$ مت恰恰يق الأضلاع.

أوجد:

- $n(m, b)$.
 $n(b, m)$.
 $n(m, h)$.
 $n(h, m)$.


٢٧

مراجعة الوحدة السادسة

في التمرين (١-٢)، لفرض أن الخطوط التي تندو مماسة هي مماس للدائرة، أوجد قيمة m .



(١)



(٢)

في التمرين (٣-٤)، أوجد قيمة m .



(٣)




(٤)

في التمرين (٥-٦)، أوجد قياس القوس \widehat{AB} .



(٥)



(٦)

- إذا تقاطع وتران داخل دائرة، فإن ناتج ضرب طولي جزءٍ يُحَدِّد الوترتين يساوي ناتج ضرب طولي جزءٍ يُحَدِّد الوتر الآخر.
- إذا رسم قطاعان من نقطة خارج دائرة، فإن ناتج ضرب طول أحد القطاعين في طول جزءه الخارجي يساوي ناتج ضرب طول القاطع الآخر في طول جزءه الخارجي.
- إذا رسم من نقطة خارج دائرة مماس وقاطع، فإن ناتج ضرب طول القاطع في طول جزءه الخارجي يساوي مربع طول القطعة المماسية.

٥١

(٧) في الشكل المقابل، أوجد قيمة z .



(٨) وتر في دائرة طوله ٤، ٤ سم ويبعد ٨ سم عن مركز الدائرة.



في طول نصف قطر الدائرة؟


في التمارين (٩-١٢)، الخط الذي يدرك مماس هو مماس للدائرة أوجد قيمتي m ، n في كل مما يلي:




(٩)



(١٠)



(١٢)



(١١)



(١٣) في الشكل المقابل، أوجد قيمة m .

تمارين إثرائية


(١) (د)، (د') دائرتان في نقطة مماس خارجية.

بـ جـ قاطع يمر بالنقطة أـ ويقطع الدائرة (د)

بالنقطة بـ ويقطع الدائرة (د') بالنقطة جـ.

أثبت أن الماس من النقطة بـ للدائرة (د) موازي للماس


من النقطة جـ للدائرة (د').



(٢) (د)، (د')، (د'') ثالث دوائر متطابقة ومرائزها على الترتيب أـ بـ جـ.

تتقاطع الدوائر الثلاث في النقطة المشتركة هـ.

ماذلما تمثل النقطة هـ بالنسبة إلى المثلث أـ بـ جـ؟ المرحـ.




(٣) أـ بـ جـ مثلثـ هـ مركزـ الدائرةـ المحاطـةـ بـ المثلـثـ أـ بـ جـ

نقطـةـ تقـاطـعـ منـصـفـاتـ الزـواـيـاـ الدـاخـلـيـةـ فـيـ المـثـلـثـ أـ بـ جـ.


$$n(\text{بـ جـ}) = 90^\circ - 135^\circ = 15^\circ$$

أـثـبـتـ أـنـ المـثـلـثـ أـ بـ جـ قـائـمـ الزـاوـيـةـ فـيـ جـ.




(٤) أـ بـ جـ دـ نقاطـ عـلـىـ الدـائـرـةـ مـرـكـزـهـاـ وـ حـيـثـ n(\text{أـ بـ}) = n(\text{جـ بـ}) = 60^\circ

أـثـبـتـ أـنـ: أـ جـ / جـ بـ.



(٥) فـيـ الشـكـلـ المـقـابـلـ أـ بـ جـ دـ شـيـهـ مـنـحـرـ فـ مـتـطـابـقـ الضـلـعـيـنـ.

أـثـبـتـ أـنـهـ ربـاعـيـ دائـريـ.



Matrices

الوحدة السابعة: المصفوفات

قسمت الدروس في هذه الوحدة إلى أجزاء.

٧ - ١: تنظيم البيانات في مصفوفات

جزء ١: ربط البيانات بالمصفوفات.

جزء ٢: أنواع المصفوفات ورتبها.

جزء ٣: المصفوفات المتساوية.

٧ - ٢: جمع وطرح المصفوفات

جزء ١: جمع المصفوفات.

جزء ٢: طرح المصفوفات.

جزء ٣: حل المعادلات المصفوفية.

٧ - ٣: ضرب المصفوفات

جزء ١: ضرب عدد في مصفوفة.

جزء ٢: ضرب المصفوفات.

٧ - ٤: مصفوفات الوحدة والنظير الضري (المعكوسات)

جزء ١: إيجاد النظير الضري.

جزء ٢: محدد مصفوفة مربعة من الدرجة الثانية.

٧ - ٥: حل نظام من معادلين خطيين

جزء ١: الحل باستخدام المعكوس الضري للمصفوفة.

جزء ٢: الحل باستخدام قاعدة كرامر.

مقدمة الوحدة

الوحدة السابعة

المصفوفات
Matrices

متوبيات المركب في التربة (ملجم/ كجم)

العينة	ب	ت	ي	س
١	٠,٠٦	٠,٩٥	٠,٩	١٠,٥
٢	٠,٠٦	٠,٠٧٣	١,٠٥	١٣,٥
٣	٠,٠٦	٦	٠,٣٦	٤٩
٤	٠,٢٢	٠,١٩	٠,٢	١٩,٥
٥	٠,١١	٠,٨٢	٢,٥	٢٦

مشروع الوحدة: المعالجة الحيوية (Biotherapy).

١ مقدمة المشروع: يعتبر تسرير الزيت والمواد الكيميائية إلى السباء الحيوية من أهم خواص المرض الحديث، كما وتستخدم الكثيرة في مجال المعالجة الحيوية التي تكون طبيعياً في محظى بيئية للحد من هذه الأخطاء.

٢ الهدف: عند العمل في هذه الوحدة، سوف تحلل بيانات المشروع، وسوف تعالجها، وستخدم الناتج لرسم المحتويات وتقديرها، ومن ثم سوف تبحث عن مصادر مشاريع أخرى.

٣ في النهاية، سوف تلخص ما ستجده وتوضح للمساعدة في تكميل المشروع.

٤ اللازم: الله حاسبة بيانية.

٥ أسلحة حرب التطبيقات: يوضح الجدول بيانات من تأثير تحليل العيناء لخمس عينات عشوائية من التربة نفسها، في أحد شاريع المعالجة الحيوية، وجدوا التالي من حاضر المنتجات البربرية الخطيرة: العين (١)، العين (٢)، العين (٣)، العين (٤)، العين (٥)، وفي العينة الخامسة (٦) استخدم المصفوفات لحساب نقصان كل مركب في كل عينة.

٦ التغير: حق يبحث عن موقع النقاط التي تتضمن خطورة، والتي تتم معالجتها حيوانياً، ما مدى اتساع الموضع؟ ما طرق المعالجة الأخرى التي يمكن استخدامها بخلاف المعالجة الحيوية؟

اكتسب فنوات قليلاً تلخص بذلك وتنضم ببيانات عن الموقع كلما أمكن.

دروس الوحدة

حل نظام من معادلين خططيتين	حل مصفوفات الوحدة	مصفوفات الضربي والنظر الضربي (المعكوسات)	ضرب المصفوفات	جمع وطرح المصفوفات	نظم البيانات في مصفوفات
٥-٧	٤-٧	٣-٧	٢-٧	١-٧	

يبني الطلاب في هذه الوحدة مفاهيم تتعلق بكيفية تنظيم البيانات الإحصائية في مصفوفات لإيجاد حلول لسائلات حياتية، وتوفير فرصة لاتخاذ قرارات مبنية على توقعات محددة.

سوف يتم ذلك من خلال جمع المصفوفات أو طرحها أو ضربها في عدد حقيقي أو ضربها في بعضها بعضًا بحسب ما يتطلب الموقف وال الحاجة.

اعرض أمام الطلاب بعض البيانات المنظمة في جداول. اطلب إليهم تحديد أي من هذه البيانات يقع في صفو، وأي منها يقع في أعمدة، وأي منها يقع في صفو وأعمدة.

مشروع الوحدة

يوفر هذا المشروع فرصة كبيرة أمام الطلاب للتعرف إلى المصفوفات واستخدامها في تنظيم البيانات الإحصائية عن المعالجات الحيوية والتي هي إحدى المشاكل البيئية في هذا العصر.

من خلال العمليات على المصفوفات، سوف يقوم الطلاب بحساب التغيرات في كميات المخلفات الموجودة، ثم ببحث مشاريع معالجة حيوية أخرى وتلخيصها وعرض ما توصلوا إليه.

الوحدة السابعة

أضف إلى معلوماتك

يستخدم الناس في أغلب المجالات، البيانات العربية في قاعدة منتظمة، وإحدى طرق تنظيم البيانات بصورة مختصرة هي كتابتها في صورة مصفوفة، بذلك تستطيع جمع المصفوفات وطرحها وعرضها، كما يمكن استخدام ذلك للحصول على معلومات إضافية تساعد في اتخاذ القرارات،تاريخياً استخدمت المصفوفات لحل رسائل مشفرة، كما ويمكن استخدام خبر المصفوفات في سائل وتطبيقات حياتية.

- أين أنت الآن (العراك السارقة المكتسبة)
- تعلمت تنشيل العلاقات باستخدام المتغيرات .
- تعلمت بسيط العبارات الجبرية المتضمنة أعداداً صحيحة وكسرواً وإيجاد قيمتها.

- تعلمت تنشيل معادلات من متغيرين .
- تعلمت رسم المعادلات والمبارات بيانياً.
- تعلمت رسم نظام من المعادلات أو البيانات بيانياً.

ماذا سوف تتعلم؟

- سوف تستخدم المصفوفات لتنظيم البيانات.
- سوف تعرف المصفوفات المترابطة.
- سوف تستخدم جمل المصفوفات وطرحها لحل معادلات المصفوفات في مواقف حياتية.
- سوف تستخدم ضرب المصفوفات لحل سائل حياتية.
- سوف تستخدم معكوسات المصفوفات لعمل معادلات المصفوفات في سائل حياتية.
- سوف تحل نظاماً من معادلين خطيين باستخدام قاعدة كرامر.



المطلبات الأساسية

مصفوفة - أعددة - صنفوف - عنصر المصفوفة - العناصر المتاظرة - مصفوفة الجمع - المصفوفة الصغرية - العنصر المحايد الجماعي - العدد القاسي - مصفوفات القراء - مصفوفة المربعة - مصفوفة الوحدة - النظير الضري للمصفوفة (معكوس المصفوفة) - قاعدة كرامر - تحديد المصفوفة.

٥٣

- أسأل الطلاب ما إذا كانوا قد تواجهوا في موقع قد تم تنظيفه من بقع زيت أو نفط أو بقايا مواد كيماوية.

- وضح للطلاب أن مجال المعالجة الحيوية يستخدم البكتيريا الموجودة في الطبيعة لتفكيك المخلفات الضارة.

- أسأل الطلاب ما إذا قاموا بإعداد قائمة بالمواد التي سوف يحتاجون إليها في المشروع.

- حفز الطلاب على إيجاد المزيد من المعلومات في مجال المعالجة الحيوية من شبكة الإنترنت أو أي مصادر أخرى.

سلم التقييم

٤. الحسابات صحيحة، المصفوفات واضحة ودقيقة، الشرح معبرة، التقرير مفصل ومفيد.

٣. معظم الحسابات صحيحة، ومعظم المصفوفات واضحة ودقيقة، الشرح بحاجة إلى بعض الإيضاح، التقرير مفصل مع بعض الأخطاء.

٢. يوجد أخطاء كثيرة في الحسابات، بعض المصفوفات واضحة ودقيقة، الشرح غامضة، التقرير غير مفهوم.

١. معظم عناصر المشروع غير كاملة.

١-٧: تنظيم البيانات في مصفوفات

تنظيم البيانات في مصفوفات Organising Data Into Matrices

١-٧



تعريف
المصفوفة هي تظمن من الأعداد المرتبة في صفوف وأعمدة.

الأعداد المكونة للمصفوفة تسمى عناصر .
Dimension of a Matrix **رتبة المصفوفة**

ترمز إلى المصفوفة بأحد حروف الهجاء وتضع تحت خطأ، تكتب $\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$ ونقرأ **المصفوفة** .

عدد الصنوف (م) وعدد الأعمدة (ن) يهدان **رتبة المصفوفة** وتنكتب \times .
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = 3 \times 3$.

ملاحظة: الكتابة رتبة المصفوفة تكتب أولًا عدد الصنوف يليه عدد الأعمدة.

٥٤

الأهداف

- ينظم البيانات الإحصائية في مصفوفات.
- يوجد رتبة مصفوفة.
- يتعرف أنواع المصفوفات.
- يحل معادلات باستخدام المصفوفات المتساوية.

المفردات والمفاهيم الجديدة

بيانات إحصائية - مصفوفة - رتبة مصفوفة - صفوف -
 أعمدة - مصفوفة مربعة - مصفوفة أفقية - مصفوفة عمودية -
 - مصفوفات متساوية.

الآلات والوسائل

آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show).

التمهيد

- طلب إلى الطالب تنظيم قوائم بكل الواقع التي سبق أن رأوا فيها بيانات معروضة مشابهة للبيان في فقرة «عمل تعاوني»، مثل بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك حسب أقسام الإنفاق الرئيسية.

- طلب إليهم حل المعادلة: $4s + 3s = 7$

التاريخ الميلادي: التاريخ المجري:

١-٧

تنظيم البيانات في مصفوفات Organising Data in Matrices

المجموعة ١: تمارين أساسية

في الترينين (١) - (٢)، اذكر رتبة كل مصفوفة.

(١) $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

(٢) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$

حدد ما إذا كان زوج المصفوفات متساوياً أم لا. على إيجابك.

(٣) $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$

اذكر رتبة (أبعاد) المصفوفة، مع ذكر العصر $\begin{pmatrix} \cdot \end{pmatrix}$.

(٤) $\begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 7 & 3 & 2 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(٥) أي زوج من المقادير التالية يحقق ما يلي: $s - m = b$ ؟

(أ) $s = 2$, $m = \frac{1}{3} - b$, $c = \frac{1}{3} + b$
 (ب) $s = \frac{1}{3} + b$, $m = 2$, $c = \frac{1}{3} - b$

(ج) $s = \frac{1}{3} - b$, $m = 2$, $c = \frac{1}{3} + b$
 (د) $s = 2$, $m = \frac{1}{3} + b$, $c = \frac{1}{3} - b$

في الترينين (٦)، أوجد قيمة كل من s , m , c .

(٦) $\begin{bmatrix} s & m & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 6 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

٣٠

أشر في البدء إلى أن الجداول والتمثيلات البيانية هي طرائق لتنظيم البيانات الإحصائية ومنها يمكن الدخول إلى تنظيم هذه البيانات في مصفوفات.

أكّد لهم أن الجداول والتمثيلات البيانية والمصفوفات جميعها يمكن أن تمثل المعلومات نفسها ولكن بأشكال مختلفة. اطلب إليهم تنظيم الجدول في فقرة «عمل تعاوني» على شكل مصفوفة.

اسأّلهم عن عدد الصفوف وأعمدة هذه المصفوفة وعن رتبتها وعما إذا كان بالإمكان تنظيم هذا الجدول بمصفوفة ثانية مختلفة عن الأولى وعن عدد صفوف وأعمدة ورتبة المصفوفة الثانية.

١٥١,١	١٤٦,٠
١٨٥,٩	١٧٢,٠
١٦٩,١	١٦٣,٢
١٥٩,٨	١٥٤,٨
١٥١,٢	١٤٨,٢
١٣٩,٨	١٣٧,٣

الرتبة: 2×6

١٣٧,٣	١٤٨,٢	١٥٤,٨	١٦٣,٢	١٧٢,٠	١٤٦,٠
١٣٩,٨	١٥١,٢	١٥٩,٨	١٦٩,١	١٨٥,٩	١٥١,١

الرتبة: 6×2

مثال (١) اكتب رتبة كل مصفوفة مما يلي:


$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$
---	---	---

الحل: تكون المصفوفة من ٣ صفوف و٣ أعمدة: المصفوفة من الرتبة ٣.
تكون المصفوفة من صف واحد وأعمدة: المصفوفة من الرتبة ١.
تكون المصفوفة من ٤ صفوف وعمود واحد: المصفوفة من الرتبة ٤.


حاول أن تحل

مثال (٢) اكتب رتبة كل مصفوفة مما يلي:

$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 5 & 1 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 & 3 & 8 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 4 \\ 7 & 0 & 2 \end{bmatrix}$
--	---	--



٥٥



(٨) تحليل الخطأ: حدد أحد الطلاب أن العنصر $a_{1,1}$ في المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 4,5 & 2,0 & 3 \\ 3- & 5 & 1,5 \\ 1,0 & 4,0 & 4 \end{bmatrix}$ هو ما خطأ الطالب؟

في التصرين (٩ - ١٠)، أرجد قيم المتغيرات بحيث تكون المصفوفتان متزاولتين.

$$(9) \begin{bmatrix} 3 & 12 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5-2 \\ 10+2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2-5 & 4 \\ 2 & 1-3 & 0 \\ 15 & 10- & 0 \end{bmatrix}$$

$$(10) \begin{bmatrix} 19+4 & 5+4 & 2 \\ 2 & 3-3 & 0 \\ 15 & 10- & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2-5 & 4 \\ 2 & 1-3 & 0 \\ 15 & 10- & 0 \end{bmatrix}$$

٣١

في المثال (٢)

الجيواهات/ ساعة هي وحدة لقياس السعر الحراري؛ أي إنتاج الطاقة أو الجهد المساوي للجهد المبذول بجيواهات من الطاقة خلال ساعة. جيواهات واحد في الساعة يساوي 6×3^9 جول. الجول وحدة قياس سُميت باسم عالم الفيزياء البريطاني جيمس جول (١٨١٨ - ١٨٨٩) والذي قام بتطوير نظرية تنص على أن السعرات الحرارية تستحق من الجهد بعض النظر عن شكله سواء أكان جهداً كيميائياً أو ميكانيكياً أو كهربائياً. ساعد الطالب على أن يتذكروا أن 6×3^9 تساوي 360000000 .

أشير إلى أن ترتيب البلدان في المصفوفة يمكن أن يكون الترتيب نفسه للبلدان في الرسم البياني. اطلب إلى الطالب أن يضع كل منهم إحدى أصابعه على البلد في الرسم، وإصبعاً آخر على البلد نفسه في المصفوفة لمقارنته البيانات.

اطلب إليهم كتابة المصفوفة بطريقة ثانية.

	الكويت	الإمارات	البحرين
إنتاج	٤٥٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٠٠٠٠
استهلاك	٦٥٠٠٠	٤٠٠٠٠	١٠٠٠٠

مصفوفة برتبة: 3×2

في المثال (٦)

أكدد للطالب أن المصفوفتين متساويتان في حال كانت جميع العناصر المتناظرة متساوية.

يجب التأكد من أن كافة عناصر المصفوفتين متساوية قبل البدء بحل المعادلات لإيجاد المجهول.

الحل:

افتراض أن كل حرف في المصفوفة يمثل دولة، وكل عمود يمثل مستوى الإنتاج أو الاستهلاك.

استنتج عناصر المصفوفة من الآتي:

الاستهلاك	الإنتاج	الكويت
٤٠٠٠	٤٥٠٠	الكويت
٦٥٠٠	٧٠٠٠	الإمارات
١٠٠٠	١٠٠٠	البحرين

حاول أن تحل

- ١ وضَعَ كُلَّ بِكُلٍّ تَعْدِيلَ المَسْفُوفَةِ لِتَشْكِلَ الْبَيَانَاتِ الَّتِي أَذِنْتُ لَهَا دُولَ آخِرَةٍ.
- ٢ أَعْدِ كَاتِبَةَ عَنَاصِرَ المَسْفُوفَةِ السَّابِقَةِ فِي مَسْفُوفَةِ مِنَ الرِّتْبَةِ 3×3 .
- ٣ ضَعِّ عَوَانَّاً لِلصَّفْوَفَ والأَمْدَدَ.
- ٤ وَضَعِّفِيَّةَ بَيْنَ الصَّفْوَفَيْنِ الَّتِي رَتَبَاهُ جَدَّ وَالصَّفْوَفَ الَّتِي رَتَبَاهُ جَوَ.

تمثيل عناصر المصفوفة

يحدد أي عنصر في المصفوفة بدلالة رقمي الصنف والمument الواقع فيها، فمثلاً، في المصفوفة A العنصر الذي في الصنف الأول والمument الثالث ترمز إليه بالرمز $A_{1,3}$ (الصنف الأول والمument الثالث).

العنصر في الصنف الأول والمument الثالث:	$A_{1,3}$
$A_{1,1}$	$A_{1,2}$
$A_{2,1}$	$A_{2,2}$
$A_{3,1}$	$A_{3,2}$
$A_{4,1}$	$A_{4,2}$

٥٦

المجموعة بـ تمارين تعزيزية

في التمرين (٢-٤)، اذكر رتبة كل مصفوفة مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

في التمرين (٤-٦)، حدد ما إذا كان كل زوج من المصفوفات التالية متساوياً لا. على إجابتك.

$$\begin{bmatrix} (1, 5) & (2, 1) \\ (0, 2) & (2, 0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad (4)$$

في التمرين (٦-٨)، اذكر رتبة كل مصفوفة، مع ذكر قيمة العنصر الموضح.

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (5)$$

في التمرين (٨-٧)، استخدم الجدول أدناه.

عدد التليفزيونات المستخدمة في إحدى الدول بالbillions					
	الربع/ السنة				
١٩٩٣	١٩٩٠	١٩٨٧	١٩٨٤	١٩٨٢	١٩٨٠
٩٨	٩٦	٩٣	٨٨	٨٥	٨٢
٢٠	٣١	٣٦	٤٣	٤٧	٥١
	مليون				
	أبيض وأسود				

(٧) وضح البيانات في صورة مصفوفة حيث المصفوف تمثل نوع التليفزيون، والأعمدة تمثل السنوات.

وأوجد A^T . ماذا يمثل؟

٣٢

٦ الرابط

في المثال (٢)، تقوم الدول بحملات إرشاد في استهلاك الطاقة حماية للبيئة من التلوث والانبعاث الحراري.

ناقش مع الطالب كيفية الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية وأثر ذلك على البيئة.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطالب في قراءة البيانات وفق موقعها في المصفوفة أو لا يتمكنون من تعريف موقع عنصر في المصفوفة. ساعدتهم على تحديد معنى كل عنصر في المصفوفة ومرتبته في الصف وفي العمود.

٨ التقييم

تابع الطلاب وهم يحلون فقرات «حاول أن تحل»، تأكد من أن إجاباتهم صحيحة. أرشدهم ما إذا واجهوا مشاكل في حلها.

اختبار سريع

١ اكتب رتبة المصفوفة:

$$4 \times 3 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 5 & -3 & 9 \\ 1 & 6 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

٢ حدد العنصر a_{31}, a_{23}, a_{42} :

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & -5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

إذا كانت $s = 4, c = 5$

فأوجد قيمة كل من s, c

- (٨) اعرض البيانات في مصفوفة بصفوف تُمثل السنوات، وأعمدة تُمثل نوع التليفزيون.
أوجد A ، ووضح ماذا يمثل.

(٩) أوجد قيم كل من s, c .

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 2 \\ 4 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 2 \\ 4 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & -6 & -4 & -2 \\ 10 & -6 & -4 & -2 \\ 10 & -6 & -4 & -2 \\ 10 & -6 & -4 & -2 \end{bmatrix}$$

في التمرين (١٠-١١)، أوجد قيم المتغيرات بحيث تكون المصفوفتان متساويتين.

$$(10) \quad \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & -5 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 15 & 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & -5 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 6 & 6 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(11) \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

٩ إجابات وحلول «عمل تعاوني»

١ $\frac{146,0 - 151,1}{146,0} = 0,0349 \text{ أي } 3,5\%$

٢ المواد الغذائية: ٨٪، الحلويات: ٣٪،

الملابس: ٢٣٪، خدمات المسكن: ٢٪،

سلع وخدمات منزلية: ٨٪، ١٪.

أكبر نسبة زيادة كانت في المواد الغذائية، وأصغر نسبة زيادة كانت في السلع والخدمات المنزلية.

«حاول أن تحل»

١ $3 \times 2 \quad 3 \times 1 \quad 2 \times 3$

٢ $(A) \quad \begin{bmatrix} 10000 & 70000 & 45000 \\ 10000 & 65000 & 40000 \end{bmatrix}$

والاستهلاك.

(ب)

الكويت الإمارات البحرين

$$\begin{array}{c} \text{الإنتاج} \\ \left[\begin{array}{ccc} 10000 & 70000 & 45000 \\ 10000 & 65000 & 40000 \end{array} \right] \\ \text{الاستهلاك} \end{array}$$

(ج) المصفوفة التي رتبتها ج \times د تتضمن ج صفاً، د عموداً.

أما المصفوفة التي رتبتها د \times ج فتتضمن د صفاً، ج عموداً.

معلومة رياضية:
المصفوفة التي جميع عناصرها أصفار تسمى مصفوفة صفرية Zero Matrix ويرمز إليها بالرمز 3×3 .

مثال (٤):
صنف كلًّا من المصفوفات التالية:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \text{أ} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \text{ب}$$

$$\begin{bmatrix} 1,4 & 3 & 2 \\ 0 & 8 & 12 \end{bmatrix} = \text{ج} \quad \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \text{د}$$

الحل:

أ: مصفوفة مربعة.

ب: مصفوفة عمودية.

ج: مصفوفة أفقية.

د: مصفوفة مستطيلة.

حاول أن تحل

٤ صنف المصفوفات في المثال (١).

المصفوفات المتساوية: Equal Matrices

تكون مصفوفتان متساويتين إذا كانت لهما الرتبة (الأبعاد) نفسها، وكانت عناصرهما المتناظرة متساوية والعكس صحيح.

المصفوفة التي عدد صفوفها (ج)، وعدد عمدهتها (د) هي من الرتبة ج \times د.

معلومة رياضية:
كل عصرين لها المربع نفسه في المصفوفتين اللتين لها الرتبة نفسها يسميان عصرين متناظرين.

٥٨

٣ ب٢٣ = ٠ (صفر)

٤ مصفوفة مربعة، بـ: مصفوفة أفقية،

جـ: مصفوفة عمودية.

٥ كـلا. لأن العناصر المتناظرة ليست متساوية.

$$٦ (أ) س = ٣٨ - ٨ = ٣٠ \quad (أ) س = ٣٠$$

$$٦ (ب) س = ٤ - ١٠ = -٦ \quad (ب) س = ٤ - ٩ = -٥$$

$$٦ (ج) س + ص = ٤ \quad (ج) س + ص = ٧$$

للتتحقق: س - ص = ٧ - ٣ = ٤

مثال (٥)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{3}{4} \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 75 \\ 2 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

الحل:

كل من $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ لهما صيغان وعمودان، وعناصرهما المتناظرة متساوية، وبالتالي فالمصفوفتان متساويتان.

حاول أن تحل

٥ هل المصفوفتان متساويتان؟ نعم.

$$\begin{bmatrix} 9 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \text{مس}$$

والآن، يمكنك أن تستخدم تعريف المصفوفات المتساوية لحل المعادلات.

مثال (٦)

$$\begin{bmatrix} 18+3 & 4 & 25 \\ 12+3 & 3 & 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12+3 & 4 & 25 \\ 12+3 & 3 & 20 \end{bmatrix} \quad \text{فأوجد قيمة كل من س، ص.}$$

الحل:

$$\begin{bmatrix} 18+3 & 4 & 25 \\ 12+3 & 3 & 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12+3 & 4 & 25 \\ 12+3 & 3 & 20 \end{bmatrix}$$

بما أن المصفوفتين متساويتان، فإن عناصرهما المتناظرة متساوية.

$$\begin{array}{l|l} 18+3 = 12+3 & 25 = 20 \\ 6 = 6 & 20 = 20 \\ 3 = 3 & 20 = 20 \\ \text{الحل هو: س = 15، ص = 3} & \end{array}$$

حاول أن تحل

٦ (أ) إذا كانت $\begin{bmatrix} 3 & 5 & 8+5 \\ 4 & 3 & 10-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 8+5 \\ 3 & 3 & 10-3 \end{bmatrix}$ فأوجد قيمة كل من س، ص.

٦ (ب) إذا كانت $[3 س + ص] - [س - ص] = [-9 - 4 - 10]$ فأوجد قيمة كل من س، ص.

٢-٧: جمع وطرح المصفوفات

جمع وطرح المصفوفات Adding and Subtracting Matrices

٥-٧

سوف تتعلم

- جمع المصفوفات
- طرح المصفوفات
- حل المعادلات المصفوفية

عمل تعاوني

إحصائي: أعمل مع زميل لك. استخدم المعلومات في الجدول:

المتوسط الحسابي للدرجات					
الرياضيات		اللغة		السنة	
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
٨٢	٧٦	٨٣	٨٥	٤٠٠	٢٠٠٠
٨٥	٧٤	٨٥	٨٧	٢٠٠١	

معلومات رياضية:

النادر المتنتظر في المصفوفات هي النادر التي لها الموضع نفسه في كل مصفوفة.

أوجد من الجدول مجموع المتوسطين الحسابيين للدرجات الذكور في كل سنة.

أوجد من الجدول مجموع المتوسطين الحسابيين للدرجات الإناث في كل سنة.

اكتب مصفوفة تمثل المتوسط الحسابي للدرجات اللغة للذكور والإثاث خلال الستين. ضع عنواناً لكل من: المصفوفة، وصفوفها، وأعمدتها.

اذكر رتبة هذه المصفوفة.

اكتب مصفوفة تمثل المتوسط الحسابي للدرجات الرياضيات للذكور والإثاث خلال الستين. ضع عنواناً لكل من: المصفوفة، وصفوفها، وأعمدتها.

اذكر رتبة هذه المصفوفة.

بانظر إلى إجابتك عن السؤال الأول والمصفوفات التي كتبتها في السؤالين ٢، ٣، ٤، ٥. اكتب مصفوفة ثالثة تمثل مجموع المتوسطين الحسابيين للدرجات الذكور والإثاث خلال الستين. ضع عنواناً لكل من: المصفوفة، وصفوفها، وأعمدتها.

اذكر رتبة هذه المصفوفة.

استخدم ملاحظاتك وأي أنماط تراها لصياغة طريقة لجمع المصفوفات.

Adding and Subtracting Matrices

جمع وطرح المصفوفات

لجمع مصفوفتين A و B يجب أن تكون من الرتبة نفسها.
نجمع كل عصرين لها الموضع نفسه في A و B . مصفوفة الجمع لها رتبة كل من المصفوفتين A و B .

$$\begin{array}{l} \text{من الرتبة } n, \text{ من الرتبة } m \\ \text{من الرتبة } m, \text{ من الرتبة } n \\ جزء = a_{ij} + b_{ij} \end{array}$$

مثال (١)

$$\begin{bmatrix} 3 & 9 & 2 \\ 7 & 6 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

إذا كانت A مatrix فإن $A + B = B + A$ ، فما رأيك إن A يمكن أن يكون مatrix؟

إذا لم يكن الجمع ممكناً، فاذكر السبب.

الحل:

١. A و B لا يمكن الجمع، لأن رتبة A هي 2×3 لا تساوي رتبة B وهي 2×2 .
٢. A و B يمكن الجمع، لأن المصفوفتين لها رتبة 2×2 .

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 & 4 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & -2 \\ 9 & +2 & -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 7 & 6 & -1 \\ 12 & +7 & 6 & +5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 7 & 5 & -1 \\ 19 & 17 & 11 & 0 \end{bmatrix}$$

رتبة $A + B$ هي 2×4 .

حاول أن تحل

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 5 & 0 \\ 7 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 24 & 12 & 5 \\ 0 & -2 & 3 \\ 10 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

أوجد ناتج ما يلي:

٦١

الأهداف

- يجمع المصفوفات ويطرحها.
- يحل معادلات مصفوفية.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

عناصر متاظرة - خاصية الإغلاق - خاصية الإبدال -
خاصية التجميع - المصفوفة الصفرية - المعكوس الجمعي.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

اكتب على السبورة:

$$(4s + 3c + 6u) + (2s + 4c + 3u)$$

واطلب إلى أحد المتطوعين من الطلاب أن يجد الناتج، ثم اطلب إلى آخر إيجاد الناتج لما يلي:

$$(4s + 3c + 6u) - (2s + 4c + 3u)$$

ذكر الطالب أنه عند جمع تعبيرين أو عند طرحهما يجب جمع الحدود المشابهة أو طرح الحدود المشابهة.

اكتب على السبورة مصفوفتين مثل:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

وناقش مع الطالب كيفية إيجاد:

$$M + B \quad M - B.$$

٥ التدريس

ذكر الطالب بتعريف المتوسط الحسابي للبيانات قبل البدء بالإجابة عن الأسئلة الموجودة في فقرة «عمل تعاوني».

ساعد الطالب على فهم الأسئلة الموجودة في فقرة «عمل تعاوني»، تحول بينهم لتتأكد من إجاباتهم. أسألهم إذا كان بإمكانهمربط بين الإجابات التي حصلوا عليها في السؤالين

- ١ (أ) و ١ (ب) والأسئلة ٢ و ٣.

اطرح عليهم أسئلة مشابهة للسؤال التالي: هل المتوسط الحسابي للإناث في سنة ٢٠٠٠ (لغة ورياضيات) هو نفسه العنصر الأول من الصف الأول من العمود الأول في المصفوفة التي حصلت عليها في السؤال ٤؟

أكّد للطلاب أنه عند جمع المصفوفات أو طرحها يجب دائمًا استخدام العناصر المتناظرة وأن تكون المصفوفات من الرتبة نفسها.

في المثال (٢)، اشرح للطلاب أن هناك ثلاثة لاعبين وخمس لعبات رياضية، لذلك يوجد ثلاث مجموعات من النتائج حيث لكل لاعب نتيجة وبذلك يمكن معرفة اللاعب الفائز في الألعاب الخمس.

٦ الرابط

في المثال (٢)، يستخدم المدربون الرياضيون المصفوفات لعرض النتائج مما يسهل عليهم العمل على الرياضيين لجهة تحسين أدائهم بغية تحقيق مراكز متقدمة في المباريات.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخاطئ الطلاب في جمع أو طرح المصفوفات. شدد على أن يجمع الطلاب أو يطرحوا فقط العناصر المتناظرة في المصفوفات.

٨ التقييم

تابع الطلاب وهم يعملون على فقرات «حاول أن تحل»، تأكد من إجاباتهم وأرشدهم عند الضرورة.

مثال (٢) **تطبيقات حياتية**

الرياضة: في رياضة الخامس الحديث، والتي تجري منافسات فيها على مدار يوم واحد، يكون على كلّ متسابق أو لاعب أن يشارك في الألعاب الخمس: الرماية، المبارزة بالسيف، السباحة، الفروسية، اختراق الصاجة. كون مصفوفة لكلّ لاعب من الجدول التالي ثم أوجد مجموع النقاط التي حصل عليها كلّ لاعب في الألعاب الخمس أثناء منافساتهم في إحدى البطولات.

اللاعب	الرماية	المبارزة بالسيف	سباحة	فروسية	اختراق الصاجة
الأول	١١٥٦	٨١٦	١٢٨٩	٨٨٩	١١٦٨
الثاني	١٠٣٦	٨١٦	١٢٨٠	٨٢٦	١٢١٠
الثالث	١٠٤٤	٧٨	١٢٩٦	٧٧٨	١٢٧٠

الحل:

اكتُب خمس مصفوفات 3×1 ، ثم اجمع المصفوفات:

$$\begin{bmatrix} 1168 \\ 1210 \\ 1270 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 889 \\ 826 \\ 1070 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1188 \\ 1280 \\ 1296 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 816 \\ 816 \\ 778 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1156 \\ 1036 \\ 1044 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1168 \\ 1210 \\ 1270 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 889 \\ 826 \\ 1070 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1188 \\ 1280 \\ 1296 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 816 \\ 816 \\ 778 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1156 \\ 1036 \\ 1044 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5217 \\ 5168 \\ 5328 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1168 + 889 + 1188 + 816 + 1156 \\ 1210 + 826 + 1280 + 816 + 1036 \\ 1270 + 1070 + 1296 + 778 + 1044 \end{bmatrix}$$

وبالتالي فاللاعب الفائز في هذه الألعاب هو اللاعب الثالث.

٦٢

التاريخ الميلادي: التاريخ المجري: التاريخ الميلادي: التاريخ المجري:

٢-٧

جمع وطرح المصفوفات
Adding And Subtracting Matrices

المجموعة ١ تمارين أساسية

في التمارين (١-٢)، أوجد ناتج كل ما يلي:

$$(1) \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(2) \quad \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 6 \\ 2 & -7 \end{bmatrix}$$

في التمارين (٣-٤)، استخدم الحاسوب الذهي أو الورقة والقلم أو الآلة الحاسبة لإيجاد الناتج:

$$(3) \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 10 & 11 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 9 & -6 \\ 7 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

$$(4) \quad \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(5) \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 0,33 \\ 0,15 & 7 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}, \quad \begin{bmatrix} 5 & 4 & \frac{1}{3} & 1 \\ 9 & 8 & \frac{3}{5} & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{11}{2} & \frac{7}{8} & 4 & -2 \\ \frac{1}{11} & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}, \quad \begin{bmatrix} 44 & 3 \\ 0 & 1 \\ 23,3 & 14 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}$$

في التمارين (٩-٥)، اذكر ما إذا كان الجمع أو الطرح ممكّن مع تفسير إجابتك:

٣٤

اختبار سريع

أوجد ناتج كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 14 & 7 \\ 17 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 12 & 0 \end{bmatrix} \quad ①$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 5 \\ 10 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 9 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \quad ②$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 6 \\ 11 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} - \underline{\underline{s}} \quad ③$$

إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

١) ١٦٥؛ ١٧٠ ٢)

٢) ١٦١؛ ١٦١

(١)

إناث ذكور

$$\begin{bmatrix} 83 & 85 \\ 85 & 87 \end{bmatrix} 2000 \quad 2001$$

متوسط درجات اللغة

(ب) رتبة المصفوفة: 2×2

$$\begin{bmatrix} 82 & 76 \\ 85 & 74 \end{bmatrix} 2000 \quad 2001$$

متوسط درجات الرياضيات

(ب) رتبة المصفوفة: 2×2

$$\begin{bmatrix} 165 & 161 \\ 170 & 161 \end{bmatrix} 2000 \quad 2001$$

مجموع المتوسطين الحسابيين لدرجات الذكور والإناث.

(ب) رتبة المصفوفة: 2×2

مثال (٣)

١) وَسْعَ لِمَاذَا لَا تُسْطِعُ أَنْ جُمِعَ الْمُصْفَوَاتِ إِذَا كَانَتْ لَهَا الرِّبَّةُ نَفْسَهَا نَفْطَةً.

٢) اسْتَخْدِمْ جُمِيعَ الْمُصْفَوَاتِ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْعَبَارَةَ التَّالِيَّةَ صَحِيَّةً:

$$\begin{bmatrix} 3-2 \\ 11-10 \\ 4-4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7-3 \\ 2-6 \\ 0-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7-3 \\ 2-6 \\ 0-5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3-2 \\ 11-10 \\ 4-4 \end{bmatrix}$$

معلومات إضافية:

المصفوفة $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ هي النظير الجمعي للمصفوفة $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$.

الحل:

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \dots \dots + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

حاول أن تحل

٣) في المثال (٣)، أوجد $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

٣٩

(٦) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(٧) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(٨) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(٩) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

في المثلدين (١٣-١٠)، أوجد سين في كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 5 & 6 & - \end{bmatrix} = \underline{\underline{s}} + \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} 50 & 5 \\ 10 & 50 \end{bmatrix} = \underline{\underline{s}} - \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 1 & 75 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 9 & 5 & 0 \\ 3 & 8 & 12 \end{bmatrix} = \underline{\underline{s}} - \begin{bmatrix} 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 24 & 13 \\ 24 & -6 & 1 \\ 17 & 4 & 2 \end{bmatrix} = \underline{\underline{s}} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 24 & -6 & 1 \\ 17 & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (13)$$

(١٤) تحليل البيانات: استخدم المعلومات في الجدول مقابل:

(١) ضع البيانات في مصفوفتين. وميز كل مصفوفة.

الشباب المختار لمسارسة الأنشطة في مراكين مختلفتين		
عدد الإناث	عدد الذكور	الحاسوب
٥٧	٥٣	
٥٨	٥٤	الأعمال البدوية
٢٩	٣٩	رياضة بدائية
٦٠	٤١	سباحة

(ب) استخدم الفقرة (١) لإيجاد عدد الشباب (الذكور والإناث) المشترك في كل نشاط بجمع المصفوفتين.

٣٩

٥٤

لجمع المصفوفات يجب أن يكون لها الرتبة نفسها،
ويجب أن نجمع العناصر المتناظرة.

«حاول أن تحل»

$$\begin{bmatrix} 23 & 15 \\ 9 & 8 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

١

(أ) لا يمكن إيجاد ناتج:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

٢

لأن المصفوفة الأولى من الرتبة 2×3 والمصفوفة الثانية من الرتبة 2×2 ، وبالتالي لا يوجد في المصفوفة الأولى عناصر متناظرة مع العمود الثالث في المصفوفة الثانية.

$$\begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 13 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 13 & 16 \end{bmatrix}$$

٣

العناصر المتناظرة هي نفسها.

دوافع جمع المصفوفات

إذا كان A, B, C مصفوفات من الرتبة $m \times n$ فإن:

- خاصية الإغفال (الإملاء)**: $A + B$ هي من الرتبة $m \times n$
- خاصية الإبدال**: $A + B = B + A$
- خاصية التجميع**: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- المصفوفة الصغرى هي المتصدر المحايد الجمسي من الرتبة $m \times n$**
- خاصية المكوس الجمسي (التثبيت الجمسي)**: $A + (-A) = 0$

طريق المصفوفات

يمكن طرح المصفوفات باستخدام خاصية مصفوفة المعكس الجمسي.

إذا كان للمصفوفتين A, B الرتبة نفسها، فإن $A - B = A + (-B)$.

ملاحظة: إذا كان $A \neq B$ ولهمما الرتبة نفسها فإن: $A - B \neq B - A$ وبالتالي، عملية طرح المصفوفات ليست إبدالية.

مثال (٤)

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} = B \quad , \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} = A$$

أوجد $A - B$!

الحل:

الطريقة الأولى:

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} (3+4) & (4+4) & (1+3) \\ (4+4) & (2+1) & (3+(-2)) \\ (2+1) & (-2+(-2)) & (-2+2) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 & 4 \\ 8 & 3 & -1 \\ 3 & -4 & 0 \end{bmatrix} =$$

الطريقة الثانية:

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} = B - A$$

$$\begin{bmatrix} 3-4 & 4-4 & 1-3 \\ 4-4 & 2-1 & 3-(-2) \\ 2-1 & 1-(-2) & -2-2 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & -4 \end{bmatrix} =$$

٦٤

(ج) أوجد عدد الذكور – عدد الإناث المشتركين في كل نشاط.

المجموعة ب تمارين تعزيزية

الحساب الذهني: في النمارين (٤-٤)، أوجد ناتج كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} . & . & . \\ . & . & . \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 7 & 6 & 5 \end{bmatrix} \quad (١)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 6 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (٢)$$

$$\begin{bmatrix} 5 & . & . \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & . & . \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \quad (٣)$$

$$\begin{bmatrix} 9,5 & 0,5 \\ 5,5 & 3,5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9,5 & 0,5 \\ 5,5 & 3,5 \end{bmatrix} \quad (٤)$$

(٥) التصنيع: يوضح الجدول عدد كرات الشاطئ المنتجة في مصنعين ومستويات الإنتاج لفترة عمل واحدة. المصنف الأول يعمل فترتين كل يوم، والمصنف الثاني يعمل ثلاث فترات.

المصنف الثاني	المصنف الأول	
	مطاط	بلاستيك
١٢٠٠	٤٠٠	٧٠٠
١٦٠٠	٦٠٠	١٩٠٠

المصنف الثاني	المصنف الأول	
	لون واحد	ثلاثة ألوان
٥٠٠	٥٠٠	١٣٠٠
٣٠٥	٣٠٥	١٣٠٠

(١) اكتب مصفوفات تتمثل الإنتاج اليومي لكل مصنف.

٣٦

(ب) استخدم النتائج من الفقرة (أ). أوجد ناتج طرح النتج الكلي في المصنف الثاني من النتج الكلي في المصنف الأول.

في التمارين (٨-٦)، استخدم الحساب الذهني أو الورقة والقلم لإيجاد ناتج كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4- \\ 5- & 9 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} \quad (٦)$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 2- \\ 5- & 5- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5- & 2 \\ 0 & 1- \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} \quad (٧)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5- \\ 4- & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 7- \\ 4- & 3- \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} \quad (٨)$$

(٩) السؤال المقترن: صُفت موقعاً يتطلب جمع أو طرح معلومات غيرّة على صورة مصروفات.

في التمارين (١٠-١٢)، اختر الحساب الذهني أو الورقة والقلم أو الآلة الحاسبة لإيجاد ناتج كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 5 & 4- & 3 \\ 2- & 0 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2- \\ 5 & 4- & 1 \\ 10- & 0 & 7 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} \quad (١٠)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 8 \\ 7 & 6- & 5 \\ 1- & 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 1 & 9- \\ 9- & 0 & 5- \\ 2 & 2- & 2 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} \quad (١١)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} \quad (١٢)$$

٣٧

في التمارين (١٣-١٦)، اذكر ما إذا كان الجمع أو الطرح ممكناً أو غير ممكناً:

$$\begin{bmatrix} 2- & 1 \\ 4 & 0, 33 \\ 0, 15 & 7- \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}}, \quad \begin{bmatrix} 5 & 4 & \frac{1}{5} & 1 \\ 9 & 8 & \frac{3}{5} & 2 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{11}{2} & \frac{7}{8} & 4- & 2- \\ \frac{11}{11} & 1- & 2 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}}, \quad \begin{bmatrix} 44 & 3 \\ 23, 3 & 14 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}}$$

$$\underline{\underline{ج}} - \underline{\underline{ج}} = \underline{\underline{ج}} \quad (١٣)$$

$$\underline{\underline{ج}} + \underline{\underline{ج}} = \underline{\underline{ج}} \quad (١٤)$$

$$\underline{\underline{ج}} \cdot \underline{\underline{ج}} = \underline{\underline{ج}} \quad (١٥)$$

$$\underline{\underline{ج}} : \underline{\underline{ج}} = \underline{\underline{ج}} \quad (١٦)$$

في التمارين (٢٠-٢٧)، أوجد $\underline{\underline{س}}$ في كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 6- & 5 \\ 0 & 1 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \underline{\underline{س}} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 4 & 3- \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} \quad (١٧)$$

$$\begin{bmatrix} 13- & 3 & 11 \\ 8 & 9- & 15 \end{bmatrix} = \underline{\underline{س}} - \begin{bmatrix} 1- & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} \quad (١٨)$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 2- & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 2- & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \underline{\underline{س}} = \underline{\underline{ج}} \quad (١٩)$$

$$\begin{bmatrix} 20 & 14 \\ 0 & 5- \\ 19- & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 28 & 17 \\ 2 & 3- \end{bmatrix} + \underline{\underline{س}} = \underline{\underline{ج}} \quad (٢٠)$$

٣٨

$$\begin{bmatrix} 2- & 5 \\ 0 & 1- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 2- \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} + \underline{\underline{س}} \quad (٣)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 7 & 3- \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1- & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 7 & 3- \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} + (\underline{\underline{س}} + \underline{\underline{ج}}) \quad (٤)$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 12- & 10 \\ 2- & 4- & 8- \end{bmatrix} \quad (٥)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 14 & 3- \end{bmatrix} \quad (٦)$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 9 & 2- \end{bmatrix} = \underline{\underline{س}} \quad (٧)$$

$$\begin{bmatrix} 1- & 2- & 2 \\ 4- & 2 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2- & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}} - \underline{\underline{س}}$$

$$\begin{bmatrix} 1- & 2 & 2- \\ 4 & 2 & 1- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-3 & 2-4 & 3-1 \\ 4-2 & 1-(-2) & 2 \end{bmatrix} =$$

حاول أن تحل

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 10 & 6 & - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 9- & 6 \\ 8 & 1 & 2- \end{bmatrix} \quad (٨)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2- & 3 \\ 4 & 2 & - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2- \\ 10 & 1- \end{bmatrix} \quad (٩)$$

حل المعادلات المصفوفية

المعادلة المصفوفية هي معادلة إحدى مصفوفاتها غير معلومة (المتغير).

يمكنك استخدام خواص المساواة لحل المعادلات المصفوفية.

لأي مصفوفات A , B , C , حيث A لها الرتبة نفسها إذا كان $A = B$, فإن: $A + C = B + C$, $A - C = B - C$.

مثال (٥)
حل المعادلة المصفوفية التالية:
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} - \underline{\underline{س}}$$

الحل:
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} - \underline{\underline{س}}$$

بإضافة $\underline{\underline{س}}$ لكل من طرفي المعادلة
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} + \underline{\underline{س}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + \underline{\underline{س}}$$

وبالتالي: $\underline{\underline{س}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 11 & 11 \end{bmatrix}$

حاول أن تحل

أوجد $\underline{\underline{س}}$ حيث:
$$\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 4 & 4- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1- \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \underline{\underline{س}}$$

٣-٧: ضرب المصفوفات

ضرب المصفوفات Matrix Multiplication

٣-٧

سوف تتعلم

- ضرب مصفوفة في عدد
- الضرب القياسي
- ضرب المصفوفات

عمل تعاوني
أعمل مع زميل لك استخدم البيانات في الجدول:

بيانات مطعم		
وجبة ٣	وجبة ٢	وجبة ١
٢,٠٠٠ دينار	١,٧٥٠ دينار	٢,٥٠٠ دينار
٧٥	١٠٠	٥٠
٩ من وجبة الغداء		
٥٠ وجبات الغداء		
٦٥٠ دينار		

١ ما نعم: وجبات الغداء، ١، وجبات الغداء، ٢، وجبات الغداء، ٣؟
 ٢ ما نعم: ثمن الوجبات المباعة؟
 ٣ وضح كيف استخدمت البيانات الموجودة في الجدول لإيجاد الإجابة.

٤ أكتب مصفوفة 3×3 تتضمن ثمن كل وجبة مباعة.
 ٥ أكتب مصفوفة 3×3 تتضمن عدد الوجبات المباعة.
 ٦ الكلية: استخدم الكلمات: (ألف، عدو، عشر) لتصنف إجراءات استخدام المصفوفات التي حصلت عليها، لإيجاد المبلغ بالدينار الذي يبيع به المطعم جميع الوجبات.

Multiplying a Matrix by a Scalar
يمكنك أن تضرب عدد حقيقي في مصفوفة مثل:

$$\begin{bmatrix} 15 \\ 5 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -12 \\ -3 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

الضرب القياسي
الضرب القياسي هو عملية ضرب مصفوفة A في عدد حقيقي k : kA .
 الناتج هو المصفوفة kA .
 نحصل على المصفوفة kA بضرب كل عنصر من A في k .
 إذا كان $k = 0$ ، يكون الناتج مصفوفة صفرية.

٦٦

مثال (١)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix}$ فإن:

$$kA = \begin{bmatrix} 2 \cdot 4 & 1 \cdot -3 & 0 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 & -1 \cdot 4 & -2 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 & 5 \cdot -1 & -1 \cdot -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -3 & 0 \\ 9 & -4 & 0 \\ 0 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$\begin{bmatrix} 20 & -10 & 10 \\ 15 & 20 & 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2 \cdot 4) \cdot 5 & (1 \cdot -3) \cdot 5 & (0 \cdot 2) \cdot 5 \\ (3 \cdot 3) \cdot 5 & (-1 \cdot 4) \cdot 5 & (-2 \cdot 0) \cdot 5 \\ (0 \cdot 0) \cdot 5 & (5 \cdot -1) \cdot 5 & (-1 \cdot -1) \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 & -15 & 0 \\ 45 & -20 & 0 \\ 0 & -25 & 5 \end{bmatrix}$$

حاول أن تحل:
 من المثال (١)، أوجد:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

خاصية الضرب المماثلية

إذا كان a ، b ، c مصفوفات من الريمة $m \times n$. k دعدان قياسان. فإن:

- $k(ab) = (ka)b$: مصفوفة من الريمة $m \times n$
- $(ab)c = a(bc)$: خاصية الأغلاق
- $(k_1 k_2) = k_1 k_2$: خاصية الجمع للضرب
- $k(a + b) = ka + kb$: خاصية التوزيع من اليمين
- $(a + b)k = ak + bk$: خاصية التوزيع من اليسار
- $k(ak) = a(kk) = a^2$: خاصية الضرب في صفر

٦٧

مثال (٢)

الطعام: يخطط مطعم لرفع ثمن كل نوع من الشراب ليصبح مرة ونصف المرأة. فكم سيكون ثمن كل نوع؟ (استخدم لائحة الأسعار في الجدول)

الأسعار في الجدول	حجم صغير	حجم كبير
لين قليل الدسم ٥٠٠ دينار	٣٠٠ دينار	٥٠٠ دينار
عصير البرتقال ٦٠٠ دينار	٩٠٠ دينار	٦٠٠ دينار
عصير المانجو ٨٠٠ دينار	١٢٠٠ دينار	٨٠٠ دينار

٦٨

الأهداف

- يضرب المصفوفة في عدد حقيقي (قياسي).
- يضرب المصفوفات.
- يوجد مربع المصفوفة.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

العدد القياسي - مصفوفة ناتج الضرب.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

اطلب إلى الطالب إيجاد نواتج ما يلي:

- $2s^3 \times 4s^4$.
- $4s^2 \times 3s^3$.
- $7s (3s + 4s)$.
- $3s^3 \times 4s^4 \times 6s^2$.

٥ التدريس

وضح للطلاب أن الخطوات المطلوبة في فقرة «عمل تعاوني» هي ضرورية لفهم عملية ضرب المصفوفات، وأن كتابة المصفوفات في السؤالين (٢) (أ) و (ب) تساعد على الربط بين ضرب المصفوفات والنتائج التي توصلوا إليها في السؤالين (١) و (٢).

أكمل لهم أنه عند ضرب عدد قياسي في مصفوفة، يجب ضرب العدد في كل عناصر المصفوفة وليس فقط في الجانب الأيمن من المصفوفة.

$$\text{مثال ذلك: } k \neq 0 \text{ فإن: } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\underline{k}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\underline{k}} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

خواص الضرب في عدد قياسي تساعد كثيراً على حل معادلات تتضمن مصفوفات كما في المثال (٣).

قبل أن يبدأ الطالب العمل في المثال التمهيدي، اطلب إليهم قراءة عدد الأسئلة التي أجاب عنها ناصر، أحمد وعبد الله في كل مادة ثم التمرين جيداً بدرجة كل سؤال في كل مادة أيضاً وذلك لإيجاد الربط مع الناتج الذي يجدونه مع $\underline{M} \times \underline{B}$ لاحقاً.

ركز في المثال (٤) على أن هذه المصفوفات مختلفة الرتب. ركز على أسباب تلوين الصف والعمود اللذين يجري ضربهما.

أخبرهم أن بإمكانهم القيام بذلك عدة مرات كي يتمكنوا من إجراء ضرب المصفوفات دون الوقوع بالخطأ.

أكّد لهم أن الشرط الأساسي للقيام بضرب مصفوفتين لا يمكن تجاوله فهو أساسى في عملية الضرب. ارسم لهم خططاً بسيطةً كما يلي:

$$\underline{M} \times \underline{n} \times \underline{B} = \underline{J} \times \underline{m} \times \underline{r}$$

اشرح لهم أن بالإمكان إيجاد $\underline{M} \times \underline{B}$ و $\underline{B} \times \underline{r}$ في حالات كثيرة ولكن عموماً $\underline{M} \times \underline{B} \neq \underline{B} \times \underline{r}$. وأحياناً كثيرة يمكن إيجاد $\underline{M} \times \underline{B}$ ولكن لا يمكن إيجاد $\underline{B} \times \underline{r}$. استخدم أمثلة تأكيد ذلك. أخبرهم أن المصفوفة $\underline{M} \times \underline{m}$ هي مصفوفة مربعة أي أن عدد صفوفها يساوي عدد أعمدتها.

الربط ٦

في المثال (٢)، يسمح عرض الأسعار في مصفوفة بدراسة حركة السوق واتخاذ قرارات عن صحة رفع الأسعار ومدى الإفادة منه.

أخطاء متوقعة ومعالجتها ٧

قد يخطئ الطالب في عملية ضرب المصفوفات.

في البدء اطلب إليهم القيام بضرب العناصر المتناظرة في كل صف في العناصر المتناظرة في كل عمود، ثم إجراء عملية الجمع وبعد ذلك وضع الناتج في المكان الصحيح.

$$\begin{bmatrix} 0,450 & 0,750 \\ 0,900 & 1,200 \\ 0,750 & 1,000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0,300), 0,5 & (0,500), 0,5 \\ (0,600), 0,5 & (0,800), 1,0 \\ (0,800), 1,0 & (0,900), 1,5 \end{bmatrix} \times 1,5$$

الحل: ضرب كل عنصر في $1,5$.

سوف يصبح ثمن اللبن $0,750$ دينار، وثمن عصير البرتقال $1,200$ دينار، وثمن عصير البرتقال $1,500$ دينار، وثمن عصير البرتقال $1,800$ دينار، وثمن عصير البرتقال $2,000$ دينار.

حاول أن تحل:

بعد رفع الأسعار، تاقشت مبيعات الشراب في المطعم. وضع صاحب المطعم إعلاناً كتب عليه: تخفيض الأسعار بنسبة $1/20$. وضع الناتج بالأسعار الجديدة.

يمكن استخدام خواص الضرب القىاسي لحل معادلات تتضمن مصفوفات.

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

حل المعادلة: $\underline{M} \times \underline{n} = \underline{M} + \underline{N}$ ، ثم تحقق من إجابتك.

الحل:

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \times 2 & 3 \times 2 \\ 1 \times 2 & 2 \times 2 \\ 0 \times 2 & 1 \times 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

تحقق:

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

٦٨

التاريخ المجري:

ضرب المصفوفات

Matrices Multiplication

المجموعة \underline{M} تمارين أساسية

في التمارين (١-٣)، أوجد ناتج ضرب كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

(٤) أوجد رتبة مصفوفة الضرب، ثم أوجد الناتج.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 \\ 6 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

في التمارين (٩-٥)، حدد ما إذا كان الضرب معروفاً أم لا.

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \underline{B} = \underline{C} = \underline{D} = \underline{E}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \underline{B} = \underline{C} = \underline{D} = \underline{E}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \underline{B} = \underline{C} = \underline{D} = \underline{E}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \underline{B} = \underline{C} = \underline{D} = \underline{E}$$

٣٩

٨ التقييم

تابع الطلاب بدقة وهم يكتبون الإجابات لفقرات «حاول أن تحل». نقاش معهم كل إجابة لتتأكد من أنهم قد فهموا جيداً الضرب في عدد قياسي ومتى يستخدم، وأيضاً ضرب المصفوفات ومتى يستخدم.

٢
 حاول أن تحل

$$\begin{bmatrix} \cdot & 10 \\ 2 & \cdot \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cdot & 10 \\ 2 & \cdot \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\checkmark \quad \begin{bmatrix} \cdot & 10 \\ 2 & \cdot \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 10 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

٣
 حل كل معادلة مما يلي:

$$\begin{bmatrix} \cdot & 2 \\ 4 & \cdot \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = 2$$

$$\begin{bmatrix} 8 & \cdot \\ 10 & 18 - 19 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 - 2 \end{bmatrix} + 3$$

٤
Matrices Multiplying

٥
ضرب المصفوفات

٦
 أجري اختبار للذكاء في مادتي الرياضيات والعلوم لكل من ناصر، أحمد، عبد الله ثم رتب البيانات في صورة مصفوفتين ، ب حيث:

٧

	الرياضيات	العلوم
٢٠	٣٠	٢٠
١٥	٤٠	١٥
٢٥	٢٥	٢٥

٨
 والمصفوفة تمثل عدد الأسئلة الموضوعية التي أجاب عنها كل من الطلاب الثلاثة في كل مادة على حدة.

٩

$$= \begin{bmatrix} \text{درجة الرياضيات لكل سؤال} \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \text{درجة العلم لكل سؤال} \\ 2 \end{bmatrix}$$

١٠
 والمصفوفة هي درجة السؤال في كل من المادتين.

١١
 المطلوب: معرفة مجموع درجات كل طالب منهم في المادتين معاً.

١٢
 الحل:

$$\text{مجموع درجات ناصر في مادتي الرياضيات والعلوم} = 2 \times 20 + 4 \times 30 = 2 \times 20 + 4 \times 30 = 160$$

$$\text{مجموع درجات أحمد في مادتي الرياضيات والعلوم} = 2 \times 15 + 4 \times 40 = 2 \times 15 + 4 \times 40 = 190$$

$$\text{مجموع درجات عبد الله في مادتي الرياضيات والعلوم} = 2 \times 25 + 4 \times 25 = 2 \times 25 + 4 \times 25 = 150$$

١٣
 والآن إذا كتبنا النواتج النهائية في صورة مصفوفة:

١٤

$$\begin{bmatrix} 160 \\ 190 \\ 150 \end{bmatrix}$$

٦٩

اختبار سريع

$$\begin{bmatrix} 8 & 24 & 16 \\ 32 & 40 & 0 \end{bmatrix}$$

١
 أوجد الناتج: $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 5 & 0 \end{bmatrix} \times 8$

$$\begin{bmatrix} 27 \\ 29 \end{bmatrix}$$

٢

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 9 \\ 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 9 & 18 & 27 \\ 4 & 8 & 12 \end{bmatrix}$$

٣

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 9 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 9 \\ 4 \end{bmatrix}$$

٩ إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

١ (أ) ١٢٥ ديناراً؛ ١٧٥ ديناراً؛ ١٥٠ ديناراً.

٢ (أ) $125 + 175 + 150 = 450$ ديناراً.


(ب) إجابة ممكنة: أضرب ثمن كل وجبة في عدد الوجبات ثم أجمع النواتج.

٣ (أ) [٢٠,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٥٠٠]

$$\begin{bmatrix} 50 \\ 100 \\ 75 \end{bmatrix}$$

(ب)

(ج) إجابة ممكنة:



اضرب عناصر كل صف من المصفوفة الأولى في عناصر كل عمود من المصفوفة الثانية بنفس الترتيب. أوجد ناتج كل ضرب ثم أجمع نواتج الضرب أو وظف الألوان للتوضيح.

١
 في التمارين (١٢-١٠)، أوجد ناتج ضرب كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 4 & 1- \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 3 \\ 4- & 7 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1- & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

٢
 (١٣) الاختيار من متعدد: تبين الأعمدة في المصفوفة $\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 12 & 3 \end{bmatrix}$ بالترتيب، عدد الماحي وعدد الأقلام المابعة، وتبين المصفوفة بالترتيب الأعداد المابعة يومي الاثنين والثلاثاء.

٣
 تبين المصفوفة $\begin{bmatrix} 0,000 \\ 2,500 \end{bmatrix}$ ، كلها كل من المحاجة والقلم، ناتج $\begin{bmatrix} 0 \\ 25 \end{bmatrix} \times$ ب يمثل:

٤
 (أ) ثمن كل الماحي المابعة يومي الاثنين والثلاثاء، وثمن الأقلام في هذين اليومين.

٥
 (ب) مجموع ثمن الماحي والأقلام يوم الاثنين، ومجموع ثمنهما يوم الثلاثاء.

٦
 (ج) مجموع ثمن الأقلام والماحي.

٧
 (د) ثمن قلم واحد ومحاجة واحدة

٨
 في التمارين (١٤)، استخدم المصفوفات (١) و (٢)، لتقدير المطلوبة إذا كانت معرفة، وإذا كانت إحدى العمليات غير معرفة فاكتبه (غير معرفة).

$$\begin{bmatrix} 2 & 3- \\ 1 & 5- \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \text{ـ} \quad , \quad \begin{bmatrix} 0 & 5- & 2 \\ 2- & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \text{ـ} \quad , \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1- & 2 \end{bmatrix} = \text{ـ}$$

(١٤) دـ و فـ

٩

$$\begin{bmatrix} 2 & 3- \\ 1 & 5- \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 5- & 2 \\ 2- & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \text{ـ}$$

(١٥) دـ و فـ

٤٠

٥٩

$$75 \times 2,000 + 100 \times 1,750 + 50 \times 2,500$$

«حاول أن تحل»

$$\begin{bmatrix} 26 & 7- & 8- \\ 3 & 21- & 30- \end{bmatrix} = \underline{\underline{4}} \underline{\underline{5}} - \underline{\underline{1}} \quad 1$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 9 & 2 \\ 21 & 2- & 7- \end{bmatrix} = \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} + \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}} \quad 2$$

$$\begin{bmatrix} 0,450 & 0,750 \\ 0,900 & 1,350 \end{bmatrix} \times 0,80$$

$$\begin{bmatrix} 0,360 & 0,600 \\ 0,720 & 1,080 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,600 & 0,960 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \text{مطارة} \quad \text{منبه ضوئي} \quad \text{قنديل} \\ \left[\begin{array}{ccc} 8 & 9 & 10 \\ 6 & 14 & 3 \\ 7 & 5 & 2 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{ccc} 0,300 \\ 0,500,0 \text{ دينار} \\ 0,700 \text{ دينار} \end{array} \right] \quad \begin{array}{c} \text{مطارة} \\ \text{منبه ضوئي} \\ \text{قنديل} \end{array} \\ \text{ـ (١٦) } \quad \text{ـ (١٧) } \end{array}$$

(١٨) تعرض شركة تبيع الخردوات في محلاتها الأسعار في مصفوفة من الدرجة ٣ × ٣ ومبيعات المحال الثلاثة اليومية في مصفوفة من الدرجة ٣ × ٣.

$$\begin{array}{c} \text{المحل} \quad \text{المحل} \quad \text{المحل} \\ \left[\begin{array}{ccc} 8 & 9 & 10 \\ 6 & 14 & 3 \\ 7 & 5 & 2 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{ccc} 0,300 \\ 0,500,0 \text{ دينار} \\ 0,700 \text{ دينار} \end{array} \right] \quad \begin{array}{c} \text{مطارة} \\ \text{منبه ضوئي} \\ \text{قنديل} \end{array} \\ \text{ـ (١) } \quad \text{ـ (٢) } \quad \text{ـ (٣) } \end{array}$$

(أ) أوجد ناتج ضرب المصفوفتين. اشرح ما الذي يمثله.

(ب) كيف يمكن إيجاد المبيع العام في المحال الثلاثة؟

(ج) أوجد مبيع المبيعات الضوئية في المحال الثلاثة.

(١٩) السؤال المفتوح: اكتب مصفوفتين $\underline{\underline{s}}$ ، $\underline{\underline{c}}$ من الدرجة ٢ × ٢ ليست كل العناصر متساوية بحيث يكون $\underline{\underline{s}} \times \underline{\underline{c}} = \underline{\underline{c}} \times \underline{\underline{s}}$.

$$\begin{bmatrix} 9- & 4- \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & 1 \\ 2- & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & * \end{bmatrix} \quad \text{ـ (٢٠) } \quad \text{أوجد قيمة كل من } s, c : \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & * \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & * \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & * \end{bmatrix}$$

٤١

في التمرين (٢١)، استخدم المصفوفات $\underline{\underline{a}}$ ، $\underline{\underline{b}}$ ، $\underline{\underline{c}}$ ، حدد ما إذا كان العبران في الزوج التالي متساوين.

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2- \end{bmatrix} = \underline{\underline{a}} \quad \begin{bmatrix} * & 1- \\ 2- & 3 \end{bmatrix} = \underline{\underline{b}} \quad \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{c}}$$

ـ (٢١) $\underline{\underline{a}} \times \underline{\underline{b}} + \underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{c}} = \underline{\underline{c}} \times \underline{\underline{a}} + \underline{\underline{a}} \times \underline{\underline{c}}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 2- \end{bmatrix} = \underline{\underline{a}} \quad \begin{bmatrix} 4 & 3- \\ 2- & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{b}} \quad \begin{bmatrix} * & * \\ * & * \end{bmatrix} = \underline{\underline{c}} \quad \text{ـ (٢٢) } \quad \text{إذا كانت } \underline{\underline{a}}, \underline{\underline{b}}, \underline{\underline{c}} \text{ متساوين، فـ (٢١) }$$

(٢٣) أي ضرب مماثل غير معرف؟

$$\begin{array}{ll} [2 \ 1-] \begin{bmatrix} 2 & 1- \\ 2 & 1- \end{bmatrix} \text{ (ب)} & [2 \ 1-] \begin{bmatrix} 1- & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ (أ)} \\ [1- \ 2] [2 \ 1-] \text{ (د)} & [1- \ 2] \begin{bmatrix} 2 & 1- \\ 2 & 1- \end{bmatrix} \text{ (ج)} \end{array}$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في الممارسين (١) – (٤) أوجد ناتج ضرب كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 2 & * & * \\ * & 4- & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & * & * \\ * & 4- & * \end{bmatrix} \quad (١)$$

$$\begin{bmatrix} * & 3- & * \\ * & 0 & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2- & * \end{bmatrix} \quad (٢)$$

$$\begin{bmatrix} 4- & 7- & 9 \\ 3 & 2- & 8- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1- & & \\ & & \end{bmatrix} \quad (٣)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1- \\ 1 & 1- & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1- \\ 1- & 0 \end{bmatrix} \quad (٤)$$

٤٢

وهذا يتيح من ضرب المصفوفتين $\underline{\underline{a}}, \underline{\underline{b}}$ ، لكن تقوم بعمليات ضرب مصفوفتين، اضرب عناصر كل صف من المصفوفة الأولى في عناصر كل عمود من المصفوفة الثانية. أوجد ناتج كل ضرب، ثم اجمع نواتج الضرب كما في المثال التالي:

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 190 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 20 + 4 \times 30 \\ 2 \times 10 + 4 \times 40 \\ 2 \times 20 + 4 \times 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 20 & 30 \\ 10 & 40 \\ 20 & 20 \end{bmatrix} = \underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{a}}$$

وبالتالي تكون درجة أحمد هي الأفضل.

مثال (٤)

أوجد ناتج $\underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{a}}$.

$$\begin{bmatrix} * & 4 \\ 1 & 2- \end{bmatrix} = \underline{\underline{b}} \quad \begin{bmatrix} 3 & 1- \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{a}}$$

الحل:

اضرب $\underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{a}}$ ، ثم اضرب $\underline{\underline{a}} \times \underline{\underline{b}}$ ، ثم اجمع نواتج الضرب.

$$\begin{bmatrix} * & 4 \\ 1 & 2- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1- \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}$$

$$*= (\underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{a}}) + (\underline{\underline{a}} \times \underline{\underline{b}})$$

الناتج هو الناتج في الصيغة الأولى والصيغة الأولى. كثر الخطوات نفسها بباقي المصفوف والأعمدة.

$$\begin{bmatrix} 3 & 6- \\ 4- & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * \\ 1 & 2- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & * \\ 4- & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * \\ 1 & 2- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1- \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{a}}$$

$$*= (\underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{a}}) + (\underline{\underline{a}} \times \underline{\underline{b}})$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6- \\ 4- & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * \\ 1 & 2- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & * \\ 4- & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * \\ 1 & 2- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1- \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{a}}$$

$$*= (\underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{a}}) + (\underline{\underline{a}} \times \underline{\underline{b}})$$

v*

$$\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$, \begin{bmatrix} 9 & 0 & 3 \\ 6 & 15 & -21 \end{bmatrix} = \underline{s} \quad (b)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \underline{s} \quad \therefore$$

(٤) ضرب كل عنصر من الصف في كل عنصر مناظر له من العمود ثم إيجاد ناتج الجمع.

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 9 & 29 \end{bmatrix} \quad (b)$$

(ج) رتبة المصفوفة \underline{A} هي: 2×3

رتبة المصفوفة \underline{B} هي: 2×2

رتبة مصفوفة ناتج الضرب هي: 2×3

(د) رتبة مصفوفة ناتج الضرب هي عدد صفوف المصفوفة الأولى \times عدد أعمدة المصفوفة الثانية.

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$\underline{A} = (\underline{1})(\underline{2}) + (\underline{2})(\underline{1})$

ناتج الضرب:

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

حاول أن تحل

٤) صفات الإجراءات التي تمت لضرب الصفت المظلل في العمود المظلل في المثال (٤).

أ) أوجد ناتج الضرب: $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

في المثال (٤)، ما رتبة المصفوفات الأصلية؟ ما رتبة مصفوفة الضرب؟

التفكير الناقد: كيف تقارن رتبة مصفوفة الضرب براتب المصفوفات الأصلية؟

ضرب المصفوفات:

المصفوفة \underline{A} هي مصفوفة من الرتبة $\underline{m} \times n$ والمصفوفة \underline{B} هي مصفوفة من الرتبة $\underline{n} \times p$. عندئذ مصفوفة الضرب $\underline{A} \times \underline{B}$ هي مصفوفة من الرتبة $\underline{m} \times p$.

لakukan مصفوفة الضرب معززة إذا كان عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى مساوياً لعدد الصفوف في المصفوفة الثانية.

$\underline{A} \times \underline{B} = \underline{C}$ إذا وردت

٧١

مثال (٥)

$$\begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \underline{B}, \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \underline{A}$$

حيث إذا كانت كل من نواتج الضرب: $\underline{A} \times \underline{B}$, $\underline{B} \times \underline{A}$ معززة أو غير معززة.

أوجد رتبة كل مصفوفة ضرب معززة.

الحل:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \underline{B} \times \underline{A} \\ (2 \times 2) \times (2 \times 3) \\ \hline \text{غير متساويان} \\ \underline{B} \times \underline{A} \end{array} & \begin{array}{c} \underline{A} \times \underline{B} \\ (2 \times 3) \times (2 \times 2) \\ \hline \text{متساويان} \\ \underline{A} \times \underline{B} \end{array} \end{array}$$

$\underline{B} \times \underline{A}$ معززة ورتيبها 2×3

حاول أن تحل

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 8 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \underline{B}, \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \underline{A}$$

١) حدد ما إذا كانت كل من نواتج الضرب: $\underline{A} \times \underline{B}$, $\underline{B} \times \underline{A}$ معززة أو غير معززة.

أ) أوجد ناتج الضرب المعزز.

ب) بفرض أن المصفوفة \underline{A} هي مصفوفة من الرتبة 2×3 ، المصفوفة \underline{B} هي مصفوفة من الرتبة 3×2 .

هل $\underline{A} \times \underline{B}$ متساويان؟ وضح إجابتك.

لضرب المصفوفات بعض خصائص ضرب الأعداد

خواص ضرب المصفوفات المرتبة

إذا كانت $\underline{A} \times \underline{B}$ هي مصفوفات من الرتبة $m \times n$. فإن:

* $\underline{A} \times \underline{B}$: مصفوفة من الرتبة $m \times m$.

خاصية التجميع للضرب

* $(\underline{A} \times \underline{B}) \times \underline{C} = \underline{A} \times (\underline{B} \times \underline{C})$

خاصية التوزيع

* $\underline{A} \times (\underline{B} + \underline{C}) = \underline{A} \times \underline{B} + \underline{A} \times \underline{C}$

خاصية الضرب في الصفر

* $\underline{A} \times \underline{0} = \underline{0} \times \underline{A} = \underline{0}$

٧٢

(أ) $\underline{1} \times 2$ من الرتبة: 2×2 \underline{b} من الرتبة: 2×4

لذا $\underline{1} \times \underline{b}$ هي (2×2) و (2×4) أي عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى يساوي عدد الصفوف في المصفوفة الثانية فتكون $\underline{1} \times \underline{b}$ معرفة.

$\underline{b} \times \underline{1}$ هي (2×4) و (2×2) أي عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى لا يساوي عدد الصفوف في المصفوفة الثانية ف تكون $\underline{b} \times \underline{1}$ غير معرفة.

$$(b) \begin{bmatrix} 16 & 6 & 28 \\ 32 & 9 & 32 \end{bmatrix}$$

(ج) 2×3 و 3×2 ناتج الضرب معرف

2×2 و 2×3 ناتج الضرب معرف ولكن ليس ضروريًا أن نجد $\underline{1} \times \underline{b}$ لأن $\underline{1} \times \underline{b}$ من الرتبة 2×2 بينما $\underline{b} \times \underline{1}$ من الرتبة 3×3 .

نذكر:
يكتفي إيجاد مثال مضاد
واحد لإثبات عدم صحة
النظريّة.

ملاحظة: عملية ضرب المصفوفات ليست إيدالية.

مثال (مضاد)

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = ?$$

أوجد $\underline{1} \times \underline{b}$. ماذا تنتهي؟

الحل:

$$\begin{bmatrix} 16 & 21 \\ 12 & 27 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = ?$$

$$\begin{bmatrix} 17 & 18 \\ 15 & 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = ?$$

... عملية ضرب المصفوفات ليست إيدالية.

Square Matrix

إذا كانت \underline{M} مصفوفة مربعة، فإن المصفوفة \underline{M}^T يرمز إليها بالرمز \underline{M}^T .
وتفاهم المصفوفة \underline{M} وبالمثل $\underline{M}^T = \underline{M} \times \underline{M}^T = \underline{M}^T \times \underline{M} = \underline{I}$.

مثال (٦)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = ?$$

أوجد: $\underline{1} \times \underline{b}$.

الحل:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = ?$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = ?$$

حاول أن تحل

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = ?$$

إذا كانت $\underline{b} = \underline{1}$. أوجد: $\underline{b} \times \underline{b}$.

٧٣

$$\begin{bmatrix} v & w \\ u & x \end{bmatrix} = d \quad \begin{bmatrix} 5 & -6 \\ -6 & 6 \end{bmatrix} = ? \quad \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = ? \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = ?$$

(٥) (٦) (٧) (٨)
 ج ج ج ج

في التمارين (٩-٥)، حدد ما إذا كان الضرب معروفاً أم لا مع تفسير إجابتك.
في التمارين (١٠-١٣)، استخدم المصفوفات d ، v ، w ، u ، x لتنفيذ العمليات المطلوبة إذا كانت معروفة، وإذا كانت إحدى العمليات غير معروفة لاكتب (غير معروفة).

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = n \quad \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = o \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = d$$

(١١) (١٢)

$$(13) \quad (d \times d) \times o = ?$$

$$(14) \quad (o \times n) \times d = ?$$

(١٤) الكتابة في الرياضيات: لنفرض أن المصفوفة \underline{A} هي من الرتبة 2×3 والمصفوفة \underline{B} من الرتبة 3×2 . هل $\underline{A} \times \underline{B}$ ، $\underline{B} \times \underline{A}$ متساوية؟ اشرح تفكيرك.

٤٣

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \underline{b} ; \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \underline{1} \times \underline{b}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \underline{b} \times \underline{1} ; \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \underline{1} \times \underline{b}$$

(١٥) اكتب مصفوفة تمثل العائد اليومي للبطاقات المباعة مستخدماً الجدولين التاليين:

أسعار البطاقات بالدينار		
درجة ٣	درجة ٢	درجة ١
٥	٦	٧

الثلاثاء الأربعاء الخميس			
١٦٠	١٣٠	١٥٠	١٤٠
١٧٥	١٣٠	١٢٥	١٢٠
٨٠	٥٢	٦٠	٥٠

(١٦) أوجد قيمة كل من s ، c إذا كانت:

$$\begin{bmatrix} 9 & -4 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ s & -c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

في التعبير (١٧)، استخدم المصفوفات $\underline{\underline{s}}$ ، $\underline{\underline{c}}$ ، $\underline{\underline{h}}$ لتبين صحة العبارة.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \underline{\underline{h}} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\underline{c}} \quad \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{s}}$$

$$\underline{\underline{h}} \times \underline{\underline{s}} + \underline{\underline{c}} \times \underline{\underline{s}} = \underline{\underline{h}} \times (\underline{\underline{c}} + \underline{\underline{s}}) \quad (١٧)$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 15 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{b}}^2 \quad ٦$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}^3 =$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 15 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{b}}^2 \times \underline{\underline{b}} = \underline{\underline{b}}^3$$

$$\begin{bmatrix} 27 & 0 \\ 54 & 27 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} 27 =$$

٧-٤: مصفوفات الوحدة والنظير الضري (المعكوسات)

١ الأهداف

- يتعرف بمصفوفة الوحدة.
- يتعرف بمحدد المصفوفة المربعة.
- يوجد النظير الضري للمصفوفة المربعة (معكوس المصفوفة).
- يستخدم النظير الضري لحل معادلات مصفوفية.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

مصفوفة الوحدة - محدد مصفوفة - نظير ضري.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

أسأل الطلاب:

(أ) ما المعكوس الضري للعدد $\frac{2}{3}$ ؟

(ب) ما المعكوس الضري للعدد ٦؟

(ج) ما المعكوس الضري للتعبير $\frac{3}{x}+2$ ؟

(د) ما العدد المحايد في عملية ضرب الأعداد؟

(هـ) في الأسئلة (أ)، (ب)، (ج) أوجد ناتج ضرب كل عدد في معكوسه الضري. ماذا تلاحظ؟

٥ التدريس

في فقرة «عمل تعاوني» شجع الطالب على الربط بين ما أنجزوه

في فقرة (١) والنتائج التي سوف يحصلون عليها من الأسئلة (٣)، (٤).

ركز انتباه الطالب إلى أهمية المصفوفات من الفئة و

مصفوفات الوحدة والنظير الضري (المعكوسات)

Identity and Inverse Matrices

عمل تعاوني

سوق تعلم

- مصفوفة الوحدة للضرب
- محدد المصفوفة
- النظير الضري (المعكوس الضري) للمصفوفة
- حل المسادلة المصفوفية باستخدام النظير الضري.

أوجد ناتج ما يلي:

- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & -1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

أثبات: أثبات أي أثبات ترافقه في إجابتك عن السؤال الأول.

نوع ناتج ما يلي، ثم تتحقق من توقعك.

- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

أثبات: أثبات أي أثبات ترافقه في إجابتك عن السؤال (٤).

الفكرة التالية: كيف ترتبط إجاباتك بالنسبة إلى السؤالين (١)، (٤)؟

مصفوفة الوحدة

Identity Matrix

المصفوفة المربعة التي عناصر قطرها الناتجي، وبقيمة العناصر صفر تسمى **مصفوفة الوحدة** للضرب، ويرمز إليها بـ I .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

بعض أن A $= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow A^{-1} = A$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

أثبات: $I \times A = A \times I = I$

$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ هي العنصر المحايد الضري للمصفوفات المربعة من الرتبة الثانية.

وتصوره عاماً I_n هي العنصر المحايد الضري للمصفوفات المربعة من الرتبة n .

النظير الضري

Multiplicative Inverse

إذا كانت A مصفوفة مربعة من الرتبة نفسها بحيث يكون $A \times B = I$ ، فإن B هي النظير الضري للمصفوفة A .

ويرمز إليها A^{-1} .

إذا $A^{-1} \times A = A \times A^{-1} = I$

مثال (١)

أثبت أن $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$ هي النظير الضري للمصفوفة $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

الحل:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 2 + (-2) \times 2 & 2 \times 2 + 0 \times 2 & 0 \times 2 + 0 \times 1 \\ 0 \times 2 + 2 \times (-2) & 0 \times 2 + 2 \times 2 & 0 \times 0 + 1 \times 1 \\ 0 \times 0 + 0 \times (-2) & 0 \times 0 + 0 \times 2 & 1 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

أثبات: $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ هي النظير الضري لـ $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

يمكن القول أن المصفوفة A هي النظير الضري للمصفوفة B .

حاول أن تحل:

- أثبات أن $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$ هي النظير الضري لـ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- في المثال (١)، أثبت أن $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ هي النظير الضري لـ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

معلومة رياضية:

النظير الضري للمصفوفة A يسمى أيضًا المصفوفة المعكosa.

Determinant of a 2×2 Matrix

محدد مصفوفة مربعة من الرتبة الثانية ترتبط كل مصفوفة مربعة بـ $|A|$ (عدد حقيقي يسمى محدد) ويرمز إلى هذا العدد بالرمز $|A|$ ويقرأ محدد المصفوفة A . سنتناصر في هذا الدرس على محدد المصفوفة المربعة من الرتبة الثانية.

$$\text{محدد المصفوفة المربعة} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

تسمى المصفوفة التي محدداتها يساوي الصفر بالمصفوفة المتردة.

مثال (٢)

$$\text{أوجد محدد كل من المصفوفات التالية: } \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$V = 2 \times 5 - 4 \times 3 = 10 - 12 = -2$$

$$= (3 \times 4) - (2 \times 3) = 12 - 6 = 6$$

$$S = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -2$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 6$$

حاول أن تحل

$$\text{أوجد محدد كل من المصفوفات التالية: } \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 10 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

ليس لكل المصفوفات المربعة نظير ضربي (معكوسة). سوف يساعدك الاختبار التالي على استنتاج ما إذا كانت المصفوفة 2×2 لها نظير ضريبي، وكيف يمكنك إيجاده إن وجد.

خاصية:

بفرض أن: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$ ، فإن $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}^{-1}$ حيث:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

معلومات رياضية:

المصفوفة التي محددتها الصفر ليس لها نظير ضريبي وتسمى مصفوفة متردة.

٧٦

أخبرهم بأنهم من الآن فصاعداً سوف يتعاملون مع مصفوفة مربعة من نوع خاص اسمها مصفوفة الوحدة، حيث لها دور مهم مع النظير الضريبي للمصفوفة المربعة. دعهم يتأكدون من خلال الأمثلة كيف أن:

$$I \times I = I \times I = I$$

وأن $I \times I = I = I \times I = I$ لكل مصفوفة مربعة I .

أخبرهم أن عليهم التعامل مع محدد المصفوفة $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ كما هو: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ ، وأن نظير المصفوفة موجود إذا كان $ad - bc \neq 0$.

أكّد لهم أن بإمكانهم تبديل أمكنته A ، د فقط.

شجعهم على التتحقق من صحة النظير الضريبي بإجراء عملية ضرب المصفوفة مع نظيرها الضريبي لتحصل على مصفوفة الوحدة: I .

٦ الرابط

لا يوجد.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخاطئ الطلاب في تبديل العناصر ضمن المصفوفة المربعة من الرتبة الثانية أو لا يضعون الإشارات المناسبة. ساعدهم على فهم ذلك من خلال أمثلة متعددة؛ راقب أدائهم.

٨ التقييم

تابع باهتمام كبير ما يقوم به الطلاب في فقرات «حاول أن تحل» لما لها من أهمية في تكوين أفكار عن مدى قدرة الطلاب على إيجاد النظير الضريبي وبالتالي حل مسائل مرتبطة به.

التاريخ المجري: التاريخ الميلادي: التاريخ الميلادي: التاريخ المجري:

٤-٧

مصفوفات الوحدة والنظير الضريبي (المعكوسة)
Identity Matrices and Inverse Matrix

المجموعة ١ تمارين أساسية

في التمارين (١-٢)، بين أن كل مصفوفة هي نظير ضريبي للمصفوفة الأخرى.

$$(1) \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$

في التمارين (٣-٥)، أوجد محدد كل مصفوفة.

$$(3) \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(4) \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

$$(5) \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

في التمارين (٦-٩)، أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة إن وجد، وإذا لم يوجد فاكتبه (لا يوجد نظير ضريبي) مع ذكر السبب.

$$(6) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(7) \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

٤٥

اختبار سريع

❶ هل المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$ هي معكوس ضربي للمصفوفة

لل被捕ففة؟ **كلا.**

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ لأن

❷ أوجد النظير الضريبي للمصفوفة $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3,5 \\ 1 & 1,5 \end{bmatrix}$$

إجابات وحلول

عمل تعاوني

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad ❶$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad ❷$$

$$I = I \times I = O \times O$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \quad ❸$$

اضرب المصفوفتين للتحقق

$$\begin{bmatrix} ; & ; \\ ; & ; \end{bmatrix} \quad ❹$$

$$\begin{bmatrix} ; & ; \\ ; & ; \end{bmatrix} \quad ❻$$

$$\begin{bmatrix} ; & ; & ; \\ ; & ; & ; \\ ; & ; & ; \end{bmatrix} \quad ❽$$

$$\begin{bmatrix} ; & ; & ; \\ ; & ; & ; \\ ; & ; & ; \end{bmatrix} \quad ❽$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}^{(8)}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}^{(9)}$$

في التمارين (١٢-١٠)، حل كل معادلة في س، وإذا كان من غير المحکم حلها، فاكتب السبب.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = س \times \begin{bmatrix} 7 & 12 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} * \\ 4 \end{bmatrix} = س \times \begin{bmatrix} 4 & * \\ 1 & * \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 21 \\ 12 & 27 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} س \quad (12)$$

في التمارين (١٥-١٣)، أوجد قيمة كل محدد.

$$\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ 8 & 2 \end{vmatrix} \quad (14)$$

$$\begin{vmatrix} * & 2 \\ 1 & * \end{vmatrix} \quad (15)$$

في التمارين (١٧-١٦)، هل كل مصفوفة هي نظير ضريبي للمصفوفة الأخرى؟ اشرح إجابتك.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0,5 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 8 & 6 \end{bmatrix} \quad (17)$$

٥ في (أ)، (ب) ناتج الضرب هو مصفوفة الوحدة من الرتبة 2×2 .

في (ج)، (د) ناتج الضرب هو مصفوفة من الرتبة 3×3 .

٦ في السؤال ١ مصفوفة \times مصفوفة الوحدة = مصفوفة.

في السؤال ٤ مصفوفة \times مصفوفة = مصفوفة الوحدة.

«حاول أن تحل»

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2,5 \end{bmatrix} \quad (أ)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (ب)$$

لذا $\underline{1}$ هو النظير الضريبي لـ \underline{b} .

$$(أ) 4 = 8 - 8 = 2 \times 4 - 2 \times 4 \quad (٢)$$

$$(ب) 66 = 2 \times 7 - 10 \times 8$$

$$(ج) -9 = -3k + 9 \quad (ك)$$

$$0 = \begin{vmatrix} 10 & 5 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = |\underline{b}| \quad (٣)$$

$$0 = 40 + 10$$

$$س = -4$$

$$(أ) |\underline{b}| \neq 2 = 6 - 4 = 2 \times 3 - 4 \times 1 = |\underline{b}| \quad (٤)$$

$\therefore \underline{b}$ لها نظير ضريبي. لأن $|\underline{b}| \neq 0$.

$$(ب) |\underline{b}| \times 6 = |b| \times (24 + 24) = (8) \times (3 - 4) = 0$$

ليس لها نظير ضريبي. لأن $|\underline{b}| = 0$.

(٥) حدد أي مصفوفة مماثلة لها نظير ضريبي (معكوس) ضربي، ثم أوجده.

$$\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \underline{b}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \underline{b}$$

الحل:

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \underline{b}$$

احسب: $\underline{a} \times \underline{b} = \underline{c}$

حيث إن: $\underline{a} \times \underline{b} \neq \underline{c}$ ، فإن النظير الضريبي (المعكوس) لم يكن موجوداً.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2,5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2,5 \end{bmatrix}$$

احسب: $\underline{a} \times \underline{b} = \underline{c}$

حيث إن: $\underline{a} \times \underline{b} = \underline{c}$ ، فإن معكوس \underline{b} غير موجود.

ن \underline{b} غير موجود.

حاول أن تحل

(٥) حدد أي مصفوفة من المصفوفات التالية لها نظير ضريبي (معكوس)، ثم أوجده.

$$\begin{bmatrix} 2,3 & 0,5 \\ 7,2 & 3 \end{bmatrix} = \underline{b}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \underline{b}$$

٧٨

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + س \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (١٨) \quad \text{أوجد المصفوفة } س:$$

$$\begin{bmatrix} 27 & 19 \\ 24 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} + س \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (١٩) \quad \text{ حل المعادلة: } 2 - 2 = 6 - 4 = 2 \times 3 - 4 \times 1 = |\underline{b}|$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = س \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (٢٠) \quad \text{إذا كانت } س \in \mathbb{C}: \text{ ونظيرها الضريبي: } س$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

بين أن كل مصفوفة هي نظير ضريبي للمصفوفة الأخرى.

$$\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad (١)$$

في المعاين (٢-٤)، أوجد محدد كل مصفوفة.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (٤) \quad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad (٣) \quad \begin{bmatrix} 0,5 & 0 \\ 2 & 1,5 \end{bmatrix} \quad (٢)$$

في المعاين (٥-٧)، أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة إذا وجد، وإذا لم يوجد فاكتب (لا يوجد نظير ضريبي).

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (٥)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1,5 \\ 0,5 & 2,5 \end{bmatrix} \quad (٦)$$

$$0 \neq 2 = 4 - 6 = 4 \times 1 - 3 \times 2 \quad (أ)$$

\therefore لها نظير ضريبي.

$$\left[\begin{array}{cc} 4- & 3 \\ 2 & 1- \end{array} \right] \frac{1}{2} =$$

$$\left[\begin{array}{cc} 2- & 1,5 \\ 1 & 0,5- \end{array} \right] =$$

$$6,9 - 3,6 = 2,3 \times 3 - 7,2 \times 0,5 \quad (ب)$$

$$0 \neq 3,3- =$$

\therefore لها نظير ضريبي.

$$\left[\begin{array}{cc} 2,3- & 7,2 \\ 0,5 & 3- \end{array} \right] \frac{1}{3,3-} =$$

$$\left[\begin{array}{cc} \frac{2,3}{3,3} & \frac{7,2-}{3,3} \\ 0,5- & \frac{3}{3,3} \end{array} \right] =$$

$$\left[\begin{array}{cc} \frac{23}{33} & \frac{24-}{11} \\ 5- & \frac{10}{11} \end{array} \right] =$$

$$\left[\begin{array}{cc} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{array} \right]^{(7)}$$

$$\left[\begin{array}{cc} 2- & 1 \\ 0 & 3 \end{array} \right]^{(8)}$$

$$\left[\begin{array}{cc} 0 & 10 \\ 10 & 0 \end{array} \right] = \underline{\text{مس}} \times \left[\begin{array}{cc} 3- & 0 \\ 2- & 4 \end{array} \right]^{(9)}$$

(٩) أوجد مس:

$$\left| \begin{array}{cc} 10 & 3- \\ 20 & 6 \end{array} \right|^{(10)}$$

$$\left| \begin{array}{cc} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{array} \right|^{(11)}$$

(١٢) هل كل مصفوفة هي نظير ضريبي للمصفوفة الأخرى؟ اشرح.

$$\left[\begin{array}{cc} 2 & 2,5- \\ 1- & 1 \end{array} \right], \left[\begin{array}{cc} 5- & 2- \\ 4- & 2- \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc} 4 & 3 \\ 3- & 4 \end{array} \right] + \underline{\text{مس}} \times \left[\begin{array}{cc} 9- & 7- \\ 5 & 4 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} 9 & 1 \\ 7- & 6 \end{array} \right] \quad (13)$$

(١٤) حل المعادلة:

$$\left[\begin{array}{cc} 25 & 3 \\ 24 & 2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} 26- & 2 \\ 18- & 2 \end{array} \right] - \underline{\text{مس}} \times \left[\begin{array}{cc} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{array} \right] - \left[\begin{array}{cc} 6- & 0 \\ 2 & 1 \end{array} \right]$$

٤٨

٥-٧: حل نظام من معادلتين خطيتين

حل نظام من معادلتين خطيتين
Solving a System of Two Linear Equations

٥-٧

دعا نفك ونتناقش

يمكن للمعادلة المصفوفة أن تمثل أي نظام معادلات.

نظام معادلات

$$\begin{cases} 5s + 2t = 1 \\ 5s + 3t = 14 \end{cases}$$

المعادلة المصفوفة

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & 14 \end{bmatrix}$$

قارن طرقتي كتابة النظام في معادلات المصفوفات. أين تجد معامل s , t ? المتغيرات؟ الثواب؟

كل مصفوفة في معادلة المصفوفات على الشكل $\begin{bmatrix} s & t \\ a & b \end{bmatrix}$ لها اسمها:

مصفوفة المعاملات $\begin{bmatrix} s & t \end{bmatrix}$ مصفوفة المتغيرات $\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}$ مصفوفة الثواب $\begin{bmatrix} 1 & 14 \end{bmatrix}$

أوجد مصفوفة الضرب: $\begin{bmatrix} s & t \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$

يمكن كتابة مصفوفة الضرب بأنها متساوية للمصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 14 \end{bmatrix}$

شرح كيف أن معادلة المصفوفة تمثل نظام المعادلات.

Solving a System:
تسطيع إيجاد النظير الضري لـ مصفوفة المعاملات، ثم الحصول سريعاً على حل النظام من المعادلات الخطية.
١- الحل باستخدام المـعـكـوسـ الضـرـيـ لـ الـمـصـفـوـفـةـ المـوـبـعـةـ:

مثال (١)

حل النظام: $\begin{cases} 3s + 2t = 7 \\ s - t = 1 \end{cases}$

باستخدام النظير الضري لـ مصفوفة.

الحل:

أكتب النظام مع مـاـعـدـلـاتـ المـصـفـوـفـاتـ.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} s & t \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

حيث $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \times 1 - (-1) \times 1 = 1$

٧٩

التاريخ المحرجي:
التاريخ الملادي:
حل نظام من معادلتين خطيتين
Solving System of Two Linear Equations

المجموعة # تمارين أساسية

في التبرعين (٢-١)، اكتب نظام المعادلات التالية على شكل مـاـعـدـلـاتـ المـصـفـوـفـاتـ مـاـعـدـلـاتـ وـمـصـفـوـفـةـ الثـوابـ.

$$(1) \begin{cases} 5s + 2t = 5 \\ 4s - 2t = 4 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2s + 5t = 2 \\ s + 3t = 6 \end{cases}$$

في التبرعين (٣-٤)، اكتب المعادلات المـصـفـوـفـةـ التـالـيـةـ عـلـىـ شـكـلـ نـظـامـ مـعـادـلـاتـ.

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} s & t \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$(4) \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} s & t \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

في التبرعين (٥-٦)، استخدم النظير الضري لـ مـصـفـوـفـةـ لـ حـلـ نـظـامـ مـعـادـلـاتـ.

$$(5) \begin{cases} 5s + 3t = 5 \\ 6s + 4t = 6 \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} s - 3t = 1 \\ 5s + 6t = 5 \end{cases}$$

٤٩

١ الأهداف

- يمـلـ حلـ نـظـامـ منـ مـعـادـلـتـينـ خـطـيـتـينـ باـسـتـخـدـامـ النـظـيرـ الضـرـيـ لـ الـمـصـفـوـفـةـ.
- يـسـتـخـدـمـ قـاعـدـةـ كـراـمـرـ حلـ مـعـادـلـتـينـ خـطـيـتـينـ.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

نـظـامـ مـعـادـلـتـينـ خـطـيـتـينـ - قـاعـدـةـ كـراـمـرـ.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

اطلب إلى الطالب حل ما يلي:

$$s = 12$$

$$s = 5 + 3$$

$$\frac{7}{4}s = 8$$

$$\begin{cases} 2s + 3 = 2 \\ 14s - 1 = 3 \end{cases}$$

اطلب إليهم إيجاد ناتج:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

٥ التدريس

من المفيد الربط بين أنظمة المعادلات والمصفوفات كما هي واردة في فقرة «دعا نفك ونتناقش»، لذا يجب التركيز على النظير الضري لـ مـصـفـوـفـةـ كـيـ يـصـلـ الطـلـابـ إـلـىـ حـلـ الـمـعـادـلـةـ.

أخبرهم أن حل معادلة المصفوفات $\underline{A} \times \underline{X} = \underline{B}$,

حيث $\underline{X} = \begin{bmatrix} s \\ c \end{bmatrix}$ ، مشابه لحل معادلة بسيطة من نوع $3s = 4$. ولإيجاد الحل نكتب: $\frac{1}{3} \times 3s = \frac{1}{3} \times 4$ (نستخدم المعكوس الضريبي)، ونحصل على $s = \frac{4}{3}$ ، وفي معادلة المصفوفات نستخدم أيضاً النظير الضريبي

للمصفوفة \underline{A} إن وجد فنكتب:

$$\underline{A}^{-1} \times \underline{A} \times \underline{X} = \underline{A}^{-1} \times \underline{B} . \text{ المعروف بحسب الدرس السابق} \\ \text{أن } \underline{A}^{-1} \times \underline{A} = \underline{I} \text{ (مصفوفة الوحدة).}$$

المثال (٢)، هو تطبيق مباشر لقاعدة كرامر التي تستخدم حل نظام معادلتين أو أكثر لإيجاد قيم المتغيرات، والأساس في هذه القاعدة هو فهم الطالب لتغيير الأعمدة بحسب كل متغير، ثم إيجاد المحدد لكل مصفوفة.

٦ الرابط

في المثال (٢)، أشر إلى أن استخدام المصفوفات في حل أنظمة معادلات ليس بذات أهمية كبير في حالة معادلتين من مجهولين ولكن تصبح هذه الطريقة مهمة في حالة ٣ معادلات من ٣ مجهولين أو أكثر.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخاطئ الطالب في تبديل الأعمدة عند استخدام قاعدة كرامر. شجعهم على كتابة النظام أولاً على الشكل القياسي:

$$\left\{ \begin{array}{l} As + Bc = J \\ A's + B'c = J' \end{array} \right. \\ \text{ثم كتابة } \Delta, \Delta_s, \Delta_c .$$

في التمارين (٩-٧)، بين ما إذا كان لсистемة معادلات حلًّا وحيدًا أم لا.

$$\left\{ \begin{array}{l} 2s + 5c = 0 \\ s + 2c = 0 \end{array} \right. \quad (7)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3s + 2c = 10 \\ 4s + 6c = 16 \end{array} \right. \quad (8)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3s - 2c = 4 \\ s - 3c = 2 \end{array} \right. \quad (9)$$

في التمارين (١٠-١٢)، استخدم قاعدة كرامر لحل نظام معادلات.

$$\left\{ \begin{array}{l} 2s + c = 4 \\ 3s - c = 6 \end{array} \right. \quad (10)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2s + c = 7 \\ 2s + 5c = 1 \end{array} \right. \quad (11)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3s + 4c = 4 \\ 2s - 3c = 2 \end{array} \right. \quad (12)$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (١٢-٢)، اكتب نظام المعادلات التالية على شكل معادلة مصفوفية، محددًا مصفوفة المعاملات ومصفوفة المتغيرات.

$$\left\{ \begin{array}{l} 7 - 2s = 3 \\ 2 - 3c = 2 \end{array} \right. \quad (1)$$

٨ التقييم

تابع الطلاب وهم يجيبون عن الأسئلة في فقرات «حاول أن تحل» للتأكد من فهمهم في استخدام النظير الضري أو قاعدة كرامر عند حل معادلة المصفوفات.

وهذه تعرف بقاعدة كرامر Cramer's Rule مع الملاحظة أن:

- ١) إذا كان $\Delta \neq 0$ ، فإن للمعادلين حلاً وحيداً
- ٢) إذا كان $\Delta = 0$ ، فالحل ϕ

وستكتفي بهماين الحالتين ولا نعرض لحالة التي كل من Δ مساوا الصفر

مثال (٢)

استخدم قاعدة كرامر لحل النظام: $\begin{cases} 4s - 5c = 7 \\ 3s + 2c = 3 \end{cases}$

الحل:

نكتب أولاً النظام بالطريقة التقاسبية: $\begin{cases} 4s - 5c = 7 \\ 3s + 2c = 3 \end{cases}$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & -5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 11$$

$$\Delta_s = \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$\Delta_c = \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -9$$

$$s = \frac{\Delta_s}{\Delta} = \frac{-1}{11} = -\frac{1}{11}$$

$$c = \frac{\Delta_c}{\Delta} = \frac{-9}{11} = -\frac{9}{11}$$

حاول أن تحل

٢) استخدم قاعدة كرامر لحل النظام: $\begin{cases} 3s + 2c = -6 \\ 4s - 3c = -7 \end{cases}$

٨١

اختبار سريع

$$\begin{aligned} 1) \text{ حل النظام } \left\{ \begin{array}{l} 3s + 2c = -6 \\ 2s - 3c = 11 \end{array} \right. \end{aligned}$$

باستخدام النظير الضري للمصفوفة.

$$(15-8, 6) = \begin{bmatrix} 6 \\ 61 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ c \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ حل النظام } \left\{ \begin{array}{l} 12s + 8c = 3 \\ 3s - 7c = 50 \end{array} \right. \end{aligned}$$

باستخدام قاعدة كرامر.

$$s = \frac{203}{36}; c = -\frac{379}{108}$$

٩ إجابات وحلول

«دعنا نفك ونتناقش»

١) تنوع الإجابات. راجع عمل الطلاب.

$$(أ) \begin{bmatrix} s \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2s + c \\ 3s + 5c \end{bmatrix}$$

$$(ب) \begin{bmatrix} s \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2s + c \\ 3s + 5c \end{bmatrix}$$

عند المساواة بين مصفوفتين نكتب: $s + 2c = 5$

$$14s + 5c = 3$$

«حاول أن تحل»

$$(1) \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ c \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$1 \neq 1 = \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}; \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\underline{1}}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \frac{1}{1} = \underline{\underline{1}}$$

$$\left. \begin{array}{l} 11 = 2s + sc \\ 18 = 3s + 2sc \end{array} \right\} \quad (2)$$

في التمرين (٣-٤)، استخدم النظر الضري للمصفوفة لحل نظام المعادلات.

$$\left. \begin{array}{l} 12 = 3s + 2c \\ 7 = 2s + sc \end{array} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{array}{l} 5 = 3s + 2c \\ 6 = 2s + sc \end{array} \right\} \quad (4)$$

في التمرين (٥-٦)، حل المعادلة المصفوفية إن أمكن:

$$\left[\begin{array}{c} 8 \\ 10 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} s & c \\ c & s \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{array} \right] \quad (5)$$

$$\left[\begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} s & c \\ c & s \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 3 & 2 \\ -1 & -4 \end{array} \right] \quad (6)$$

في التمرين (٧-٨)، استخدم قاعدة كرامر لحل نظام معادلات.

$$7 = 1, 5 + s, 5 \quad (7)$$

$$9 = 3, 5 - s, 5 \quad (8)$$

(٩) يتوج أحد المصانع أقلام رصاص وعاجي. يبلغ ثمن علبة تحتوي على ٥ عاجي وقلمي رصاص ١٥٠٠ فلس، ويبلغ ثمن علبة أخرى تحتوي على ٧ عاجي و٥ أقلام ٢٦٥٠ فلسًا.

أوجد ثمن الممحاة وثمن القلم مستخدماً النظر الضري للمصفوفة.

$$\left[\begin{array}{c} 7 \\ 5 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} s \\ c \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{c} 1 \\ 4 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} s \\ c \end{array} \right]$$

الحل: $s = 1$ ، $c = 4$.

$$1 = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \Delta \quad (1)$$

$$4 = \begin{vmatrix} 2 & -6 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = \Delta_s \quad (2)$$

$$3 = \begin{vmatrix} -6 & 3 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} = \Delta_c \quad (3)$$

$$s = \frac{\Delta}{\Delta} = \frac{\Delta}{\Delta} = \frac{s}{\Delta}$$

المرشد لحل المسائل

المرشد لحل المسائل

الإحداثيان (s, m) نقطتان في المستوى هي حل النظام: $\begin{cases} 2s + 3m = 13 \\ 5s + 7m = 31 \end{cases}$

أوجد إحداثي هذه النقطة.

وماذا كتب؟
 $\begin{cases} 2s + 3m = 13 \\ 5s + 7m = 31 \end{cases}$

كيف تفك مرشد؟

حل المسألة هو الزوج المترتب (s, m).

يمكنني رسم المستقيمين ببابا وقرابة إحداثي نقطه التقاطع،
 ولكن هذا ليس ضروري.

يمكنني استخدام المصفوفات في الحل.

ساعدك كتابة النظام في شكل معادلة مصفوفات.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 31 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 31 \end{bmatrix}$$

لإيجاد المصفوفة $\begin{bmatrix} s \\ m \end{bmatrix}$ سوف أضرب طرف المعادلة
 في النظير الضريبي للمصفوفة $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$.

والآن، بما أنني حصلت على النظير الضريبي فسوف أضرب.

لا يمكن أن أضرب

تذكرت ! يجب أن أضرب من جهة اليمين، لأن عملية ضرب المصفوفات ليست إبدالية.

ساعدك كتابة معادلة المصفوفات، ثم أضرب. هنا يعني أن:

$s = 2$ ، $m = 3$.

إحداثيا نقطه التقاطع هما $(2, 3)$.

مسألة إضافية

١) إحداثيا نقطه في المستوى هما حل النظام: $\begin{cases} 12s + 9m = 14 \\ 5s + 7m = 13 \end{cases}$

استخدم المصفوفات لحل النظام وإيجاد إحداثي هذه النقطة.

٢) ما المشاكل التي ستتعارض مرشدًا

٣) إذا لم يكن للنظام حلول؟

٤) إذا كان للنظام عدد غير منه من الحلول؟

٨٢

إجابات «مسألة إضافية»

$$\begin{bmatrix} 14 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 & 12 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \quad ①$$

$$0 \neq 19 = \begin{bmatrix} 14 \\ 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 & 12 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 12 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 13 - 7 \\ 19 - 19 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 - 7 \\ 12 - 5 \end{bmatrix} \frac{1}{19} = \begin{bmatrix} 12 \\ 19 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 14 \\ 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 - 7 \\ 12 - 5 \end{bmatrix} \frac{1}{19} = \begin{bmatrix} s \\ m \end{bmatrix}$$

$s = 1$ ، $m = 2$


إحداثيا النقطة هما $(1, 2)$.

٢) لن يوجد نظير ضريبي للمصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ، وبالتالي سوف يحتاج إحدى الطرق السابقة (الحذف أو التعويض).

(أ) لن يتمكن مرشد من إيجاد النظير الضريبي للمصفوفة لأن محدد المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ يساوي صفر.

(ب) يساوي المحدد في هذه الحالة صفرًا الذي لا ينتمي مرشد من إيجاد النظير الضريبي للمصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

مخطط تنظيمي للوحدة السابعة



٨٣

مراجعة الوحدة السابعة

(١) بيان الجدول درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في ست مناطق.

المنطقة	الدرجة الصغرى	الدرجة العظمى
١	٥٣٧-	٥٣٩
٢	٥٣٣-	٥٤٠
٣	٥١٤-	٥٤٢
٤	٥١-	٥٣٧
٥	٥٢٨-	٥٣٩
٦	٥٢-	٥٤٤

(١) اعرض البيانات في مصفوفة (في كل صف الدرجة العظمى والدرجة الصغرى لمنطقة). ما أبعاد هذه المصفوفة؟

(ب) حدد $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$ في التعبيرين (٢)، (٣) أوجد الناتج.

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 18 & 7 & 22 \\ 11 & 15 & 5 \\ 17 & 14 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 & 13 & 1 \\ 19 & 3 & 24 \\ 20 & 10 & 9 \end{bmatrix} \quad (3)$$

٥٢

في التعبيرين (٤-٦)، أوجد ناتج ضرب كل مما يأتي إن أمكن مع ذكر السبب.

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 3 \\ 4 & 21 \end{bmatrix}^3 \quad (5)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 8 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 15 & 9 \\ 7 & 2 & 8- \\ 1 & 8- & 23 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

في التعبيرين (٧-٨)، أوجد محدد كل مصفوفة.

$$\begin{bmatrix} 7 & 6- \\ 8 & 5 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{bmatrix} 5- & 1 \\ 9 & 2- \end{bmatrix} \quad (9)$$

في التعبيرين (٩-١٠)، أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة إن أمكن مع ذكر السبب.

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 16- & 14- \end{bmatrix} \quad (11)$$

في التعبيرين (١٢-١٧)، حل في من.

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \underline{\underline{m}} \times \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

٥٣

ملخص

- المصفوفة عبارة عن ترتيب من الأعداد على شكل مستطيل، ترتتب فيه الأعداد في صفوف وأعمدة وتكتب مثلاً: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$.

- يحدّد أي عنصر في المصفوفة بدلالة رقمي الصفت والمودع الواقع فيها.

- تكون المصفوفتان متساويتين إذا كانت لهما الرتبة (الإبعاد) نفسها، وكانت عناصرهما المتناظرة متساوية.

- تحصل على مصفوفة الجمع بجمع العناصر المتناظرة، كما ويمكنك أيضًا طرح المصفوفات عن طريق طرح العناصر المتناظرة.

- العناصر المتناظرة في المصفوفات هي العناصر التي لها الرتبة نفسها في كل مصفوفة.

- المصفوفة التي جميع عناصرها أصفار تسمى مصفوفة صفرية.

- المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ هي النظير الجمجمي للمصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

- خواص جمع المصفوفات: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- عند ضرب مصفوفة في عدد قياسي، يتضمن كل عنصر من المصفوفة في هذا العدد.

- تكون مصفوفة الضرب معرفة، إذا كان عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى ساواً لعدد العناصر في المصفوفة الثانية.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- لكي تقوم بعملية ضرب المصفوفات، اضرب عناصر كل صف من المصفوفة الأولى في عناصر كل عمود من المصفوفة الثانية، أوجد ناتج كل ضرب، ثم اجمع نواتج الضرب.

- إذا كانت $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ من الرتبة $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، فإن رتبة المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ هي $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

- خصائص ضرب المصفوفات: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- المصفوفة المربعة هي مصفوفة فيها عدد العناصر يساوي عدد الأعمدة.

- المصفوفة المربعة $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ التي عناصر قطاعها الرئيسي هي ١ وباقي العناصر هي صفر، تسمى مصفوفة الوحدة للضرب وتكتب في.

- مصفوفة الوحدة هي مصفوفة مرتبة عناصر قطاعها الرئيسي ١ وبقيمة العناصر صفر.

٨٤

في التعبيرين (٧-٦)، أوجد ناتج ضرب كل مما يأتي إن أمكن مع ذكر السبب.

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 3 \\ 4 & 21 \end{bmatrix}^3 \quad (5)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 8 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 15 & 9 \\ 7 & 2 & 8- \\ 1 & 8- & 23 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

- مصفوفة النظير (المعكوس) الضريبي للمصفوفة المربعة $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، تكتب $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$ ويكون:

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، وتحتسب النظير الضريبي للمصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

- تفترن كل مصفوفة مربعة بعد حذفها يسمى (محدد) ويرمز إليه بالرمز $|A|$ ويقرأ محدد المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. فإذا كانت $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{bmatrix}$

$$= \frac{1}{A-B-C} \begin{bmatrix} D & E & F \\ G & H & I \end{bmatrix}$$

حيث $A = B + C$.

- في المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، إذا كان $A = B = C = 0$. تسمى المصفوفة متفردة وليس لها نظير ضريبي.

- حل نظام من معادلين خطيين هو زوج مرتب يحقق المعادلين معاً.

- يمكن حل نظام من معادلين خطيين باستعمال نظير الضريبي للمصفوفة أو باستخدام المحددات (قاعدة كرامر).

٨٥

في التعبيرين (١١-١٠)، أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة إن أمكن مع ذكر السبب.

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 16- & 14- \end{bmatrix} \quad (11)$$

في التعبيرين (١٢-١٧)، حل في من.

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \underline{\underline{m}} \times \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

٧٤

تمارين إثرائية

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \underline{\underline{B}}, \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{A}} \quad (1)$$

(أ) هل للمصفوفات: $\underline{\underline{A}}$, $\underline{\underline{B}}$, $\underline{\underline{A}} + \underline{\underline{B}}$ نظير ضربي؟

(ب) أوجد $\underline{\underline{A}} - \underline{\underline{B}}$, $(\underline{\underline{A}} + \underline{\underline{B}})^{-1}$.

(ج) وضح ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة:

إذا كانت $\underline{\underline{B}}$ مصفوفة ذات نظير ضريبي، $\underline{\underline{A}} + \underline{\underline{B}}$ هي مصفوفة ذات نظير ضريبي فإن:

$$(\underline{\underline{A}} + \underline{\underline{B}})^{-1} = \underline{\underline{B}}^{-1} + \underline{\underline{A}}^{-1}.$$

(د) أعلم مثلاً عن مصفوفتين ذات نظير ضريبي شرط لا يكون المصفوفة مجموعهما نظيرًا ضريبيًا.

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \underline{\underline{B}}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\underline{A}} \quad (2)$$

(أ) أوجد $\underline{\underline{A}} + \underline{\underline{B}}$, ثم $(\underline{\underline{A}} + \underline{\underline{B}})^{-1}$.

(ب) أوجد $\underline{\underline{A}} \times \underline{\underline{B}}$, $\underline{\underline{B}} \times \underline{\underline{A}}$, $\underline{\underline{A}}^2 + \underline{\underline{B}}^2$. قارن بين إجابتك في (أ), (ب).

$$(ج) طبق الخطوات (أ), (ب) باستخدام $\underline{\underline{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$$

(٣) إذا طرحت ثلاثة أمثال عمر رباع من مثل عمر جاد تحصل على ٥. أما إذا طرحت ثلاثة أمثال عمر جاد من خمسة أمثال عمر رباع تحصل على ٢.

(أ) مثل المسألة أعلاه على شكل نظام معادلين من متغيرين.

٥٦

(ب) اكتب نظام معادلات على شكل معادلة مصفوفية: $\underline{\underline{B}} \times \underline{\underline{S}} = \underline{\underline{A}}$,

$$\text{حيث } \underline{\underline{A}} \text{ هي مصفوفة مربعة من الدرجة } 2 \times 2, \quad \underline{\underline{S}} = \begin{bmatrix} \underline{\underline{S}}_1 & \underline{\underline{S}}_2 \\ \underline{\underline{S}}_3 & \underline{\underline{S}}_4 \end{bmatrix}, \quad \underline{\underline{S}} \text{ من الدرجة } 2 \times 1.$$

(ج) أوجد حدد المصفوفة $\underline{\underline{A}}$. هل للمصفوفة $\underline{\underline{A}}$ نظير ضريبي؟ إذا كان لها نظيرًا ضريبيًا فأوجد $\underline{\underline{A}}^{-1}$.

(د) أوجد قيمة $\underline{\underline{S}}$, $\underline{\underline{S}} \text{ من ي استخدام } \underline{\underline{A}}^{-1}$.

(ه) حل نظام معادلات مستخدماً قاعدة كرامر.

$$(4) \text{ لتأخذ المصفوفات التالية:} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{B}}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{A}} \\ (أ) \text{ احسب } \underline{\underline{B}}^{-1}, \underline{\underline{A}}^{-1}.$$

(ب) لكل عدد حقيقي m , نعتبر المصفوفة $\underline{\underline{M}}(m)$, حيث إن:

$$\underline{\underline{M}}(m) = \underline{\underline{B}} + m \underline{\underline{A}} = \underline{\underline{B}} + m \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$1. \text{ تتحقق من أن: } \underline{\underline{M}}(m) = \underline{\underline{M}}(m).$$

2. احسب: $\underline{\underline{M}}(0), \underline{\underline{M}}(4)$.

3. $\underline{\underline{S}}$, $\underline{\underline{S}}$ عددين حقيقيان، احسب $\underline{\underline{M}}(m) \times \underline{\underline{M}}(n)$.

4. برهن أن: $\underline{\underline{M}}(m) \times \underline{\underline{M}}(n) = \underline{\underline{M}}(m+n)$.

(٥) التشكيك النقدي: لنكن $\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. ما هي قيم العناصر a_{ij} , b , c , d , عندما يكون النظير الضريبي للمصفوفة $\underline{\underline{A}}$ هو؟ (مساعدة: هناك أكثر من إجابة صحيحة واحدة).

٥٧

$$\begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{C}} - \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 1 & -3 & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} + \underline{\underline{C}} \quad (14)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -8 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = \underline{\underline{C}} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \underline{\underline{C}} + \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \underline{\underline{C}} \frac{1}{4} = \underline{\underline{C}}^2 \quad (17)$$

$$(18) \text{ حل النظام: } \begin{cases} 2s - c = 2 \\ 2s - 2c = 4 \end{cases} \text{ مستخدماً النظير الضريبي.}$$

$$(19) \text{ حل النظام: } \begin{cases} -3s + 5c = 4 \\ s - 3c = 4 \end{cases} \text{ مستخدماً طريقة كرامر.}$$

(٢٠) اكتب مصفوفتين $\underline{\underline{A}}, \underline{\underline{B}}$ كل منها من الدرجة 2×2 . أثبت أن ضرب المصفوفات هو غير إيدالي.

(٢١) هل كل مصفوفة ملائمة هي النظير الضريبي للأخرى؟

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

٥٤

(٢٢) اشتريت ١٠ قرنفلات و٥ أقحوانات بمبلغ ١٢,٥٠٠ ديناراً. وبعد ظهر اليوم نفسه اشتريت ٥ قرنفلات و٨ أقحوانات بمبلغ ١١,٧٥٠ ديناراً.

فما سعر القرنفلة الواحدة والأقحوانة الواحدة باستخدام المصفوفات؟

$$\begin{array}{l} \underline{\underline{C}} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}, \quad \underline{\underline{D}} = \begin{bmatrix} 12500 & 11750 \\ 11750 & 10 \end{bmatrix} \\ \underline{\underline{E}} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \\ \underline{\underline{F}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12500 & 11750 \\ 11750 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

٥٥

Trigonometry [2]

الوحدة الثامنة: حساب المثلثات [٢]

قسمت الدروس في هذه الوحدة إلى أجزاء.

٨ - ١: دائرة الوحدة في المستوى الإحداثي والدوال المثلثية (الدائيرية)

جزء ١: دائرة الوحدة.

جزء ٢: إشارات الدوال المثلثية.

جزء ٣: زاوية الإسناد.

٨ - ٢: العلاقات بين الدوال المثلثية (١)

جزء ١: العلاقات بين الدوال المثلثية للزاوية θ مع: $\theta + \frac{\pi}{2}$, $\theta - \frac{\pi}{2}$, $\theta + \pi$, $\theta - \pi$, $\theta + 2\pi$.

جزء ٢: حل معادلات مثلثية.

جزء ٣: تبسيط تعبيرات جبرية تحتوي على دوال مثلثية.

٨ - ٣: العلاقات بين الدوال المثلثية (٢)

جزء ١: متطابقات فيثاغورث.

جزء ٢: علاقات مثلثية.

جزء ٣: تبسيط عبارات تتضمن دوال مثلثية.

جزء ٤: برهنة صحة بعض المتطابقات المثلثية.

مقدمة الوحدة

الوحدة الثامنة

حساب المثلثات (٢) Trigonometry (2)

مشروع الوحدة: موجة المستقبل

١. **مقنة الشهور:** يتحدى مد وجزر المحيط على كمال من الطاقة. استحدثت هذه الطاقة خالل القرون العابرة لادارة عالمة ولكن بطريقة معروفة ومتكررة سهل الاستفادة منها.

يجب إجراء دراسة دقيقة لحركة المد والجزر لتحديد مكان وضع المحركات، بغية (الهدف) الاستفادة القصوى من الطاقة المولدة، بيني الشد عادة حيث يوجد أكبر فرق بين المد والجزر. تولد الطاقة من دخول الماء وخروجها من خلال السد. يتم استخدام مصادر أخرى للطاقة لدعم تلك المولدة من حركة المد والجزر عندما تخفف هذه الحركة.

٢. **الأدوات:** دراسة حول الطاقة المترتبة من حركة المد والجزر، وإمكانية الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية.

٣. **اللوارم:** أوراق ملبيترية، آلة حاسبة بيانية.

٤. **أسلة حول الطقس:**

٥. يسجل يومياً في مواقع معينة من العالم ارتفاع المياه فوق مستوى معين، بمعنى متوسط المياه المتخصصة Low Water Mean . يُبين الجدولان المرفقان المعلومات المسجلة في مواقعين، قدر فرقاً ومدى المد الذي تنتهي دوره المد والجزر في كل موقع.

الموقع الثاني		الموقع الأول	
ارتفاع أو انخفاض المياه	الوقت	ارتفاع المياه	الوقت
٧٣ سم	٤:٤٦ ب. ظ	١٨ سم	١١:٣٠ ق. ظ
١٠١ سم	١٠:٥٩ ب. ظ	١٤٦ سم	٥:٤٢ ب. ظ
٧٣ سم	٥:١١ ق. ظ	١٨ سم	١١:٥٥ ب. ظ
١٠١ سم	١١:٢٤ ق. ظ	١٤٦ سم	٦:٠٧ ق. ظ

٦. يتأثر المد والجزر بمواقع القمر والقمر، بحيث أصغر أو أكبر مد وجزر عندما يكون القمر هلالاً أو بذراً. ابحث عن رابط موقع القمر وقوة المد والجزر، وارسم تمثلاً بيانياً بين تحولات المد والجزر بدلالة الوقت خلال شهر قمري معين.

٧. كيف يمكن تفسير عدم ثبات المد المترتبة من حركة المد والجزر؟

٨. أوجد بعض المناطق على الكره الأرضية حيث يمكن إقامه سدود للاستفادة من حركة المد والجزر.

٩. **التقرير:** مرتكزاً على الأبحاث التي قمت بها، أكتب مقالاً مسلياً تبين فيه مزايا وعيوب هذه الطاقة. هل تعتقد أنه يمكن تشكيل مصدر عملي للطاقة الكهربائية في المستقبل؟

دروس الوحدة

العلاقات بين الدوال المثلثية (٢)	ال العلاقات بين الدوال المثلثية (١)	دائرة الوحدة في المستوى الإحداثي والدوال المثلثية (الذاتية)
٣-٨	٢-٨	١-٨

سوف يكمل الطالب في الوحدة الثامنة تطوير مفاهيمه وتنمية مهاراته في حساب المثلثات حيث تعرف على حساب المثلثات في الوحدة الثانية على أنها نسباً مثلثية في المثلث قائم الزاوية. ولكن في هذه الوحدة سوف يكون أمام الطالب حساب مثلثات كدالة لمتغير على دائرة الوحدة. لذا كان لا بد للطالب أن يستخدم مكتسباته عن الدائرة وعلاقة نصف قطرها مع الماس عند نقطة التماس، وأيضاً عن نظرية فيثاغورث والمثلثات المتشابهة والأضلاع المتناسبة فيها. من المفيد أن نشير هنا إلى أهمية النسب المثلثية والدوال المثلثية في التطبيقات الحياتية، حيث ساهمت في إيجاد حلول مشاكل تواجه الإنسان وخاصة في القياسات غير المباشرة والعلوم العسكرية... أخبرهم أن التعامل مع الدوال المثلثية سوف يستمر في السنوات القادمة في مجالات علمية متعددة ولن يقتصر الأمر على الرياضيات فقط.

مشروع الوحدة

يقدم هذا المشروع أمام الطلاب معطيات علمية مهمة. فهو يؤكّد على كيفية استخدام ظاهرة طبيعية لها علاقة بحركة القمر ودورانه حول الأرض، إذ يحول حركة المد والجزر في البحار إلى طاقة يستخدمها الإنسان في مواقف مختلفة.

فبدلاً من أن نقف في ليلة قمرية يكتمل البدر فيها نتأمل حركة المد والجزر، يحفزنا هذا المشروع على أن نأخذ ورقة وقلماً ونسجل الأوقات وارتفاع المياه لنكتب بعدها دالة جيوبية، ثم نعيد التجربة عندما يكون القمر على شكل الملال... .

إجابات «أسئلة حول التطبيق»

(أ) الموضع الأول:

من ٣٠:١١ ق. ظ إلى ٥٥:١١ ب. ظ ← الفترة

١٢ ساعة ٢٥ دقيقة

من ٤٢:٥ ب. ظ إلى ٦٠:٧ ق. ظ ← الفترة

١٢ ساعة ٢٥ دقيقة

$$\text{المدى} = \frac{128 - 146}{2} = \frac{18 - 14}{2} = 64 \text{ سم}$$

الفترة هي المدة الفاصلة بين ارتفاع معين وإعادة تكراره

الموضع الثاني:

من ٤٦:٤ ب. ظ إلى ٥١:٥ ق. ظ ← الفترة

١٢ ساعة ٢٥ دقيقة

من ١٠:٥٩ ب. ظ إلى ١١:٢٤ ق. ظ ← الفترة

١٢ ساعة ٢٥ دقيقة

$$\text{المدى} = \frac{174 - (73 - 101)}{2} = \frac{174 - 72}{2} = 87 \text{ سم}$$

(ب) تتحقق من عمل الطالب.

(ج) تتحقق من عمل الطالب.

(د) تتحقق من عمل الطالب.

التقرير

قدم تقريراً مفصلاً عن عملك. ناقش مع زملائك النقاط الأساسية في المشروع. أعد النظر ببعض النتائج إذا كان ذلك ضرورياً.

سلم التقييم

٤.	الحسابات صحيحة. البحث شامل. التفسيرات جيدة. التقرير مفصل وواضح.
٣.	الحسابات بمعظمها صحيحة. البحث مقبول. التفسيرات مقبولة. التقرير مفصل ومعظمها واضح.
٢.	الحسابات بعضها صحيح. البحث يتضمن غموض. التفسيرات غير منطقية في بعض الأحيان. التقرير ينقصه الإيضاح.
١.	معظم عناصر المشروع ناقصة وغير مقبولة.

الوحدة الثامنة

أخف إلى معلوماتك

أطلق اسم جيب (sin) على دالة الجيب في القرون الوسطى. جاءت هذه النسبة من الكلمة سنسكريتية (Sanskrit) وهي (जीवा) وتعني الورل. وقد استخدمت (Araybheta) أو لا في الهند مع (aryabha) سنة ٤٠ م. وكانت تعني نصف دائرة ولكن تم اختصارها، ونقطت إلى اللغة العربية تحت اسم (جيبا) (jiba) وهي مشابهة لكلمة (جيب)، وتعني الصدر (أو) التجويف. أما في الوقت العاشر ذكر الكلمة جيب في اللغة العربية هي مرادفة لكلمة (sin).

وقد المترجون عند تقليل الناتج التكبيري (sinus) إلى اللاتينية آنـة الكلمة (tangent) تعني أيضاً الصدر (أو) التجويف، ومن الكلمة (sinus)حصلنا على كلمة (tangent) التي تعود إلى (Thomas Finck) عام ١٥٨٣.

القطعة المستقيمة (جـ) هي مسافة للدائرة في النقطة جـ. لنأخذ بـ = ١ فيكون ظاهـ = $\frac{\pi}{4}$ = ٥٧° = جـ، كما وعرفت umbra versa (tangent) وتعني ظل المدار. يستخدم دائرة الوحدة في حل تمارين تتعلق بالدوال المثلثية.

أين أنت الآن (العقارب السابقة المكتسبة) تعلم كلية استخدام النسب المثلثية.

تعلمت كيفية استخدام نظرية فيثاغورث.

ماذا سوف تتعلم؟

- سوف تعرف دائرة الوحدة.
- سوف توحد العلاقات النقطية على دائرة الوحدة لاستخدامها في إيجاد قيم الدوال المثلثية.
- سوف توجد العلاقة بين الدوال المثلثية لزاوية حادة لحل المعادلات المثلثية.
- سوف تقوم بتبسيط عبارات جبرية تحتوي على دوال مثلثية.
- سوف توجد العلاقة بين:
 - جـ، جـ٠ لأي زاوية.
 - ظـ٠ وقـ٠ لأي زاوية.
 - ظـ٠٠ وقـ٠٠ لأي زاوية.
- سوف تستطع عبارات تتضمن دوال مثلثية وتغيرهن صحة متطابقات مثلثية.

المصطلحات الأساسية

دائرة الوحدة - دوال مثلثية - إشارات الدوال المثلثية - إشارات مقلوب دائرة مثلثية - الربع الثاني - الربع الثالث - الربع الرابع - زاوية الاستاد - متطابقات.

١-٨: دائرة الوحدة في المستوى الإحداثي والدوال المثلثية (الدائرية)

دائرة الوحدة في المستوى الإحداثي والدوال المثلثية (الدائرية)
The Unit Circle in the Coordinate Plane and Trigonometric Functions (Circular Functions)

١-٨

عمل تعاوني

استخدم الفرجار وارسم دائرة د طول نصف قطرها ١ (وحدة قياس) ومركزها نقطة الأصل
للمحورين المتعامدين في المستوى الإحداثي. استخدم مترنمه وارسم زاوية موجبة في وضع قياسي قياسها 30° .
الدوال المثلثية (الدائرية) يقطع الصانع النهائي دائرة (في الربع الأول) في الخط (س، ص).
إشارات الدوال المثلثية ١ ما الفرق بين يمكنك استخدامها لإيجاد إحداثيات م؟ بدون استخدام آلة حاسبة
زاوية الإنذار ٢ استخدم إحدى هذه الطرق وأوجد قيم س، ص.
اكتب هذه القيم على شكل كسور عشرية.
٣ استخدم آلة حاسبة لإيجاد: جتا 30° ، جا 30° .
قانون هذه النسب بما وجدته في السؤال (٢).
٤ كرر الخطوات أعلاه مستخدماً زاوية قياسها 45° . ما إحداثيات النقطة الجديدة؟
٥ ضع تخمينك ما العلاقة بين إحداثيات النقطة م على الدائرة التي رسنتها وقيم جيب تمام وجيب الزاوية في الوضع القياسي والتي يمر ضلعها النهائي في م؟

دائرة الوحدة هي دائرة مركزها نقطة الأصل، وطول نصف قطرها واحد وحدة.

The Triangular Point هي تقاطع الصانع النهائي لزاوية موجبة في الوضع القياسي مع دائرة الوحدة.

ملاحظة: تكون النقطة (س، ص) نقطة مائية إذا وفقط إذا كان $s^2 + c^2 = 1$.
سوف نستخدم الرمز θ لنرمز إلى قياس زاوية موجبة في الوضع القياسي.
النسب المثلثية لزاوية التي قياسها θ
بفرض أن زاوية موجبة في الوضع القياسي قياسها θ , يقطع ضلعها النهائي دائرة الوحدة في النقطة (س، ص).
٨٨

١ الأهداف

- يتعرف دائرة الوحدة.
- يتعرف النقطة المثلثية.
- يتعرف الدوال المثلثية (الدائرية).
- يحدد إشارات الدوال المثلثية.
- يوجد زاوية الإسناد ويستخدمها.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

دائرة الوحدة - النقطة المثلثية - زاوية الإسناد - الدالة المثلثية.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة مدرجة - فرجار - منقلة - آلة حاسبة - حاسوب -
جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

أسأل الطلابتعريف:

- النسب المثلثية في المثلث قائم الزاوية:
جا، جتا، ظا، طتا، طتا،
- الزاوية الموجبة في الوضع القياسي.
- الزاوية الموجبة السالبة في الوضع القياسي.
- المثلث الثلاثي ستيني.

٥ التدريس

في فقرة «عمل تعاوني»، اشرح للطلاب أن المقصود بوحدة القياس هي الوحدة المشتركة المستخدمة على المحورين وأن طول نصف قطر دائرة الوحدة يجب أن يساوي هذه الوحدة. ركز مع الطالب على فكرة أن كل نقطة في المستوى الإحداثي تكون معرفة دائمًا بزوج مرتبت (س، ص)، حيث س الإحداثي السيني، ص الإحداثي الصادي وبالتالي كل نقطة على دائرة الوحدة سوف تعرف أيضًا بزوج مرتبت (س، ص) حيث $s^2 + c^2 = 1$ وهي النقطة المثلثية.

معلومة مفيدة: عادة ما يستخدم الحرف اليوناني θ (يلفظ ثيتا) للتعبير عن زاوية.

معلومة مفيدة: عندما تقول زاوية θ أو ... تقصد الزاوية التي قياسها θ أو ...

مثال (١): باستخدام دائرة الوحدة أوجد جا 30° ، جتا 30° .

الحل: نرسم دائرة الوحدة، ونرسم الزاوية الموجبة التي قياسها 30° في الوضع القياسي. فيكون $s = 1$ = وحدة طول نسق من عمود على المحور السيني وايكن M . M هو قائم الزاوية. (M) 30° . M هي في المثلث الثلاثي السيني طول الضلع المقابل للزاوية $= \frac{1}{2}$ طول الوتر. \therefore وهـ $\frac{1}{2}$ \therefore إحداثيا النقطة M مما $\frac{\sqrt{3}}{2}$. \therefore جتا $30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. \therefore جا $30^\circ = \frac{1}{2}$.
حاول أن تحل ١ على دائرة الوحدة، ارسم زاوية موجبة في الوضع القياسي قياسها 45° . ثم أوجد جتا 45° ، جا 45° . يمكن استخدام مثلث قائم الزاوية لإيجاد جتا θ لأن زاوية θ موجبة في الوضع القياسي لابتعض ضلعها النهائي في الربع الأول.

٨٩

وكلما تغيرت النقطة على دائرة الوحدة سوف تحدد زاوية مركبة مع محور السينات، قياسها يساوي قياس القوس المحصور بين محور السينات ونصف قطر الواصل من مركز الدائرة إلى هذه النقطة.

اطلب إليهم رسم المستقيم العمودي من أي نقطة على الدائرة على محور السينات والمستقيم العمودي من هذه النقطة على محور الصادات. أسلأهم تعريف الوتر في المثلث قائم الزاوية الذي حصلوا عليه وإيجاد طول الوتر. دعهم يعرفون بصوت مرتفع النقطة المثلثية على دائرة الوحدة. شجعهم على الرابط بين النسب المثلثية في المثلث قائم الزاوية ليتعرفوا على التتابع الجديد على دائرة الوحدة.


ركز معهم على فهم الاتجاه الموجب والسابل للزاوية على دائرة واحدة. أخبرهم أن هذه الحالات لم نستخدمها في النسب المثلثية على المثلث قائم الزاوية وأنهم الآن سوف يحسبون نسباً مثلثية لزوايا سالبة وأيضاً لزوايا قياسها أكبر من 90° .

مثال توضيحي

أقم حواراً مع الطلاب وأنتم تتعامل مع المثال التوضيحي، حيث المطلوب إيجاد $\sin(120^\circ)$ وجتا (120°) لأن الطلاب سيتفاجئون مع زاوية قياسها -120° .

شدّد على فكرة ربط النسب المثلثية على دائرة الوحدة مع الإحداثي السيني والإحداثي الصادي على المحاور مقارنة بنقطة الأصل للمحورين المتعامدين. سوف يتتأكد الطلاب من إشارة جا، جتا بحسب موقع النقطة المثلثية على دائرة الوحدة.

اشرح لهم جيداً مفهوم زاوية الإسناد. أخبرهم أنه بالإمكان إيجاد قياس هذه الزاوية باستخدام المنقلة. ثم أعط أمثلة لتبيّن لهم أهمية هذه الزاوية، عند حساب النسب المثلثية لزاوية قياسها أكبر من 90° .



٢ مستخدماً طريقة المثال التوضيحي، أوجد جتا $\frac{\pi}{3}$ ، جا $\frac{4\pi}{3}$.

تدريب

استخدم آلة حاسبة وأكمل الجدول التالي مقرنا الناتج لأقرب رقمين عشربيين:									
قياس الزاوية θ									
النسبة	$\sin(\theta)$	$\cos(\theta)$	$\tan(\theta)$	$\csc(\theta)$	$\sec(\theta)$	$\cot(\theta)$	$\sinh(\theta)$	$\cosh(\theta)$	$\tanh(\theta)$
جا $\frac{\pi}{3}$	0.87	0.50	1.73	1.15	2.00	0.58	0.87	1.15	0.50
جتا $\frac{4\pi}{3}$	-0.87	-0.50	1.73	-1.15	-2.00	-0.58	-0.87	-1.15	-0.50

٤٠

Circular Functions (Trigonometric Functions)


إذا كانت (x, y) هي النقطة المثلثية لزاوية قياسها θ وتحرك الصisel النهائي لهذه الزاوية في الاتجاه الموجب (الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة)، فإن ميل خطابي دائرة الوحدة وياناي تغيرها كل من x ، y ويكون: لكل قيمة تأخذها θ حيث $\exists \theta \in (0^\circ, 360^\circ)$ قيمة واحدة لكل من المتغيرين x ، y حيث x, y متباين إلى $[0, 1]$. [١].

معلومات رياضية:

- الاتجاه الموجب هو الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة.
- النقطة المثلثية (x, y) يمكن التعبير عنها بـ $(\cos \theta, \sin \theta)$.

تعريف:
إذا كانت (x, y) هي النقطة المثلثية لزاوية قياسها θ حيث $0 < \theta \leq 2\pi$ فإن:

- (١) دالة الموجب $D = \{0\} \Rightarrow \text{جتا } \theta = 0$ حيث $\theta = 0^\circ$ (الإحداثي الصادي للنقطة المثلثية)
- (٢) دالة جيب تمام $D = \{0\} \Rightarrow \text{جتا } \theta = \pm 90^\circ$ (الإحداثي السيني للنقطة المثلثية)
- (٣) دالة ظا $D = \{0\} \Rightarrow \text{ظا } \theta = \pm \infty$ حيث $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$
- (٤) دالة القطاع $D = \{0\} \Rightarrow \text{قتا } \theta = \pm 1$ حيث $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$
- (٥) دالة قاطع تمام $D = \{0\} \Rightarrow \text{قطا } \theta = \pm \infty$ حيث $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$
- (٦) دالة ظل تمام $D = \{0\} \Rightarrow \text{ظنا } \theta = \pm \infty$ حيث $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$



يمكن بسهولة إيجاد قيم الدوال المثلثية لبعض قيم θ الخاصة.

قياس الزاوية θ									
الدالة	$\sin(\theta)$	$\cos(\theta)$	$\tan(\theta)$	$\csc(\theta)$	$\sec(\theta)$	$\cot(\theta)$	$\sinh(\theta)$	$\cosh(\theta)$	$\tanh(\theta)$
$\sin(\theta)$	0.87	0.50	1.73	1.15	2.00	0.58	0.87	1.15	0.50
$\cos(\theta)$	0.50	0.87	0.58	2.00	1.15	1.73	-0.50	0.87	-0.87
$\tan(\theta)$	1.73	0.50	3.42	1.15	2.00	0.58	0.87	1.15	0.50
$\csc(\theta)$	1.15	2.00	-3.42	-1.15	-2.00	-0.58	-0.87	-1.15	-0.50
$\sec(\theta)$	2.00	1.15	0.58	2.00	1.15	0.58	0.87	0.50	0.87
$\cot(\theta)$	0.58	3.42	0.50	-0.58	-3.42	-0.50	-0.50	-0.87	-1.73
$\sinh(\theta)$	0.87	0.50	1.73	1.15	2.00	0.58	0.87	1.15	0.50
$\cosh(\theta)$	0.50	0.87	0.58	2.00	1.15	1.73	-0.50	0.87	-0.87
$\tanh(\theta)$	1.73	0.50	3.42	1.15	2.00	0.58	0.87	1.15	0.50

٩١

٦. الربط

زاوية مركبة على دائرة الوحدة قياسها 150° . باستخدام زاوية الإسناد أوجد: جا 150° , جتا 150° , ظا 150° .

المثلث القائم وم د ثلاثي سيني

$$\begin{aligned} \text{د} &= \frac{1}{2}, \text{ و} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{فيكون جا } 150^\circ &= \frac{1}{2} \\ \text{جتا } 150^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{ظا } 150^\circ = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

٧. أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخاطئ الطالب في تحديد جيب الزاوية وجيب تمام الزاوية على المحاور. أكد لهم أن المحور الأفقي هو محور جيب تمام الزاوية وأن المحور العمودي هو محور جيب الزاوية.

٨. التقسيم

تابع الطلاب وهم يحيطون عن فقرات «حاول أن تحل» لتأكد من فهمهم العلاقة بين النسب المثلثية ودائرة الوحدة والمحاور المرافق.

تذكرة
زاوية الإسناد للزاوية الموجبة (وب، وج) التي في وضع قياسي هي الزاوية الحادة α التي يصطفها الضلع النهائي للزاوية الموجبة مع محور السينات.
إذا كان α زاوية الإسناد فإن: $0^\circ < \alpha < 90^\circ$

تعريف زاوية الإسناد:
زاوية الإسناد للزاوية الموجبة (وب، وج) التي في وضع قياسي هي الزاوية الحادة α التي يصطفها الضلع النهائي للزاوية الموجبة مع محور السينات.
إذا كان α زاوية الإسناد فإن: $0^\circ < \alpha < 90^\circ$



مثال (٣)
رسم كلاً من الزوايا الموجبة في وضع قياسي، ثم عَنِّ زاوية الإسناد وأوجد قياسها لكل مما يلي:

$$\frac{\pi}{6}$$

$$210^\circ$$

$$120^\circ$$

الحل:

$$\begin{aligned} 1. \quad &120^\circ = \theta \\ &\theta = 180^\circ - 60^\circ \\ &120^\circ - 180^\circ = -60^\circ \\ &60^\circ = \alpha \end{aligned}$$

اختبار سريع

١ أوجد جا $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$ ، جتا $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ، جي $\frac{\pi}{3}$

٢ إذا كانت $0 < \theta < 90^\circ$ ، ما هي إشارة كل من جا θ ، جي θ ، جتا θ ؟

٣ أوجد قياس زاوية الاسناد لكل من الزوايا التالية:

٤٦. $120^\circ = \theta$

٤٥. $230^\circ = \theta$

٤٣. $150^\circ = \theta$

٩ إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

١ باستخدام العمود المرسوم من م، على محور السينات والعمود المرسوم من م، على محور الصادات.

٢ بما أن الزاوية المركزية قياسها 30° يكون لدينا مثلث قائم ثلاثي سيني. لذا ص $= \frac{1}{2} = 0, 5$ ،


$$\text{س} = 866 \approx \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

٣ جا $30^\circ = 0, 5$ ، جتا $30^\circ = 0, 866$ ، بـ المقارنة


نجد أن: ص $= 30^\circ = 0, 5$ ،

$$\text{س} = \text{جتا} 30^\circ = 0, 866$$

٤ (أ)، (ب)، تحقق من عمل الطلاب.



٩٤




٥٨


«حاول أن تحل»

١

في التمرينين (٤-٣)، باستخدام دائرة الوحدة أوجد جيب تمام الزاوية وجيب الزاوية لكل من:



٢٢٥ (٤)



٦٠ (٣)

في التمارين (٧-٥)، بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد جيب تمام، جيب، ظل الزاوية على الترتيب لكل من الزوايا التالية:

$\frac{\pi}{4}$ (٥)

٦٠ (٦)

٠ (٧)

في التمارين (١١-٨)، في أي ربع أو على أي محور يقع الفسلع النهائي لكل من الزوايا التالية:


١٥٠ (٨)

$\pi -$ (٩)


٦٠- (١٠)

$\frac{\pi\sqrt{3}}{6}$ (١١)

(١) أكمل الفراغ في الرسم أدناه.



٥٩



$$\text{جا } 45^\circ = \text{جتا } 45^\circ$$

$$1,707 \approx \frac{\sqrt{2}}{2} =$$

$$\frac{\pi}{4} - \pi = \frac{\pi^3}{4}$$

$$\text{جتا } \frac{\pi^3}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi^3}{4} \text{ جا}$$

(ب) افترض أن جتا θ سالبة جا θ موجبة. يقع الفسلع النهائي للزاوية θ في:

- (أ) الربع الأول (ب) الربع الثاني (ج) الربع الثالث (د) الربع الرابع

(١٣) الكتابة في الرياضيات: فنـر كـيفـة إيجـاد جـيب، جـيب تمام الزـوايا التـالية: ٥٣٦٠، ٥٢٧٠، ٥١٨٠، ٥٩٠، ٥٠، ٥٣٦٠، ٥٢٧٠، ٥١٨٠، ٥٩٠، ٥٠ بدون استخدام الآلة الحاسبة.

في التمارين (١٤)، ارسم كلًّا من الزوايا الموجهة التالية في وضع قياسي، ثم عين زاوية الإسناد وأوجد قياسها.

$\frac{\pi\sqrt{2}}{3}$ (١٥)

٦١٠ (١٤)

$\frac{\pi\sqrt{3}}{3}$ (١٧)

٦١٧٠ (١٦)

في التمرينين (١٩-١٨)، اختر الإجابة الصحيحة:

(١٨) الزاوية التي في الوضع القياسي وقياس زاوية إسنادها مختلف عن الزوايا الأخرى هي:

- (أ) ٦١٧٠ (ب) ٦١٩٠ (ج) ٦٣٥٠

- (د) ٦١١٠ (ب) ٦٣٥٠

(١٩) الزاوية التي في الوضع القياسي وضلعها النهائي يمر بالنقطة $M\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{7}}{2}\right)$ التي تقع على دائرة الوحدة هي:

- (أ) ٦٢٢٥ (ب) ٦٤٥

- (ج) ٦٣٥ (د) ٦١٣٥

٦٠


٣) θ تقع في الربع الثاني أو الثالث

$\text{جتا } \theta > 0$

(ب) θ تقع في الربع الأول أو الثاني

$\text{جا } \theta < 0$

٤)



$${}^{\circ}70 + {}^{\circ}180 = {}^{\circ}\theta$$

$${}^{\circ}250 = {}^{\circ}\theta$$

«تدریب»

المجموعة ب تمارين تمرينية

في المارين (١-٤)، إذا كانت العبارة صحيحة ظلل (١) وإذا كانت خاطئة ظلل (٤).

- (ب) (١)
- (ب) (٢)
- (ب) (٣)
- (ب) (٤)

$$(1) \text{ جتا}(\frac{1}{\sqrt{3}}) = (\frac{1}{3})$$

$$(2) \text{ جا}(\frac{1}{\sqrt{2}}) = (\frac{1}{2})$$

$$(3) \text{ ظ}(-\frac{1}{\sqrt{3}}) = (-\frac{1}{3})$$

$$(4) \text{ قا}(\frac{1}{\sqrt{3}}) = (\frac{1}{3})$$

في المارين (٩-٥)، اختر الإجابة الصحيحة:

(٥) الزاوية التي يقع ضلعها النهائي في الربع الرابع في ما يلي هي:

$$(أ) {}^{\circ}270 -$$

$$(ب) \frac{\pi}{12}$$

$$(ج) \frac{7\pi}{3}$$

$$(د) \frac{13\pi}{4}$$

(٦) الزاوية التي في الوضع القياسي وقياس زاوية إسنادها مختلف عن الزوايا الأخرى هي:

$$(أ) \frac{7\pi}{4}$$

$$(ب) \frac{15\pi}{4}$$

$$(ج) \frac{21\pi}{4}$$

$$(د) \frac{27\pi}{4}$$

(٧) الزاوية التي في الوضع القياسي وقياس زاوية إسنادها $\frac{\pi}{3}$ هي:

$$(أ) \frac{11\pi}{6}$$

$$(ب) \frac{25\pi}{6}$$

$$(ج) \frac{29\pi}{6}$$

$$(د) \frac{35\pi}{6}$$

(٨) زاوية في الوضع القياسي قياسها يساوي -225° . فإن النقطة المثلثية التي يمكن أن تقع على الضلع النهائي لهذه

الزاوية هي:

$$(أ) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$(ب) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$(ج) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$(د) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

= [جا(٠١٣٥) - جتا(٠١٣٥)] + [جا(٠٢٥) - جتا(٠٢٥)] (٤)

$$(أ) \frac{1}{2}$$

$$(ب) صفر$$

$$(ج) \frac{1}{3}$$

٦١

النسبة	قياس الزاوية θ								
		٥٣١٠	٥٢٥٠	٥٢٢٠	٥١٦٠	٥١٣٠	٥٨٠	٥٤٠	٥٢٠
جا θ		٠,٧٧-	٠,٩٤-	٠,٦٤-	٠,٣٤	٠,٧٧	٠,٩٨	٠,٦٤	٠,٣٤
جتا θ		٠,٦٤	٠,٣٤-	٠,٧٧-	٠,٩٤-	٠,٦٤-	٠,١٧	٠,٧٧	٠,٩٤
ظ θ		١,١٩-	٢,٧٥	٠,٨٤	٠,٣٦-	١,١٩-	٥,٦٧	٠,٨٤	٠,٣٦

٢-٨: العلاقات بين الدوال المثلثية (١)

العلاقات بين الدوال المثلثية (١) Relations Between Trigonometric Functions (1)

٥-٨

عمل تعاوني

١ على دائرة الوحدة، عن زاوية موجبة مقدمة θ في الوضع القياسي ضلها النهائي في الربع الأول.

أوجد θ .

استخدم آلة حاسبة لإيجاد:

جا، جتا، جا(-)، جتا(-).

٢ كرر الخطوات في ١ مع زاوية موجبة مقدمة س ضلها النهائي في الربع الثاني.

٣ بسيط تعبيرات جبرية تختوي على دوال مثلثية تسمى جا، جتا، جا(-)، جتا(-) وتنبع النسب المثلثية للزاوية التي قياسها θ وتنبع النسب المثلثية الأساسية.

عندما يأن:

$1 \geq \theta \geq 0$
 $1 \geq \theta \geq -1$
 $0 \geq \theta \geq -1$
 $\text{ظا}(\theta) = 0$

النسب المثلثية للزوايا

النقطة المثلثية m هي انعكاس لنقطة المثلثية M في محور السينات حيث $M(s, c) \rightarrow m(-s, -c)$

تذكرة

ث. يعني انعكاس في محور السينات.

مقدون:

جا(-) = جا($-\theta$)
 جتا(-) = جتا($-\theta$)
 وبيانلي ظا(-) = ظا($-\theta$) شرط أن يكون ظا θ معرف.

٩٥

١ الأهداف

- يوجد العلاقة بين الدوال المثلثية للزاوية θ والدوال المثلثية لكل من الزوايا $(-\theta)$, $(\theta - \pi)$, $(\theta + \frac{\pi}{2})$, $(\theta - \frac{\pi}{2})$, $(\theta + \pi)$.
- يمثل معادلات مثلثية.
- يسimplifies جبرية تحتوي على دوال مثلثية.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

نسب مثلثية أساسية - دالة مثلثية - العلاقات بين الدوال المثلثية - معادلات مثلثية - بسيط تعبيرات مثلثية.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة مدرجة - فرجار - منقلة - آلة حاسبة - حاسوب -
(Data show).
جهاز إسقاط (Elevation device).

٤ التمهيد

أسئلة الطلاب:

- ما هي دائرة الوحدة؟ وما طول نصف قطرها؟
- كيف تعرف جا، جتا لزاوية على محور السينات ومحور الصادات؟
- كيف يوجد انعكاس نقطة في محور ما؟
- كيف تجد انعكاس نقطة في نقطة ما؟
- كيف تعرف أن مثلثين قائمي الزاوية هما متطابقان؟

مثال (١)

١ إذا كان $\text{جتا} = \frac{\sqrt{27}-\sqrt{3}}{2}$ فأوجد $\text{جتا}(\theta - \frac{\pi}{8})$.

٢ إذا كان $\text{جتا} \approx 0,5878$ فأوجد $\text{جتا}(-0,936)$.

٣ إذا كان $\text{ظا} = 1 = 90^\circ$ فأوجد $\text{ظا}(-\theta)$.

الحل:

١ $\text{جتا} = \frac{\sqrt{27}-\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}(3-\sqrt{3})}{2} = \frac{\sqrt{3}(3-2)}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

٢ $\text{جتا} \approx 0,5878 \approx 0,936$

٣ $\text{ظا} = 90^\circ = \text{ظا}(-90^\circ) = \text{ظا}(-\theta)$

حاول أن تحل

١ أكمل إذا كان:
 جام = ...
 فان جا(-) = ...
 جتا = ...
 فان جتا(-) = ...
 ظاس = ...
 فان ظا(-) = ...
 جتا(-ص) = ...

النسب المثلثية للزوايا

النقطة المثلثية m هي انعكاس لنقطة المثلثية M في محور الصادات.

حيث $M(s, c) \rightarrow m(-s, -c)$

فيكون: $\text{جتا} = \text{جتا}(-\theta)$
 $\text{جا} = \text{جا}(-\theta)$

تذكرة

ث. يعني انعكاس في محور الصادات.

مقدون:

جتا(-) = جتا($-\theta$)
 جا(-) = جا($-\theta$)
 وبيانلي ظا(-) = ظا($-\theta$) شرط أن يكون ظا θ معرفاً.

٩٦

بعد أن تعرف الطالب في الدرس السابق على النسب المثلثية الأساسية $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$... سوف يوسع الآن معارفه عن النسب المثلثية ليجد دوال مثلثية على دائرة الوحدة ويحدد العلاقات بين $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$... ودوال لزوايا مختلفة بدءاً من المعكوس الجمعي $\arcsin \theta$ للزاوية θ مروراً بالزاوية المتممة والزاوية المكملة وصولاً إلى زوايا ناتج الفرق بينها $\frac{\pi}{2}$ أو π .

وضح للطلاب مفهوم العلاقات من خلال دائرة الوحدة، وزاوية الاسناد حفظهم على رسم كل حالة أمامهم وإيجاد كل علاقة بدلأ من حفظها غيّراً.

أخبرهم أن ذلك سوف يساعدتهم كثيراً على تبسيط التغيرات التي تتضمن دوال مثلثية كما في المثال (٤).

توسّع معهم في حل المعادلات. قبل البدء في حل المعادلات المثلثية اعرض أمامهم نشاطاً عن دائرة الوحدة ليفهموا فكرة وجود حلول كثيرة.

مثال ذلك:

أوجد على دائرة الوحدة حل المعادلة: $\sin \theta = \frac{1}{2}$.
اطلب إليهم رسم دائرة الوحدة، ثم من النقطة $(0, \frac{1}{2})$ ارسم مستقيمي عمودي على محور الصادات حيث يقطع الدائرة بنقطتين M ، m ، وبالتالي يوجد زاويتان لها $\sin \theta = \frac{1}{2}$. إذا افترضنا دورات كاملة على الدائرة من M وإليها، ومن m ، وإليها يكون هناك حلول لا متناهية للزاوية θ حيث $\sin \theta = \frac{1}{2}$. ويمكن أيضاً تقديم نشاط آخر حول جتا θ ...

شدد للطلاب على فكرة أنه في حلول معادلة تتضمن دوال مثلثية يجب أن يكون طرفاً المعادلة من دالة واحدة، وبالتالي يمكن استخدام العلاقات بين الدوال المثلثية لتحقيق ذلك.


معلومة مفيدة:
إذا كانت الزاوية α هي زاوية الإسقاط للزاوية θ فإن:
 $\begin{aligned} \sin \alpha &= \sin \theta \\ \cos \alpha &= -\cos \theta \\ \tan \alpha &= -\tan \theta \end{aligned}$
 فمثلث الزاوية α زاوية إسقاط للزاوية θ .
 $\sin \alpha = \sin \theta$

مثال (٢):
بدون استخدام الآلة الحاسبة
إذا كان:
 $\begin{array}{l} ① \quad \sin \theta = \frac{1}{2}, \text{ فأوجد } \sin(\theta + \frac{\pi}{2}). \\ ② \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ فأوجد } \sin(\theta - \frac{\pi}{2}). \\ ③ \quad \tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ فأوجد } \tan(\theta - \frac{\pi}{2}). \end{array}$
الحل:
 $\begin{array}{l} ① \quad \sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \sin \theta \cos \frac{\pi}{2} + \cos \theta \sin \frac{\pi}{2} = \sin \theta \cdot 0 + \cos \theta \cdot 1 = \cos \theta = \frac{1}{2}. \\ ② \quad \sin(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta \cos \frac{\pi}{2} - \cos \theta \sin \frac{\pi}{2} = \sin \theta \cdot 0 - \cos \theta \cdot (-1) = \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}. \\ ③ \quad \tan(\theta - \frac{\pi}{2}) = \frac{\sin(\theta - \frac{\pi}{2})}{\cos(\theta - \frac{\pi}{2})} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}. \end{array}$
حاول أن تحل:
 $\begin{array}{l} ④ \quad \sin(\theta + \pi) = \sin \theta \cos \pi + \cos \theta \sin \pi = \sin \theta \cdot (-1) + \cos \theta \cdot 0 = -\sin \theta. \\ ⑤ \quad \cos(\theta + \pi) = \cos \theta \cos \pi - \sin \theta \sin \pi = \cos \theta \cdot (-1) - \sin \theta \cdot 0 = -\cos \theta. \\ ⑥ \quad \tan(\theta + \pi) = \frac{\sin(\theta + \pi)}{\cos(\theta + \pi)} = \frac{-\sin \theta}{-\cos \theta} = \tan \theta. \end{array}$


النسب المثلثية لنواقيع θ :
النقطة M هي العكس للنقطة m في نقطة الأصل.
حيث (m, \sin) \longleftrightarrow $(-m, -\sin)$ حيث $m = \sin \theta$.
فيكون: $(\sin \theta, \sin) \longleftrightarrow (-\sin \theta, -\sin)$.
قانون:
 $\begin{aligned} \sin(\theta + \pi) &= -\sin \theta \\ \cos(\theta + \pi) &= -\cos \theta \\ \tan(\theta + \pi) &= \tan \theta \end{aligned}$
 شرط أن يكون $\tan \theta$ معزولة.

مثال (٣):
بدون استخدام الآلة الحاسبة، إذا كان:
 $\begin{array}{l} ① \quad \cos \theta = \frac{1}{2}, \text{ فأوجد } \cos(\theta + \pi). \\ ② \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ فأوجد } \cos(\theta - \pi). \\ ③ \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{9}}{2}, \text{ فأوجد } \cos(\theta - \pi). \end{array}$
الحل:
 $\begin{array}{l} ① \quad \cos(\theta + \pi) = \cos \theta \cos \pi - \sin \theta \sin \pi = \cos \theta \cdot (-1) - \sin \theta \cdot 0 = -\cos \theta = -\frac{1}{2}. \\ ② \quad \cos(\theta - \pi) = \cos \theta \cos \pi + \sin \theta \sin \pi = \cos \theta \cdot (-1) + \sin \theta \cdot 0 = -\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}. \\ ③ \quad \cos(\theta - \pi) = \cos \theta \cos \pi - \sin \theta \sin \pi = \cos \theta \cdot (-1) - \sin \theta \cdot 0 = -\cos \theta = -\frac{\sqrt{9}}{2} = -\frac{3}{2}. \end{array}$
حاول أن تحل:
 $\begin{array}{l} ④ \quad \sin(\theta + \pi) = \sin \theta \cos \pi + \cos \theta \sin \pi = \sin \theta \cdot (-1) + \cos \theta \cdot 0 = -\sin \theta. \\ ⑤ \quad \cos(\theta + \pi) = \cos \theta \cos \pi - \sin \theta \sin \pi = \cos \theta \cdot (-1) - \sin \theta \cdot 0 = -\cos \theta. \\ ⑥ \quad \tan(\theta + \pi) = \frac{\sin(\theta + \pi)}{\cos(\theta + \pi)} = \frac{-\sin \theta}{-\cos \theta} = \tan \theta. \end{array}$
الخلاصة:

مثال (٤):
بدون استخدام الآلة الحاسبة، أوجد:
 $\begin{array}{l} ① \quad \sin(2\theta), \quad ② \quad \cos(2\theta), \quad ③ \quad \tan(2\theta). \end{array}$
الحل:
 $\begin{array}{l} ① \quad \sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \\ ② \quad \cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}. \\ ③ \quad \tan(2\theta) = \frac{\sin(2\theta)}{\cos(2\theta)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}. \end{array}$
حاول أن تحل:
 $④ \quad \text{إذا كان } \sin \theta = \frac{1}{2}, \text{ فأوجد } \sin(2\theta).$



٦ الربط



النسبة المثلثية للزوايا $\theta = \frac{\pi}{7}$


استخدم نطاق الأخلاع المتضاد لبيانات:
 $\sin(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\cos(\theta) = \frac{1}{2}$

استنتاج: لأن زاويتين متماثلتين، فإن جيب إحداهما يساوي جيب تمام الأخرى.

قانون:

$$\begin{aligned} \sin(\theta - \frac{\pi}{2}) &= \cos(\theta) \\ \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) &= \sin(\theta) \\ \tan(\theta - \frac{\pi}{2}) &= \text{معرفة} \end{aligned}$$

شرط أن يكون $\tan(\theta)$ معرفة.



النسبة المثلثية للزوايا $\theta + \frac{\pi}{7}$

المثلثان $\sin(\theta)$ و $\cos(\theta)$ متطابقان. لماذا؟
 ما هي إحداثيات كل من θ و $\theta + \frac{\pi}{7}$?
 ما إشارة كل من $\sin(\theta + \frac{\pi}{7})$ و $\cos(\theta + \frac{\pi}{7})$?
 أثبتت: $\sin(\theta + \frac{\pi}{7}) = -\cos(\theta)$.

قانون:

$$\begin{aligned} \sin(\theta + \frac{\pi}{7}) &= -\cos(\theta) \\ \cos(\theta + \frac{\pi}{7}) &= -\sin(\theta) \\ \tan(\theta + \frac{\pi}{7}) &= \text{معرفة} \end{aligned}$$

شرط أن يكون $\tan(\theta)$ معرفة.

أوجد مجموعة حلول للمعادلة:

$$\left(\theta + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) - \cos(\theta) = 0$$

$$\left(\theta - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) - \cos(\theta) = 0$$

$$\left(\theta - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) - \cos(\theta) = 0$$

$$\left(\theta - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) - \cos(\theta) = 0$$

$$\theta - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \theta - \frac{\pi}{3}$$

$$\theta - \frac{\pi}{3} = \theta - \frac{\pi}{3}$$

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

لا يستخدم الطلاب العلاقات بين الدوال المثلثية بشكل صحيح. اطلب إليهم في كل حالة رسم دائرة الوحدة وتحديد كل حالة، ثم إيجاد العلاقة.

٨ التقسيم

تابع عمل الطلاب في فقرات «حاول أن تحل» لتأكد من فهمهم لهذا الدرس، لأن حفظ العلاقات لن ينفع كثيراً.

الدوال المثلثية (المدارية) على \mathbb{R}


رأينا حتى الآن قيم الدوال المدارية (المثلثية) على الفترة $[0, \pi]$ أو على مجموعة جزئية من هذه الفترة مثل: $[\frac{\pi}{7}, \frac{\pi}{2}]$ أو $(\frac{\pi}{7}, \dots, \frac{\pi}{2})$. على أساس أن الصيغ النهائي للزاوية الموجبة في وضعها التقاسي يمكن دورة واحدة على مجال التعريف أي عندما $\theta \in [0, 2\pi]$.

ولتكن ماذا يحدث إذا سمحنا للصلع النهائي للزاوية θ بالدوران أكثر من دورة؟

يتبيّن لنا أنه إذا كانت θ قياس زاوية موجبة في وضع قياسي حيث نقطتها المثلثية $(\cos \theta, \sin \theta)$ سوف تراها موجبة كأنها في وضع قياسي أيضًا وقياسها $\theta + 2k\pi$ حيث k عدد صحيح ولها النقطة المثلثية $(\cos(\theta + 2k\pi), \sin(\theta + 2k\pi))$ ونطلق عليها اسم زوايا متكافئة.

وأصغر قياس غير سالب للزوايا المتكافئة يسمى القياس الأساسي.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0^{\circ} & , & 30^{\circ} & , & 60^{\circ} & , & 90^{\circ} & , & 120^{\circ} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 330^{\circ} & , & 30^{\circ} & , & 330^{\circ} & , & 30^{\circ} & , & 330^{\circ} \end{array}$$



هي قياسات لزوايا متكافئة مع الزاوية التي قياسها الأساسي $-\frac{\pi}{3}$.

كما أن: $\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \dots, \frac{11\pi}{3}$ هي قياسات لزوايا متكافئة مع الزاوية التي قياسها الأساسي $\frac{\pi}{3}$.

ووهكذا يمكن استنتاج ما يلي:

إذا كان لك عدداً صحيحاً فإن:

$$\begin{aligned} \cos(\theta + k\pi) &= \cos(\theta) \\ \sin(\theta + k\pi) &= -\sin(\theta) \\ \tan(\theta + k\pi) &= \text{معرفة} \end{aligned}$$

حيث $\tan(\theta)$ معرفة.

اختبار سريع

١ حل كلاً من المعادلات التالية:

$$\text{جا} \left(\frac{\pi}{4} s + \frac{\pi}{4} \right) = \text{جا} \left(\frac{\pi}{6} s + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$s = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3} \text{ أو } s = \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{3}$$

$$\left(\frac{\pi}{3} s + \text{جا} \right) = \text{جا} \left(\frac{\pi}{3} s \right)$$

$$s = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{12} \text{ أو } s = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{12}$$

$$\left(\frac{\pi}{4} s + \text{جا} \right) = \text{جا} \left(\frac{\pi}{4} s \right)$$

$$s = \frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{24} \text{ أو } s = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{24}$$

٩ إجابات وحلول

عمل تعاوني

١، ٢، ٣ تحقق من عمل الطلاب.

Solving Trigonometric Equations

إذا كانت الزاوية θ تقع في الربع الأول فإن الزاوية $-\theta$ تقع في الربع الرابع.
تعلمت في هذا المدرس أن $\text{جا}(-\theta) = -\text{جا}(\theta)$.
ولكن إذا عرفت تمام لإحدى الزوايا، فهذا يمكّن الجزم إن كانت الزاوية تساوي θ أو $-\theta$ عليك اعتماد الحلين.

$$\text{حل المعادلة: جتا } s = \text{جتا } \theta \\ \text{هو } s = \theta + 2k\pi \text{ أو } s = -\theta + 2k\pi \quad (كـ } \exists \text{ صـ}$$

لاحظ أن جيب تمام الزاوية يكون موجهاً عندما تقع الزاوية في الربع الأول أو الرابع.

مثال (٤)

حل كلاً من المعادلين:

$$\text{جا} s = \frac{1}{2} \quad ①$$

الحل:

$$\text{جا} s = \frac{1}{2} \quad ①$$

(تعتمد عادة على أصغر قياس غير سالب)

\therefore جتا $s = \frac{\pi}{6}$

\therefore س تقع في الربع الأول أو في الربع الرابع

$$s = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad (كـ } \exists \text{ صـ}$$

$$\text{جا} s = \frac{1}{2} \quad ②$$

\therefore جتا $s = -\frac{\pi}{6}$



\therefore س تقع في الربع الأول أو في الربع الرابع

$$s = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad (كـ } \exists \text{ صـ}$$

حاول أن تحل



٤ حل المعادلة: $\text{جا} s = 1$.

بين الشكلان أدناه أن القوتين السابقتين هي صحيحة أيضًا لأي زاوية قياسها θ :



تدريب (١)

رسم وحدد الربع الذي تقع فيه الزاوية التي قياسها:



تدريب (٢)

يلدون استخدام الآلة الحاسبة، أكمل:

$$\dots = \dots = \text{جا} (360^\circ + 30^\circ) = \text{جا} (390^\circ) \\ \dots = \dots = \text{جتا} (75^\circ) = \text{جتا} (15^\circ) \\ \dots = \dots = \text{ظا} (\frac{\pi}{3}) = \text{ظا} (\frac{\pi}{12})$$

«حاول أن تحل»

١ (أ) $\text{جا}(-\theta) = -\sin \theta$

(ب) $\text{جتا}(-\theta) = \cos \theta$

(ج) $\text{ظا}(-\theta) = -\frac{1}{\tan \theta}$

(د) $\text{جتاص} = \frac{1}{4}$

٢ (أ) $\text{جا}(150^\circ) = \cos(180^\circ - 30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$= \frac{\sqrt{3}}{2}$

(ب) $\text{جتا}(\pi - s) = -\cos s$

(ج) $\text{ظا}(\frac{\pi}{12}) = \tan(\frac{\pi}{12} - \pi) = \tan(-\frac{11\pi}{12})$

$= -\tan(\frac{\pi}{12})$

٣ (أ) $\text{جتا}(40^\circ) = \cos(180^\circ + 20^\circ) = -\cos 20^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

≈ -0.766

٤ (أ) $\text{جا}(180^\circ + 56^\circ) = \cos(180^\circ + 236^\circ) = -\cos 236^\circ = -\frac{\sqrt{5}}{2}$

≈ -0.829

إذا كانت الزاوية θ تقع في الربع الأول فإن الزاوية $(-\theta)$ تقع في الربع الثاني.

تعلمت أليًا أن $\text{جا}(-\theta) = \text{جا}(\theta)$.

وبالتالي، إذا كانت $\text{جا}s = \text{جا}(\theta + 2\pi)$ فإن: $s = \text{جا}(\theta + 2\pi - \pi) = \text{جا}(\theta - \pi)$.

حل المعادلة $\text{جا}s = \text{جا}$


هو $s = \theta + 2k\pi$ أو $s = (\theta - \pi) + 2k\pi$.

لاحظ أن جيب الزاوية يكون موجيًّا عندما تقع الزاوية في الربع الأول أو الثاني.

حل كلاً من المعادلين:

١ $\text{جا}s = \frac{\sqrt{3}}{2}$

الحل:



٢ $\text{جا}s = \frac{\sqrt{3}}{2}$

: جاس = 0.

: س تقع في الربع الأول أو الربع الثاني.

$\therefore s = \text{جا}(\theta + 2k\pi + (\frac{\pi}{6} - \pi)) = \text{جا}(\theta - \frac{5\pi}{6})$

$\therefore s = \text{جا}(\theta - \frac{5\pi}{6}) + 2k\pi$

: جاس = 0.

: س تقع في الربع الأول أو الربع الثاني.

$\therefore s = \text{جا}(\theta + 2k\pi + (\frac{\pi}{6} - \pi)) = \text{جا}(\theta - \frac{5\pi}{6})$

$\therefore s = \text{جا}(\theta - \frac{5\pi}{6}) + 2k\pi$


: جاس = 0.

: س تقع في الربع الأول أو الربع الثاني.

حل كلاً من المعادلين:

١ $\text{جا}s = \frac{\sqrt{2}}{2}$

الحل:



٢ $\text{جا}s = \frac{\sqrt{2}}{2}$

: جاس = 0.

: س تقع في الربع الأول أو الربع الثاني.

$\therefore s = \text{جا}(\theta + 2k\pi + (\frac{\pi}{4} - \pi)) = \text{جا}(\theta - \frac{3\pi}{4})$

$\therefore s = \text{جا}(\theta - \frac{3\pi}{4}) + 2k\pi$

: جاس = 0.

: س تقع في الربع الأول أو الربع الثاني.

حل المعادلة: $2\text{جا}s - 1 = 0$

١٠٥


١٠٦

إذا كانت الزاوية θ تقع في الربع الأول فإن الزاوية $(\theta + \pi)$ تقع في الربع الثالث.
الزواياتان θ و $\theta + \pi$ لهما المثلث نفسه.

$\text{ظا}(\theta + \pi) = \text{ظا}\theta$

حل المعادلة $\text{ظا}s = \text{ظا}\theta$ هو $s = \theta + k\pi$ (ك مص).

لاحظ أن ظل الزاوية يكون موجيًّا عندما تقع الزاوية في الربع الأول أو الثالث.



مثال (٨)

حل المعادلة: $\text{ظا}s = \theta$.

الحل:

$\text{ظا}s = \text{ظا}\theta$ وحيث $\text{ظا}s > 0$.

$\therefore s$ تقع في الربع الأول أو الربع الثالث.

$$s = \theta + 2k\pi \quad \text{أو} \quad s = \theta + \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

حاول أن تحل

حل المعادلة: $\overline{3}\theta = \overline{3}\pi$.

المعلمات:

١ $\text{جنا}(\frac{\pi}{3} - s) = \text{جنا}(\frac{\pi}{3})$

٢ $\text{جا}(s + \frac{\pi}{3}) = \text{جا}(\frac{\pi}{3})$

الحل:

١ $\text{جنا}(s + \frac{\pi}{3}) = \text{جنا}(\frac{\pi}{3})$

$\therefore s + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

$\therefore s = 2k\pi$

أو $s = \frac{\pi}{3} - 2k\pi$

٢ $\text{جا}(s + \frac{\pi}{3}) = \text{جا}(\frac{\pi}{3})$

$\therefore s + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

$\therefore s = 2k\pi$

أو $s = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$

المعلمات:

١ $\text{جنا}(\frac{\pi}{3} - s) = \text{جنا}(\frac{\pi}{3})$

٢ $\text{جا}(s + \frac{\pi}{3}) = \text{جا}(\frac{\pi}{3})$

الحل:

١ $\text{جنا}(s + \frac{\pi}{3}) = \text{جنا}(\frac{\pi}{3})$

$\therefore s + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

$\therefore s = 2k\pi$

أو $s = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$

٢ $\text{جا}(s + \frac{\pi}{3}) = \text{جا}(\frac{\pi}{3})$

$\therefore s + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

$\therefore s = 2k\pi$

أو $s = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$

٣ (أ) $\text{جا}(s^2) = \text{جا}(\frac{\pi}{6})$

أو $s^2 = \frac{\pi}{6}$

$\therefore s = \pm\sqrt{\frac{\pi}{6}}$

٤ (أ) $\text{جا}(s^2) = \text{جا}(\frac{\pi}{3})$

أو $s^2 = \frac{\pi}{3}$

$\therefore s = \pm\sqrt{\frac{\pi}{3}}$

أو $s = 0$

٥ (أ) $\text{جا}(s^2) = \text{جا}(\frac{\pi}{4})$

أو $s^2 = \frac{\pi}{4}$

$\therefore s = \pm\sqrt{\frac{\pi}{4}}$

أو $s = 0$

٦ (أ) $\text{جا}(s^2) = \text{جا}(\frac{\pi}{2})$

أو $s^2 = \frac{\pi}{2}$

$\therefore s = \pm\sqrt{\frac{\pi}{2}}$

أو $s = 0$

٧ (أ) $\text{جا}(s^2) = \text{جا}(\frac{3\pi}{4})$

أو $s^2 = \frac{3\pi}{4}$

$\therefore s = \pm\sqrt{\frac{3\pi}{4}}$

أو $s = 0$

١٠٦

١٤

٥) جتا $= (\pi + \theta)$ - جتا

(ب) جتا $= \left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$ - جتا

٦) جتاس $= \frac{\pi}{2}$, جتاس = جتا

س $= 2\pi + \frac{\pi}{4}$

أوس $= \pi/2 + \frac{\pi}{4} \Rightarrow$

٧) جاس $= \frac{1}{2}$; جاس = جا

س $= \pi/2 + \frac{\pi}{6}$ أو

س $= \pi/2 + \frac{\pi}{6}$, حيث $\theta = \pi/6$

٨) ظا $= \frac{\sqrt{3}}{3}$, ظا $= \theta$

س $= \pi/6 + \frac{\pi}{6}$, حيث $\theta = \pi/6$

٩) س $= \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$

س $= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}$, حيث $\theta = \pi/4$

أوس $= \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$

س $= \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$, حيث $\theta = \pi/4$

(ب) س $= \frac{\pi}{5} + \frac{\pi}{2}$

س $= \frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{2}$, حيث $\theta = \pi/5$

أوس $= \frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{2}$

س $= \frac{2}{3} + \frac{\pi}{4}$, حيث $\theta = \pi/4$

(٤) أوجد قيمة النسب المثلثية التالية بدون استخدام الآلة الحاسبة.

(أ) جا $= 0^{\circ} 50$

(ب) ظا $= 0^{\circ} 225$

(ج) جتا $= 0^{\circ} 350$

(٥) أوجد قيمة النسب المثلثية التالية بدون استخدام الآلة الحاسبة.

(أ) جتا $= \frac{\pi}{4}$

(ب) جا $= \frac{\pi}{3}$

(ج) ظا $= \frac{\pi}{1}$

(٦) أوجد قيمة النسب المثلثية التالية بدون استخدام الآلة الحاسبة.

(أ) جا $= 0^{\circ} 394$

(ب) قتا $= 0^{\circ} 450$

(ج) فا $= 0^{\circ} 117$

في التمارين (٧-١١)، ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة أو (٢) إذا كانت خاطئة.

(٧) إذا كانت جا $= \theta + \pi$, فإن جا $= \theta$.

(٨) إذا كانت جا $= \theta$, فإن جا $= \theta + \pi$.

(٩) إذا كانت ظا $= \theta$, فإن ظا $= \theta + \pi$.

(١٠) إذا كانت جا $= \theta + \pi$, فإن جا $= \theta$.

(١١) بسط التعبيرات التالية لأبسط صورة:

(١) $\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) + \sin(\theta + \pi)$

(ب) $\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + \cos(\theta - \pi)$

«تدريب (١)»

(أ) الربع الثاني

(ب) الربع الرابع

(ج) الربع الثاني

(د) الربع الثالث

(١٢) حل المعادلات التالية:

$$(1) \quad \text{جتا} = \frac{1}{3}$$

$$(2) \quad \text{ظنا} =$$

$$(3) \quad 2 \text{ جاس} =$$

$$(4) \quad \text{جا}(س) = \frac{3\sqrt{7}}{7}$$

المجموعة بـ تمارين تعزيزية

(١) ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة أو (٢) إذا كانت خاطئة.

$$\text{ظلا} = -\frac{3}{7} = -0.42857 \quad (1)$$

$$2 = \left(\frac{\pi \sqrt{7}}{7} \right) - \left(\frac{\pi \sqrt{3}}{3} \right) - \left(\frac{\pi \sqrt{15}}{5} \right) \quad (2)$$

$$1 = \left(\frac{\pi \sqrt{45}}{9} \right) - \left(\frac{\pi \sqrt{15}}{5} \right) + \left(\frac{\pi \sqrt{11}}{11} \right) - \left(\frac{\pi \sqrt{9}}{3} \right) \quad (3)$$

$$\sqrt{7} = 0.85552 - 0.85852 + 0.315 \quad (4)$$

(٢) ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة أو (٢) إذا كانت خاطئة.

$$\text{إذا كان جاس} = \emptyset \quad (1) \quad \text{فإن مجموعة الحل} = \emptyset$$

$$\text{إذا كان جتا} = \frac{\pi}{3} \quad (2) \quad \text{فإن س} = \frac{1}{3}$$

$$\text{إذا كانت س} = \frac{\pi}{3} \quad (3) \quad \text{فإن جاس} = \frac{1}{3}$$

$$\text{مجموعة حل قاس} = 3^{\circ} \quad (4) \quad \text{هي} \quad \emptyset$$

$$\text{ظلا} = \text{صفر} \quad (5)$$

في التمارين (٣-٥)، اختر الإجابة الصحيحة:

(٣) النسبة المثلثية في ما يلي التي قيمتها $\frac{1}{3}$ هي:

$$(1) \quad \text{جا}(-0.24) \quad (2) \quad \text{جا}(-0.33) \quad (3) \quad \text{جا}(-0.42) \quad (4) \quad \text{ظلا}(-0.15) \quad (5) \quad \text{ظنا}(-0.0765)$$

$$(6) \quad \text{ظلا} = -\frac{\sqrt{7}}{7} \quad (7) \quad \text{جا} = \frac{\pi \sqrt{3}}{3} \quad (8) \quad \text{ظلا} = \frac{\pi \sqrt{15}}{5} \quad (9) \quad \text{جا} = \frac{\pi \sqrt{11}}{11} \quad (10) \quad \text{ظلا} = \frac{\pi \sqrt{9}}{3}$$

$$(11) \quad \text{إن قيمة المقدار} \left(\theta + \frac{\pi}{7} \right) - \text{قطا} + \text{جتا} + \text{ظلا} \quad (12) \quad \text{إن} \left(\theta + \frac{\pi}{7} \right) + \text{قطا} + \text{جتا} + \text{ظلا} \quad (13) \quad \text{إن} \left(\theta + \frac{\pi}{7} \right) - \text{قطا} + \text{جتا} + \text{ظلا} \quad (14) \quad \text{إن} \left(\theta + \frac{\pi}{7} \right) + \text{قطا} + \text{جتا} + \text{ظلا}$$

«تدريب (٢)»

$$\text{جا} = 0.360 \quad (1) \quad \text{جا} = 0.360 + 0.360 = 0.720 \quad (2)$$

$$\text{جتا} = 0.45 \quad (3) \quad \text{جتا} = 0.45 + 0.360 \times 2 = 0.765 \quad (4)$$

$$\text{ظلا} = \frac{\pi}{3} \quad (5) \quad \text{ظلا} = \left(\frac{\pi \sqrt{12}}{3} - \frac{\pi}{3} \right) = \left(\frac{\pi \sqrt{11}}{3} - \frac{\pi}{3} \right)$$

٣-٨: العلاقات بين الدوال المثلثية (٢)

العلاقات بين الدوال المثلثية (٢) Relations Between Trigonometric Functions (2)


٣-٨

- سوف تتعلم
- مطابقات فيثاغورث
- علاقات مثلثية
- يسهل عبارات تتضمن دوال مثلثية
- برهنة صحة بعض المتطابقات المثلثية




في هذا الدرس كلـهـ، زـاوـيـةـ لـيـسـ بـرـعـةـ .
يمـكـنـ اـسـتـخـدـمـ المـلـثـلـثـ بـ جـ قـائـمـ الزـاوـيـةـ لـإـلـيـاتـ الـمـطـابـقـاتـ المـلـثـلـثـيـةـ الـأـسـاسـيـةـ .

تدريب




Basic Trigonometric Identities



$$\begin{aligned} \text{المتطابقات المثلثية الأساسية} \\ \text{حيث المقام} \neq 0 \\ \text{ظل } \theta = \frac{\text{جـ}(بـ)}{\text{جـ}(جـ)} , \text{ جـ}(بـ) = \frac{1}{\text{ظل } \theta} \\ \text{قـتا } \theta = \frac{\text{جـ}(جـ)}{\text{جـ}(بـ)} , \text{ جـ}(جـ) = \frac{1}{\text{قـتا } \theta} \\ \text{طـاـنـ } \theta = \frac{\text{جـ}(بـ)}{\text{جـ}(جـ)} , \text{ جـ}(بـ) = \frac{1}{\text{طـاـنـ } \theta} \end{aligned}$$


Pythagorean Identities



$$\begin{aligned} \text{مـطـابـقـاتـ فـيـثـاغـورـثـ} \\ \text{فيـ الشـكـلـ المـقـابـلـ بـ جـ قـائـمـ الزـاوـيـةـ .} \\ \text{جـا}^2 + \text{جـب}^2 = \text{جـ(بـ)}^2 + \text{جـ(جـ)}^2 \\ \text{جـا}^2 + \text{جـب}^2 = \frac{(\text{جـ}(بـ))^2 + (\text{جـ}(جـ))^2}{(\text{جـ}(بـ))^2 + (\text{جـ}(جـ))^2} \\ \therefore \text{جـ}(بـ) = \sqrt{\text{جـا}^2 + \text{جـب}^2} \end{aligned}$$

١٠٧

- (أـبـ) تـساـويـ عـدـدـ
الـمـرـبعـاتـ المـغـبـرـةـ
الـمـوـجـوـدةـ فـيـ الـمـرـبـعـ
الـذـيـ ضـلـعـ آـبـ كـذـلـكـ
بـالـسـيـةـ إـلـىـ قـيـمـ جـاـ، جـبـ .



نظـرـةـ فيـثـاغـورـثـ
وـبـالـعـمـرـيـسـ فـيـ (١) نـحـصـلـ عـلـيـ: جـا + جـب = جـ(بـ) جـ(جـ) .

$$\begin{aligned} جـا + جـب = 1 \\ جـ(بـ) جـ(جـ) = 1 \\ \therefore جـ(بـ) = جـ(جـ) = 1 \end{aligned}$$

١ تـسـمـيـ مـطـابـقـةـ فيـثـاغـورـثـ

مثال (١)

بدون استخدام الآلة الحاسبة، إذا كان $\text{جـتا } \theta = 4$ ، $\text{جـ}(بـ) = 3$.
أـوـ جـا θ .
استـنـجـ ظـاـنـ θ .

الـحلـ:

$$\begin{aligned} 1 &= \text{جـ}(بـ) \text{ جـ}(جـ) \\ 1 &= 3 \cdot 4 \\ 1 &= 12 \\ 1 &= 12 \div 16 = 0.75 \quad \text{أـوـ} \\ \text{ظـاـنـ } \theta &\approx 0.75 \quad \text{مـفـرـوضـ لـأـنـ} \\ 2.4 &\approx 0.75 \quad \therefore \text{ظـاـنـ } \theta = 0.75 \end{aligned}$$

حاـولـ أـنـ تـحـلـ

١ بدون استخدام الآلة الحاسبة، إذا كان $\text{جـا } \theta = \frac{3}{5}$ ، $\text{جـ}(بـ) = \frac{4}{5}$.
أـوـ جـا θ .

Relation Between $\tan \theta$, $\sec \theta$

$$\begin{aligned} \text{الـعـلـاقـةـ بـيـنـ ظـاـنـ } \thetaـ،ـ قـاـنـ } \thetaـ .ـ \\ \text{إـذـنـسـنـاـ طـرـيـقـيـ مـطـابـقـةـ فيـثـاغـورـثـ عـلـيـ جـتا } \thetaـ .ـ \text{نـحـصـلـ عـلـيـ:} \\ \frac{جـا}{جـ(بـ)} + \frac{جـ(بـ)}{جـ(جـ)} = \frac{1}{جـ(جـ)} \quad \text{حيـثـ جـتا } \theta \neq 0 \\ \frac{جـا}{جـ(بـ)} = \frac{1}{جـ(جـ)} \quad \therefore \text{جـا} = \frac{جـ(بـ)}{جـ(جـ)} = \frac{جـ(بـ)}{\text{طـاـنـ } \theta} \end{aligned}$$

١٠٨

الأهداف

- يـوجـدـ مـطـابـقـاتـ فيـثـاغـورـثـ .
- يـوجـدـ عـلـاقـاتـ مـلـثـلـثـيـةـ أـسـاسـيـةـ .
- يـبـسـطـ عـبـارـاتـ تـتـضـمـنـ دـوـالـ مـلـثـلـثـيـةـ .
- يـبـرـهـنـ صـحـةـ مـطـابـقـاتـ مـلـثـلـثـيـةـ أـسـاسـيـةـ .

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

مـطـابـقـاتـ فيـثـاغـورـثـ - عـلـاقـاتـ مـلـثـلـثـيـةـ أـسـاسـيـةـ - مـطـابـقـاتـ مـلـثـلـثـيـةـ .

٣ الأدوات والوسائل

مسـطـرـةـ مـدـرـجـةـ - فـرـجـارـ - مـنـقـلـةـ - آـلـةـ حـاسـبـةـ - حـاسـوبـ -
.ـ جـهـازـ إـسـقـاطـ (Data show)

٤ التمهيد

أسـأـلـ الطـلـابـ تـعرـيفـ:

- ماـ هيـ نـظـرـيـةـ فيـثـاغـورـثـ؟ـ وـأـينـ تـسـتـخـدـمـ؟ـ
- ماـ مـجـمـوعـةـ حلـلـ المـعـادـلـةـ:ـ سـ٢ـ +ـ ٨١ـ =ـ ٩٢٥ـ ؟ـ
- ماـ قـيمـ ظـاـنـ θ ـ،ـ قـاـنـ θ ـ،ـ قـتاـ θ ـ بـدـلـالـةـ ظـاـنـ θ ـ،ـ جـتاـ θ ـ عـلـىـ التـرـتـيبـ؟ـ
- ماـ مـجـمـوعـةـ حلـلـ المـعـادـلـةـ:ـ ٤ـ سـ٢ـ -ـ ٣ـ =ـ ٦٠ـ ؟ـ
- ماـ مـجـمـوعـةـ حلـلـ المـعـادـلـةـ:ـ ٤ـ جـاـسـ -ـ ١ـ =ـ ٦٠ـ ؟ـ

٥ التدريس

يوـفـرـ هـذـاـ الـدـرـسـ عـلـاقـاتـ أـسـاسـيـةـ بـيـنـ الدـوـالـ مـلـثـلـثـيـةـ،ـ حـيـثـ
يمـكـنـ لـلـطـلـابـ باـسـتـخـدـامـهـاـ إـبـيـاجـ كـافـةـ الدـوـالـ مـلـثـلـثـيـةـ إـذـا
عـرـفـتـ قـيـمةـ وـاحـدـةـ مـنـهـاـ فـقـطـ.ـ لـذـاـ يـجـبـ أـوـلـاـ أـنـ يـفـهـمـ الـطـلـابـ
مـطـابـقـةـ فيـثـاغـورـثـ وـكـيـفـيـةـ إـسـتـخـدـامـهـاـ مـعـ التـرـكـيزـ عـلـىـ أنـ
الـتـرـبـيعـ يـطـالـ العـدـدـ الـحـقـيقـيـ وـلـيـسـ الزـاوـيـةـ عـلـىـ دـائـرـةـ الـوـحدـةـ،ـ
أـيـ أـنـ هـنـاكـ فـرـقاـ كـيـرـاـ بـيـنـ جـاـ θ ـ وـ جـاـ θ ـ وـ هـنـاـ تـكـمـنـ أـهـمـيـةـ
هـذـهـ مـطـابـقـةـ،ـ وـهـيـ تـصـلـحـ لـأـيـ قـيـمةـ مـنـ جـاـ θ ـ [٠،ـ π ـ]ـ .ـ

أـعـطـ أـمـثلـةـ مـتـعـدـدـةـ لـتـرـسـيـخـ هـذـهـ مـطـابـقـةـ.

وبالانتقال إلى بقية المتطابقات يصبح من السهل التعامل معها. دعهم يجدون بأنفسهم المتطابقات التي تربط بين θ , $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$. لا تدعهم يعتمدون على الحفظ بل على فهم كيفية إيجاد كل متطابقة.

ناقش معهم بإسهاب الأمثلة التي تتناول تبسيط المقادير المثلثية ليتعرفوا كيفية استخدام المتطابقات. أخبرهم أن ذلك يساعد كثيراً على حل المعادلات المثلثية في خطوات لاحقة.

٦ الرابط

بسط المقادير التالية:

$$(1) \quad \sin^2 x + \cos^2 x =$$

$$= \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad (\text{متطابقة فيثاغورث})$$

$$(b) \quad \sin^2 x + \cos^2 x =$$

$$= \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad (\text{متطابقة فيثاغورث})$$

(ج) في مثال ٣ يجب الأخذ بالاعتبار عند اختيار طريقة رسم المثلث القائم الزاوية للزاوية الواقعه في الربع الأول ستعتمد القياس الأساس للزاوية.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخاطئ الطلاب في استخدام المتطابقات الأساسية. شجّعهم على إعادة كتابة كل متطابقة وكيفية استنتاجها.

٨ التقييم

تابع بعناية عمل الطلاب مع فقرات «حاول أن تحل» لتكون فكرة واضحة عن مدى فهمهم هذا الدرس.

اختبار سريع

١ بدون استخدام الآلة الحاسبة إذا كان $\cos \theta = \frac{4}{5}$ ، $\sin \theta > 0$ فأوجد $\sin \theta$, $\cos \theta$.

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25}$$

$$\sin \theta = \pm \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

٢ بسط المقدار: $\sin^2 x + \cos^2 x =$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = (\sin^2 x - \cos^2 x) + 2\cos^2 x =$$

معلومة رياضية:
إذا كان $\theta < 0$ \Rightarrow
 $\sin \theta < 0$, $\cos \theta > 0$
الإشارة تنسها.

مثال (٢)

بدون استخدام الآلة الحاسبة.

إذا كان $\cos \theta = \frac{1}{7}$, $\sin \theta > 0$ فأوجد $\sin \theta$, $\cos \theta$.

الحل:

طريقة أولى:

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{49}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{48}{49}$$

$$\sin \theta = \pm \frac{\sqrt{48}}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \pm \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \pm \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{7}$$

عمل تعاوني

تحقق من إجابات الطلاب.

حاول أن تحل

$$\therefore \cot^2 \theta + \operatorname{csc}^2 \theta = 1 \text{ ومنها } \operatorname{csc}^2 \theta = 1 - \cot^2 \theta \quad ١$$

$$\operatorname{csc}^2 \theta = \frac{3}{4} \quad ٢$$

$$\operatorname{csc}^2 \theta = 1 + \operatorname{cot}^2 \theta \text{ ومنها} \quad ٣$$

$$\operatorname{cot}^2 \theta = \frac{4}{5}, \operatorname{csc}^2 \theta = \frac{9}{4} = \operatorname{csc}^2 \theta \quad ٤$$


$$\operatorname{cot}^2 \theta = \frac{3}{5} = \operatorname{cot}^2 \theta \quad ٥$$

$$\operatorname{cot}^2 \theta = \frac{24}{25}, \operatorname{csc}^2 \theta = \frac{7}{25} = \operatorname{csc}^2 \theta \quad ٦$$

يمكن استخدام العلاقة $\operatorname{csc}^2 \theta = 1 + \operatorname{cot}^2 \theta$

$$\operatorname{cot}^2 \theta = \frac{89}{89} = \frac{8}{89} = \operatorname{cot}^2 \theta \quad ٧$$

$$\operatorname{csc}^2 \theta = (\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{cot}^2 \theta) = 1 \quad ٨$$



١١٢

مثال (٥) أثبت صحة المتطابقة التالية: $\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{csc}^2 \theta \times \operatorname{csc}^2 \theta = \operatorname{csc}^2 \theta$.

الحل: $\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{csc}^2 \theta \times \operatorname{csc}^2 \theta = \operatorname{csc}^2 \theta (\operatorname{csc}^2 \theta + 1) = \operatorname{csc}^2 \theta \times 2 = 2 \operatorname{csc}^2 \theta$. حاول أن تحل

مثال (٦) أثبت صحة المتطابقة التالية: $\operatorname{csc}^2 \theta = \frac{1 - \operatorname{cot}^2 \theta}{\operatorname{cot}^2 \theta}$. حيث المقام ≠ ٠.

الحل: $\operatorname{csc}^2 \theta = \frac{1 - \operatorname{cot}^2 \theta}{\operatorname{cot}^2 \theta} = \frac{\operatorname{csc}^2 \theta - 1}{\operatorname{cot}^2 \theta} = \frac{\operatorname{csc}^2 \theta - \operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{csc}^2 \theta - 1}{\operatorname{cot}^2 \theta} = \frac{\operatorname{csc}^2 \theta - \operatorname{csc}^2 \theta + 1 - \operatorname{csc}^2 \theta}{\operatorname{cot}^2 \theta} = \frac{1 - \operatorname{csc}^2 \theta}{\operatorname{cot}^2 \theta} = \frac{1 - \operatorname{csc}^2 \theta}{\operatorname{csc}^2 \theta - 1} = \frac{1}{\operatorname{csc}^2 \theta - 1} = \frac{1}{\operatorname{csc}^2 \theta} = 1$. حاول أن تحل

أثبت صحة المتطابقة: $(\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{cot}^2 \theta) - (\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{cot}^2 \theta) = 0$.

١١٢

مثال (٧) أثربني حل المعادلة: $\operatorname{csc}^2 \theta = \operatorname{csc}^2 \theta + 1$, حيث $\theta \in (0^\circ, 90^\circ)$. شرط أن تكون $\operatorname{csc} \theta \neq 0$.

الحل: $\operatorname{csc}^2 \theta = \operatorname{csc}^2 \theta + 1 \Rightarrow \operatorname{csc}^2 \theta - \operatorname{csc}^2 \theta = 1 \Rightarrow 0 = 1$. وهذا مفروضة على الفترة $(0^\circ, 90^\circ)$ التي تتحقق $\operatorname{csc} \theta = 0$ هي $\theta = 90^\circ$. حاول أن تحل

حل المعادلة: $\operatorname{csc}^2 \theta - 1 = 0$, حيث $\theta \in (0^\circ, 90^\circ)$.

متطابقة فيثاغورث

Relation Between $\operatorname{cot} \theta, \operatorname{csc} \theta$ العلاقة بين $\operatorname{csc} \theta, \operatorname{cot} \theta$

$$\begin{aligned} \operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{cot}^2 \theta &= 1 \\ \operatorname{csc}^2 \theta + \frac{\operatorname{cot}^2 \theta}{\operatorname{csc}^2 \theta} &= 1 \\ \operatorname{csc}^2 \theta + \frac{1}{\operatorname{csc}^2 \theta} &= 1 \\ \operatorname{csc}^2 \theta + \frac{1}{\operatorname{csc}^2 \theta} - 1 &= 0 \\ \frac{1}{\operatorname{csc}^2 \theta} &= 1 - \operatorname{csc}^2 \theta \\ \operatorname{csc}^2 \theta &= \frac{1}{1 - \operatorname{csc}^2 \theta} \end{aligned}$$

مثال (٤)

بدون استخدام الآلة الحاسبة، إذا كان $\operatorname{csc} \theta = \frac{3}{\sqrt{7}}$, $\operatorname{csc} \theta < 0$ فأوجد $\operatorname{cot} \theta, \operatorname{csc} \theta$.

$$\begin{aligned} \operatorname{cot}^2 \theta + 1 &= \operatorname{csc}^2 \theta \\ \frac{1}{\operatorname{cot}^2 \theta} + 1 &= \frac{9}{7} \\ \frac{1}{\operatorname{cot}^2 \theta} &= \frac{9}{7} - 1 \\ \operatorname{cot}^2 \theta &= \frac{7}{2} \\ \operatorname{cot} \theta &= \pm \sqrt{\frac{7}{2}} \end{aligned}$$

ملاحظة: يمكن حل المثال ٤ باستخدام متطابقة فيثاغورث: $\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{cot}^2 \theta = 1$.

أو رسم مثلث قائم الزاوية واستخدام نظرية فيثاغورث، حاول ذلك.

حاول أن تحل

بدون استخدام الآلة الحاسبة، إذا كان $\operatorname{csc} \theta = \frac{5}{8}$, $\operatorname{csc} \theta < 0$ فأوجد $\operatorname{cot} \theta$.

١١١

مثال (٥) أثبت صحة المتطابقة التالية: $\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{csc}^2 \theta \times \operatorname{csc}^2 \theta = \operatorname{csc}^2 \theta$.

الحل: $\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{csc}^2 \theta \times \operatorname{csc}^2 \theta = \operatorname{csc}^2 \theta (\operatorname{csc}^2 \theta + 1) = \operatorname{csc}^2 \theta \times 2 = 2 \operatorname{csc}^2 \theta$. حاول أن تحل

أثبت صحة المتطابقة: $\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{csc}^2 \theta \times \operatorname{csc}^2 \theta = \operatorname{csc}^2 \theta$.

مثال (٦) أثبت صحة المتطابقة التالية: $\operatorname{csc}^2 \theta = \frac{1 - \operatorname{cot}^2 \theta}{\operatorname{cot}^2 \theta}$. حيث المقام ≠ ٠.

الحل: $\operatorname{csc}^2 \theta = \frac{1 - \operatorname{cot}^2 \theta}{\operatorname{cot}^2 \theta} = \frac{\operatorname{csc}^2 \theta - 1}{\operatorname{cot}^2 \theta} = \frac{\operatorname{csc}^2 \theta - \operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{csc}^2 \theta - 1}{\operatorname{cot}^2 \theta} = \frac{\operatorname{csc}^2 \theta - \operatorname{csc}^2 \theta + 1 - \operatorname{csc}^2 \theta}{\operatorname{cot}^2 \theta} = \frac{1 - \operatorname{csc}^2 \theta}{\operatorname{cot}^2 \theta} = \frac{1 - \operatorname{csc}^2 \theta}{\operatorname{csc}^2 \theta - 1} = \frac{1}{\operatorname{csc}^2 \theta - 1} = \frac{1}{\operatorname{csc}^2 \theta} = 1$. حاول أن تحل

أثبت صحة المتطابقة: $(\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{cot}^2 \theta) - (\operatorname{csc}^2 \theta + \operatorname{cot}^2 \theta) = 0$.

١١٢

١١٣

٦

$$\begin{aligned} &= \frac{\theta^2 \operatorname{جتا}}{\theta^2 \operatorname{جتا}} - \frac{1}{\theta^2 \operatorname{جتا}} + \frac{1}{\theta^2 \operatorname{جتا}} \\ 2 = 1 + 1 &= \frac{\theta^2 - 1}{\theta^2 \operatorname{جتا}} + \frac{1 - \theta^2}{\theta^2 \operatorname{جتا}} \end{aligned}$$

٦ جناس(٢جاس - ١) = ٠ ؛ جناس = ٠ أو جاس = $\frac{1}{2}$

فإن س = $\frac{\pi}{2}$ جناس = ٠

أو س = $\frac{\pi}{2}$

جاس = $\frac{1}{2}$ فإن س = $\frac{\pi}{6}$

أو س = $\frac{\pi}{6}$ جاس = $\frac{\pi}{6} - \pi = \frac{\pi}{6}$

(تدریب)

الضلوع المقابل ، جتا $= \frac{\text{الضلوع المجاور}}{\text{الوتر}}$

الضلوع المقابل

الوتر $= \frac{\text{الضلوع المقابل}}{\text{الضلوع المجاور}} = \frac{\text{جتا}}{\text{جاس}} = \frac{\text{جاس}}{\text{جتا}}$

٣-٨

التاريخ المجري:

العلاقات بين الدول المثلثة (٢)

Relations Between Trigonometric Functions (2)

المجموعة ٤ تمارين أساسية

(١) إذا كانت جاس = $\theta > 0$ ، $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2}$

فأوجد قيمة النسبة المثلثية الأخرى للزاوية θ .

(٢) إذا كانت طا = $\sqrt{7}$ ، $\operatorname{جنا} > \theta > 0$

أوجد جاس، جنا.

(٣) إذا كانت جنا = $\theta > 0$ ، $\frac{1}{3} < \theta < \frac{\pi}{3}$

أوجد جاس، طا.

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (٦-١)، ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة أو (٢) إذا كانت خاطئة.

- (٢)
- (١)
- (٢)
- (١)
- (٢)
- (١)
- (٢)
- (١)
- (٢)
- (١)

(١) $\operatorname{جنا} \times \theta = \theta \operatorname{جنا} = 0$

(٢) $\operatorname{جنا} - \theta = \theta - \operatorname{جنا} = 0$

(٣) $(\operatorname{قنا} + \theta)(\operatorname{قنا} - \theta) = (\operatorname{قنا} + \theta)(\operatorname{قنا} - \theta) = 0$

(٤) $\operatorname{جاس} \operatorname{جنا} - \theta = \theta - \operatorname{جاس} = 0$

(٥) $1 - \theta = \theta - 1 = 0$

(٦) $\operatorname{ظا} + \operatorname{ظنا} - \theta = \theta - \operatorname{ظا} = 0$

في التمارين (٨-٧)، اختر الإجابة الصحيحة:

(٧) إذا كانت $\theta = \frac{5}{7}\pi$ ، θ تقع في الربع الثالث. فإن جاس θ = $\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

(٨) إذا كانت $\theta = \frac{3}{4}\pi$ ، θ تقع في الربع الرابع. فإن طا θ = $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$

(٩) إذا كانت $\theta = \frac{2}{5}\pi$ ، θ تقع في الربع الثاني. فإن جاس θ = $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$

(١٠) إذا كانت $\theta = \frac{7}{5}\pi$ ، θ تقع في الربع الأول. فإن جاس θ = $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$


في التمارين (١-٤)، أثبت صحة المتطابقات التالية:

(١) $\operatorname{جاس}(\operatorname{ظنا} + \theta) = \operatorname{قنا}$

(٢) $\frac{1}{\operatorname{جنا} - 1} = \frac{\theta \operatorname{جنا}}{\theta - \operatorname{جنا}}$

المرشد لحل المسائل

مخطط تنظيمي للوحدة الثالثة



١١٥

إجابة «تطبيق»

نعتمد الشكل المرسوم كجزء مكمل للعمل

$$ب د = ٥٣٠ + جـ٢ - ١٥$$

$$ب د \approx ١,٨٧$$

أي يرتفع سلطان ١,٨٧ متر عن سطح الأرض تقريرًا.

إجابة «مسألة إضافية»

$$١١,٧ = ١٥ + جـ٦ - ١١$$

$$٠٤٦ \approx \theta$$



$$\theta = ٠١٨٠ - ٠٤٦ = ٠١٣٤$$

ملخص

- الدائرة التي مرتكزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها واحد وحدة تسمى «دائرة الوحدة».
- نقطة تقاطع الضلع النهائي لزاوية موجهة في الوضع القبابي مع دائرة الوحدة تسمى «النقطة المثلثية».
- زاوية الإسنان لزاوية الموجهة (وث، وجـ) التي في وضع قبابي هي الزاوية الحادة α التي يصتلمها الضلع النهائي لزاوية الموجهة مع محور السينات. ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$).
- دالة المقام: $\text{مق}(\theta) = \frac{1}{\cos \theta}$ حيث $\cos \theta \neq 0$
- دالة الجيب: $\text{جا}(\theta) = \frac{1}{\sin \theta}$ حيث $\sin \theta \neq 0$
- دالة جيب التمام: $\text{دـ}(\theta) = \text{جـتا}(\theta) = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ حيث $\cos \theta \neq 0$
- دالةظل: $\text{ظل}(\theta) = \text{طا}(\theta) = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ حيث $\sin \theta \neq 0$
- دالة المقاطع: $\text{دق}(\theta) = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ حيث $\sin \theta \neq 0$
- دالة قاطع التمام: $\text{دقـ}(\theta) = \frac{1}{\cot \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ حيث $\cos \theta \neq 0$
- دالة ظل التمام: $\text{دقـ}(\theta) = \text{جـنا}(\theta) = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ حيث $\cos \theta \neq 0$
- في الربع الأول جميع الدوال المثلثية موجبة.
- في الربع الثاني جـتا، دقـ موجباتان وبقية الدوال سالبة.
- في الربع الثالث طـا، دقـ موجباتان وبقية الدوال سالبة.
- في الربع الرابع جـتا، دقـ موجباتان وبقية الدوال سالبة.
- إشارة مقاوم دالة مثلثية هي إشارة الدالة المثلثية نفسها.

١١٦

المرشد لحل المسائل



في مدينة الملاهي، ركب سلطان الدوارة.

دارت الدوارة عكس اتجاه دوران عقارب الساعة وتوقفت لتقل راكبا آخر.

تساءل محمد: ما ارتفاع سلطان عن الأرض؟

كيف ذكر محمد؟

بدايـة، سـوق سـلطـان مـخطـطـاً.

تمـلـنـتـ النـقطـةـ أـمـسـقـ سـلطـانـ عـنـ تـوقـ الدـوـارـةـ.

جـدـ ٢ـ،ـ ١ـ مـتـرـ (ـالـارتفاعـ عـنـ الـأـرـضـ)

زاـوـيـةـ الدـوـرـانـ =ـ $\theta = \pi/2$

علـىـ إـيجـادـ طـولـ القـطـعةـ \overline{OP} .

سـأـسـتـخـدـمـ مـاـ تـعـلـمـهـ فـيـ الـوـحدـةـ عـنـ النـسـبـ المـثـلـثـيـةـ.

$$\begin{aligned} \text{جـنا}(\theta) &= \frac{\text{جـتا}(\theta)}{\text{طا}(\theta)} \\ &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\ \therefore \text{وبـ} &= \text{جـتا}(\theta) \end{aligned}$$

سـأـسـتـخـدـمـ خـواـصـ القـطـعـ المـسـتـقـيمـ.

$$\text{بـ دـ} = \text{بـ جـ} + \text{جـ دـ}$$

ولـكـنـ بـ جـ = وجـ - بـ دـ

$$\therefore \text{بـ دـ} = \text{وجـ} - \text{بـ دـ}$$

$$\text{بـ دـ} = \text{وجـ} + \text{جـ دـ}$$

استنتاج محمد: على معرفة طول نصف قطر الدوارة وزاوية الدوارة لإيجاد ارتفاع سلطان عن الأرض.

تطبيق

في المسألة أعلاه، أوجد ارتفاع سلطان عن الأرض إذا كان طول نصف قطر الدوارة ٥ أمتار وقياس الزاوية التي يصتلمها

مقدمة سلطان مع المحور الرأسي للدوارة ٣٠° .

مسـأـلةـ إـضـافـيـةـ

ركـبـ سـالـمـ دـوـارـةـ طـولـ نـصـفـ قـطـرـهاـ ٦ـ أـمـتـارـ وـتـرـفـعـ قـاعـدـتهاـ ٥ـ مـتـرـ عـنـ الـأـرـضـ.ـ أـوجـ الدـاـلـةـ

يـصـتـلـمـهاـ مـقـدـمـ سـالـمـ معـ المحـورـ الرـأـسـيـ للـدوـارـةـ $١١,٧ـ مـتـرـ$.

٩٤

٩٦

(٥) أثبت صحة ما يلي:

$$1 = \frac{1}{\tan(\theta - \pi)} + \tan(\theta - \pi)$$

$$(أ) \tan(\theta - \pi) = \tan(\theta) - \tan(\theta - \pi)$$

(٦) أثبت صحة المطابقات التالية:

$$\tan(\theta - \pi) = \tan(\theta) - \tan(\theta - \pi)$$

$$(ب) \tan(\theta) = \tan(\theta - \pi) + \tan(\theta - \pi)$$

(٧) أوجد مجموعة حل المعادلات المثلثية التالية:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \tan(\theta)$$

$$(أ) \theta = 30^\circ$$

$$(ب) \theta = 150^\circ$$

$$(ج) \theta = 15^\circ$$

٦٩

- العلاقات الأساسية بين الدوال المثلثية:

$$\sin(\theta - \pi) = -\sin(\theta)$$

$$\cos(\theta - \pi) = -\cos(\theta)$$

$$\tan(\theta - \pi) = \tan(\theta)$$

$$\cot(\theta - \pi) = \cot(\theta)$$

$$\sec(\theta - \pi) = \sec(\theta)$$

$$\csc(\theta - \pi) = \csc(\theta)$$

$$\sin(2\pi - \theta) = -\sin(\theta)$$

$$\cos(2\pi - \theta) = \cos(\theta)$$

$$\tan(2\pi - \theta) = -\tan(\theta)$$

$$\cot(2\pi - \theta) = \cot(\theta)$$

$$\sec(2\pi - \theta) = \sec(\theta)$$

$$\csc(2\pi - \theta) = -\csc(\theta)$$

$$\sin(\theta + \pi) = -\sin(\theta)$$

$$\cos(\theta + \pi) = -\cos(\theta)$$

$$\tan(\theta + \pi) = \tan(\theta)$$

$$\cot(\theta + \pi) = \cot(\theta)$$

$$\sec(\theta + \pi) = -\sec(\theta)$$

$$\csc(\theta + \pi) = -\csc(\theta)$$

$$\sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)$$

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta)$$

$$\tan(\pi - \theta) = -\tan(\theta)$$

$$\cot(\pi - \theta) = \cot(\theta)$$

$$\sec(\pi - \theta) = -\sec(\theta)$$

$$\csc(\pi - \theta) = \csc(\theta)$$

١١٧

تمارين إثرائية

(١) تفكير ناقد: افترض أن θ زاوية في الوضع القياسي،

$$\tan(\theta - \pi) = \tan(\theta)$$

هل من الممكن أن تكون $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 120^\circ$ ؟

(٢) أوجد قيمة كل مما يلي:

$$(أ) \tan(120^\circ) + \tan(210^\circ) - \tan(30^\circ) + \tan(150^\circ)$$

$$(ب) \tan(120^\circ) + \tan(210^\circ) - \tan(30^\circ) + \tan(150^\circ)$$

$$(ج) \tan(120^\circ) + \tan(210^\circ) - \tan(30^\circ) + \tan(150^\circ)$$

$$(د) \tan(120^\circ) + \tan(210^\circ) - \tan(30^\circ) + \tan(150^\circ)$$

(٣) أوجد قيمة:

$$(أ) \tan(1^\circ) + \tan(2^\circ) + \tan(3^\circ) + \dots + \tan(58^\circ) + \tan(59^\circ)$$

$$(ب) \tan(1^\circ) + \tan(2^\circ) + \tan(3^\circ) + \dots + \tan(58^\circ) + \tan(59^\circ)$$

مراجعة الوحدة الثامنة

(١) في أي ربع أو على أي محور يقع الضلع النهائي لـ θ في الحالات التالية:

$$(أ) \tan(\theta) = \frac{1}{3}$$

$$(ب) \tan(\theta) = -1$$

$$(ج) \tan(\theta) = 3$$

$$(د) \tan(\theta) = -\frac{1}{3}$$

(٢) إذا كان $\theta = 4^\circ$ فأوجد:

$$(أ) \tan(\theta)$$

$$(ب) \sin(\theta)$$

$$(ج) \cos(\theta)$$

$$(د) \sin(\frac{\pi}{2} - \theta)$$

(٣) إذا كان $\theta = 38^\circ$ ، بدون استخدام الآلة الحاسوب بطريقة مباشرةً أوجد قيمة كل من:

$$(أ) \tan(38^\circ)$$

$$(ب) \cos(52^\circ)$$

$$(ج) \sin(42^\circ) - \sin(18^\circ) + \sin(38^\circ)$$

$$(د) \cos(38^\circ) - \cos(18^\circ) + \cos(52^\circ)$$

(٤) أوجد قيمة كل مما يلي:

$$(أ) \tan(60^\circ) + \tan(210^\circ) - \tan(30^\circ) + \tan(150^\circ)$$

$$(ب) \tan(2^\circ) + \tan(3^\circ) + \tan(4^\circ) + \tan(5^\circ) + \tan(6^\circ)$$

٧٠

٩٧

٩٨

في التمارين (١٥-١٦)، حل المعادلات التالية حيث $\theta \in [0, \pi]$ حيث المقام ≠ ٠:

$$\theta \operatorname{ظ} = \frac{\theta \operatorname{ج}}{\theta \operatorname{ج}} \quad (11)*$$

$$\theta \operatorname{ظ} = \theta \operatorname{ق} \times \frac{\theta \operatorname{ج}}{\theta \operatorname{ج}} \quad (12)*$$

$$\theta \operatorname{ق} - = \frac{\theta \operatorname{ق}}{\theta \operatorname{ج}} \quad (13)*$$

$$1 = \theta \operatorname{ج} + \theta \operatorname{ق} \quad (14)*$$

$$1 = \theta \operatorname{ج} \quad (15)*$$

(٤) حل المعادلات التالية:

$$(أ) \operatorname{ج} = \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\theta \operatorname{س}}{\theta \operatorname{ج}} \right)$$

$$(ب) \operatorname{ج} = \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\theta \operatorname{س}}{\theta \operatorname{ج}} \right)$$

$$1 = \left(\theta \operatorname{س} + \frac{\pi}{\theta \operatorname{ج}} \right)$$

$$(د) \operatorname{ظ}(\theta \operatorname{س} + \theta \operatorname{ج}) = \operatorname{ظ}(\theta \operatorname{س})$$

(٥) أثبت صحة المتطابقات التالية:

$$\theta \operatorname{ق} = \frac{\theta \operatorname{ج}}{\theta \operatorname{ج} - 1} + \frac{\theta \operatorname{ج}}{\theta \operatorname{ج} + 1}$$

(٦) أوجد مجموعة حل المعادلة المثلثية التالية، ممّا لها على دائرة الوحدة، حيث $\theta \in [0, \pi]$.

$$\theta \operatorname{ج} - 4 = \theta \operatorname{ج} - 7$$

في التمارين (٧-٨)، أثبتت صحة المتطابقات التالية:

$$(7) \operatorname{ق} \theta \operatorname{ج} = \frac{\theta \operatorname{ج} + \theta \operatorname{ج}}{\theta \operatorname{ج} - \theta \operatorname{ج}}$$

$$(8) \theta \operatorname{ج} = \frac{\theta \operatorname{ج} - \theta \operatorname{ج}}{\theta \operatorname{ظ} - 1}$$

في التمارين (٩-١٠)، حل المعادلات المثلثية التالية:

$$(9) \operatorname{ظ} \theta \operatorname{س} + \operatorname{ظ} \theta \operatorname{س} = 0$$

$$(10) \operatorname{ق} \theta \operatorname{س} = 3 - 2$$

Analytic Geometry

الوحدة التاسعة: الهندسة التحليلية

قسمت الدروس في هذه الوحدة إلى أجزاء.

٩ - ١: المستوى الإحداثي

جزء ١: المسافة بين نقطتين.

جزء ٢: نقطة المنتصف.

٩ - ٢: تقسيم قطعة مستقيمة

جزء ١: التقسيم من الداخل.

جزء ٢: التقسيم من الخارج.

٩ - ٣ (أ): ميل الخط المستقيم

جزء ١: معدل التغير.

جزء ٢: إيجاد الميل.

جزء ٣: العلاقة بين ميل المستقيمين وظل الزاوية.

٩ - ٣ (ب): معادلة الخط المستقيم

جزء ١: كتابة معادلة الخط المستقيم.

جزء ٢: الصورة العامة لمعادلة المستقيم.

٩ - ٤: البعد بين نقطة ومستقيم

جزء ١: إيجاد البعد بين نقطة ومستقيم.

٩ - ٥: معادلة الدائرة

جزء ١: معادلة الدائرة.

جزء ٢: الصورة القياسية لمعادلة الدائرة.

جزء ٣: الصورة العامة لمعادلة الدائرة.

جزء ٤: معادلة المماس على الدائرة.

جزء ٥: العلاقة بين دائرتين في المستوى.

مقدمة الوحدة

الوحدة
النinth

مشروع الوحدة: اختيار وظيفة

المقدمة المنشورة: هل لديك عمل ما؟ إذا لم يكن لديك عمل، فما الوظيفة التي تفضلها؟ ما المصادر المتوقعة؟ ما السبب الذي يستقصي؟ كيف يمكنك المقارنة بين وظيفتين أو بين دخلين؟ إن معادلات المستقيم تساعدك على الإجابة عن هذه الأسئلة كلها.

خلال عملكم على هذا المشروع، سوف ترسمون الخطوط المستقيمة وتكتبون المعادلات التي تنتج مخالفة أعمال أو الوظائف وسوف تستخدمون هذه النماذج لتقدير الدخل.

الهدف: محادلة شخص محاول أول عمل قام به. اختيار العمل أو الوظيفة المفضلة مع تبرير الاختيار.

اللازم: أوراق رسم ملبيترية وآلة حاسبة.

استلة حول التطبيق:

أوجد قيمة الأجر في الساعة لموظفيين تفضلاهما. ارسم تمثيلاً بيانياً بالخطوط بين في مدخلوك كل وظيفة. يكون عدد الساعات بين ٠ و ١٠ على المحور الأفقي وقيمة المدخل على المحور الرأسي. على افتراض أنك عملت ٨ ساعات، اشرح كيف يفترس التمثل البياني فرق المدخل بين الوظيفتين.

على افتراض أنك تناول ٤٠ فلس في الساعة لقاء ثلاء عملك في أحد أفران الحلويات ويحصل من أجرك ١٠٠ فلس ضريبة أسبوعية، إذا كنت تعمل سبعة ساعات خالد ٥ أيام في الأسبوع وتدفع يومياً ٢٥ فلساً ثمن وجبة.

١) اكتب معادلة تبين فيها ربحك في أسبوع واحد بعد احتساب الضريبة والمصاريف.
 ٢) في هذه الحالة ماذا مثل الميل (معامل س)؟ وماذا مثل التقابل مع معرف الصادات؟
 ٣) كم ساعة عمل يلزمك كي يساوي ربحك الصافي ٤٠ ديناراً و ٦٥٠ فلساً بعد احتساب الضريبة والمصاريف؟
 ٤) حاور رجلاً مسؤولاً حول وظيفته. أسأله عن إيجابيات هذه الوظيفة وسلباًها من حيث الراتب والمصاريف. اكتب معادلة تبين فيها دخله الأسبوعي بعد احتساب المصاريف.
 ٥) **التبرير:** ضع تقريراً مفصلاً حول مقارنة دخل كل وظيفة وكيفية رسم التمثيلات البيانية والاستناد منها للإجابة عن الأسئلة.

دروس الوحدة

معادلة الدائرة	البعد بين نقطة ومستقيم	معادلة الخط المستقيم	ميل الخط المستقيم	نقطة تقاطع مستقيمة	السرى الإحداثي
٥-٩	٤-٩	(٣-٩)	(٣-٩)	٢-٩	١-٩


بعد أن أوجد رينيه ديكارت (René Descartes) تلك العلاقة الشهيرة بين الهندسة والهندسة التحليلية، بدأت هذه العلاقة بالتطور حتى أصبح بإمكاننا حل مسائل كان من الصعب إيجاد حلول لها باستخدام الطرائق التقليدية. كما وبدأت التطبيقات الحياتية مع الهندسة التحليلية تأخذ طريقها بشكل سريع بعد التوسع في استخدام الحاسوب والأجهزة الخلوية.

تستخدم البرامج على الحاسوب بشكل أساسى الإحداثيات الهندسية لتوجد أشكالاً مختلفة من الصور والتصاميم، حيث ترى صوراً ثلاثية الأبعاد على شاشة التلفاز. وقد استخدمت أيضاً في مجال الترفيه والتسلية، الإحداثيات الهندسية لإنتاج رسوم متحركة وألعاب فيديو متعددة ومتنوعة للكبار والصغار.

ومن المهم أن للإحداثيات الهندسية الأثر الكبير في نمذجة تصاميم الدرارات والنجوم والحيوانات والمشاهات الكبيرة. وقد اعتمدت كل الرسوم والصور الموجودة في هذا الكتاب بالدرجة الأولى على الإحداثيات الهندسية.

على سبيل المثال: يسكن خالد على بعد ٦ كم غرباً و ٣ كم شمالاً بالنسبة إلى مدرسته.

أما صالح فيسكن على بعد ٥ كم جنوباً بالنسبة إلى مدرسته. كم كيلومتر يوجد بين مسكن خالد ومسكن صالح؟ يمكن نمذجة هذه المسألة باستخدام المستوى الإحداثي على أن تكون نقطة الأصل بناء المدرسة.



$$\text{المسافة} = \sqrt{(5 - 3)^2 + (0 - 6)^2}$$

$$= \sqrt{64 + 36}$$

$$= \sqrt{100}$$

أي يوجد ١٠ كم بين مسكن خالد ومسكن صالح.
ملاحظة:
يمكن استخدام نظرية فيثاغورث.

مشروع الوحدة

ماذا سأفعل بعد التخرج؟ كيف سيكون مستقبلي؟

هل كان اختياري للتخصص سليمًا؟

هل ستتحقق طموحاتي؟

أسئلة كثيرة ومتعددة تدور في رأس كل طالب:

وظيفة؟ رجل أعمال؟ مهنة حرة؟ تاجر؟ مزارع؟

يساعدك العمل في هذا المشروع على تحديد جزء من خياراتك المستقبلية.

سوف تستخدم رسومًا بيانية لتقارن بين الوظائف وتحتار منها الأفضل.

إجابات «أسئلة حول التطبيق»

(أ) ص = ٤٠ س - ١٣٥ .

(ب) يمثل الميل أجر الساعة لقاء العمل. يمثل التقاطع مع محور الصادات القيمة الثابتة للمصاريف الأسبوعية إضافة إلى الضريبة.

(ج) نحل المعادلة: $14,65 = 4,60 \times 135 + 1,35$

فنحصل على $S = 40$. لتحصل على ١٤ ديناراً ٦٥٠ فلسًا يتوجب عليك أن تعمل ٤٠ ساعة أسبوعياً.

(د) تنوع الإجابات.

التقرير

قدم تقريراً مفصلاً بالنتائج والأبحاث التي توصلت إليها، بالنسبة إلى الوظيفة المفضلة لديك أو أي مجال عمل آخر مستقبلك.

ناقش مع زملائك هذا التقرير، واستمع إلى ملاحظاتهم باهتمام، ثم أعد النظر ببعض النقاط إذا كان ذلك ضروريًا.

الوحدة
الناسعة

أضف إلى معلوماتك

دیکارت والہندسة التحلیلیة (١٦٥٠ - ١٥٩٦)

ربیه دیکارت Descartes وللیلسوف الفرنی، هو الذي برهن العدد والنقاط وهذا ما أتيح لنا الہندسة الجیلیلیة، حيث اینکر النظام الادھائی المکون من محورین متعامدين متقاربين (محور السیمات ومحور الصاداد)، والذي بواسطہ يمكن التعبیر عن كل نقطة في المستوى بعددين حققین (س، ص)، وباستخدام النظام الادھائی، استطاع دیکارت أن يثبت صحة كل خواص الہندسة الابلیلیة، مبرراً عن المستقيمات والمنحنيات بمعادلات جزیرۃ بالایتها ساررات لنقطة تسمى بشرط تحکم العلاقة بين (س، ص).



المصطلحات الأساسية

طول القطعة المستقيمة - المسافة بين نقطتين - البعد بين نقطة ومستقيم - نقطة المنتصف - ميل المستقيم - ظل الزاوية - ميل مستقيمين متوازيين - ميلان مستقيمين متعمدين - معادلة الخط المستقيم - الدائرة - معادلة الدائرة - مركز الدائرة - نصف قطر الدائرة - مسام الدائرة.

١١٩

سلم التقييم

٤. الحسابات صحيحة بالكامل. الرسوم البيانية واضحة ومعبرة. التقرير مفصل ودقيق.	٤
٣. معظم الحسابات صحيحة. الرسوم البيانية واضحة ويمكن قراءتها. التقرير بحاجة إلى بعض التفاصيل.	٣
٢. بعض الحسابات صحيحة. الرسوم البيانية مقبولة مع بعض الأخطاء. التقرير إلى حد ما مقبول.	٢
١. معظم عناصر المشروع ناقصة وغير مقبولة.	١

١-٩: المستوى الإحداثي

١ الأهداف

- يوجد المسافة بين نقطتين.
- يوجد متنصف قطعة مستقيمة.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة


المسافة بين نقطتين - نقطة المتصف.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة - ورق رسم بياني - آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

(١) ارسم على السبورة خط الأعداد.



أسأل الطلاب:

إيجاد المسافات:

- من ١ إلى ٦.
- من ٣ إلى ٦.

اطلب إليهم إيجاد نقطة متنصف القطعة المستقيمة ١٦.

(٢) في المثلث ١٦ ج قائم الزاوية ٦، حيث:

$$16 = 5, \quad 6 = 13$$

• أوجد ٦ج.

(٣) في المستوى الإحداثي، حيث ونقطة الأصل للمحورين نأخذ ١٦(٣، ٣).

حدد موقع ١٦ إذا كان (٥، ٥).

ناقش كل الحلول الممكنة.


٥ التدريس

من المهم جداً التركيز على المستوى الإحداثي، كي يتمكن الطالب من تحديد موقع نقطة من خلال الإحداثيات، فهذا سوف يساعد كثيراً على التطبيق في مواقف حياتية تواجهه الطالب في المستقبل.


ساعد الطلاب على التعامل بواقعية مع فقرة «دعنا نفك ونتناقش». أخبرهم أن إنجاز تصاميم كثيرة مثل المراكب، والطائرات والسيارات... تبدأ أولاً بفكرة من هذا النوع.

المستوى الإحداثي Coordinate Plane

١-٩



المسافة بين نقطتين




المسافة بين نقطتين

في المخطط إلى اليسار، أب موازية للمحور السيني (قطعة أفقية). يمكنك إيجاد طولها بطرح الإحداثي السيني النقطة أ من الإحداثي السيني لنقطة ب. طول أب = ٤ = ٤ وحدة طول.

وبالطريقة نفسها، يمكنك إيجاد طول جد قطعة موازية للمحور الصادي (قطعة رأسية) وذلك بطرح الإحداثي الصادي لنقطة ج من الإحداثي الصادي لنقطة د.

طول جد = ٥ - ٣ = ٢ وحدة طول.

١٢٠




أي نقطتين (س، ص)، (ب، ص)، (ب، ص)، (س، ص)، لستا على مستقيم أفقى أو مستقيم رأسى، يمكن تمثيلهما بياياً ووضع مثلث قائم الزاوية (كما هو مبين في الشكل المقابل).
نستخدم نظرية فياغورث لإيجاد المسافة بين النقطتين، ب، ب.
$$(أب)^2 = (جـ - جـ) + (ب - جـ)^2$$

$$(أب)^2 = (س - س) + (ص - ص)^2$$
 التعمير
$$أب = \sqrt{(س - س)^2 + (ص - ص)^2}$$
 الجذر التربيعي الأساسي

قانون:

$$\text{المسافة بين أي نقطتين } (س، ص)، (ب، ص)، (ب، ص)، (س، ص) = \sqrt{(س - س)^2 + (ص - ص)^2}$$

يعطي القانون المسافة الدقيقة بين نقطتين بينماعطي الآلة الحاسبة إجابة تقريرية، فإذا كانت القيمة تحت علامة الجذر مراعيًا كما ذكر.



مثال (١)

أوجد المسافة بين ك (-٥، ٥)، ل (٣، ٢).

$$\text{الحل: المسافة} = \sqrt{(س - س)^2 + (ص - ص)^2}$$

$$= \sqrt{(-٥ - ٣)^2 + (٥ - ٢)^2}$$

$$= \sqrt{(-٨)^2 + (٣)^2}$$

$$= \sqrt{٦٤ + ٩} = \sqrt{٧٣}$$

المسافة بين ك، ل تساوي حوالي ٦، ٣، ٦ وحدات طول.

حاول أن تحل

أوجد المسافة بين م (-٢، ١)، ن (-٧، ٤)، ق (٤، ٧). قرب إجابتك إلى أقرب جزء من عشرة.

١٢١

اشرح جيداً قانون المسافة بين نقطتين، وكيف أن نظرية فيثاغورث ساعدت كثيراً على وضع هذا القانون. أشر إلى أن إيجاد المسافات بين النقاط يساعد على إيجاد محيط مضلع.

تأكد من أنهم فهموا جيداً إحداثيات متصرف القطعة المستقيمة، وأنهم تمكنوا من إيجاد الفرق بين قاعدة المسافة بين نقطتين وقاعدة متصرف القطعة المستقيمة، وخاصة إذا كان هناك حاجة في حالة معينة لاستخدام كلتا القاعدتين.

٦. الرابط

خرج أحمد من منزله وقاد سيارته شمالي، فاجتاز مسافة ١٢ كم، ثم انحرف يميناً باتجاه الشرق وتوقف عند محطة الوقود بعد ٩ كم. ساعد أحمد على معرفة أقصر مسافة تفصله الآن عن منزله خط مستقيم. (١٥ كم)

٧. أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطالب في تحديد نقطة في مستوى الإحداثيات وفي تحديد نقطة البداية ونقطة النهاية في قاعدة المسافة بين نقطتين.

ساعدهم على ترميز النقاط حتى يتمكنوا من التطبيق بشكل صحيح.

٨. التقييم

تابع الطلاب وهم يتعاملون مع فقرات «حاول أن تحل» لتدرك مدى استيعابهم مفاهيم هذا الدرس ومهاراته.

اختبار سريع

إذا كان $\triangle ABC$ ، بـ (٧، ١٣)، جـ (٣، ٥).

فأوجد أـ، بـ، جـ.


ثم أثبت أن $\triangle ABC$ جـ قائم الزاوية ومتطابق الضلعين.

$$AB = \sqrt{7^2 + 21^2} = \sqrt{527}$$

$$BC = \sqrt{10^2 + 4^2} = \sqrt{104}$$


$$AC = \sqrt{10^2 + 12^2} = \sqrt{244}$$

إذا $\triangle ABC$ جـ قائم الزاوية ومتطابق الضلعين.



نقطة المنتصف
أـ بـ نقطتان في المستوى مـ نقطة منتصف أـ بـ الخطـة مـ تقسم الخطـة أـ بـ إلى قطعتـين متطابقـين أـ مـ بـ.

ملحوظة:




مثال (٢)
في الشكل المقابل أوجد نقطة منتصف جـدـ حيث جـ (١، ٥)، دـ (٠، ٣)، بـ (٣، ٣)، مـ (٣، ١).
الحل: $(\frac{١+٣}{٢}, \frac{٥+٣}{٢}) = (\frac{٤}{٢}, \frac{٨}{٢}) = (٢, ٤)$.
نقطة منتصف جـدـ هي (٢، ٤).

حاول أن تحل

مثال (٣)
في الشكل المقابل، أوجد نقطة منتصف كـلـ حيث كـ (٢، ٣)، لـ (١، ٢)، مـ (٢، ٢).
حيث كـ (٢، ٣)، لـ (١، ٢)، مـ (٢، ٢).

٤٢٢



مثال (٣)

أرادت إحدى الشركات بناء مدينة ملائمة في العاصمة. فوضعت التصميم المقابل على أن يكون لها ٦ مداخل رئيسية، وترتبط [دارارة] الشركة في تركيب تأثيرتين للبناء على أن تكون كل تأثير موجدة على مسافة واحدة من أربعة مداخل في مدينة السلامي:

١ـ جـدـ أـ سـوق لـ تركـبـ هـاـيـنـ تـأـيـرـتـينـ؟

٢ـ ماـ المسـافـةـ بيـنـهـمـ؟

الحل:

١ـ النـورةـ الأولىـ لـ جـيـهـ الـبـارـيـ يجبـ أـنـ تكونـ عـلـىـ تقـاطـعـ تقـاطـعـ القـطـريـنـ

لـ لـ مـسـطـيلـ الـذـيـ رـوـسـ (٠، ٤)، (٤، ٤)، (٤، ٠)، (٠، ٠).

تقـاطـعـ القـطـريـنـ هيـ متـصـفـ كـلـ قـطـرـ، الـذـاـ يـكـوـنـ مـوـقـعـ تـركـبـ

هـذـهـ تـأـيـرـتـينـ عـنـ النـقـطـةـ (٤، ٤)ـ، (٤، ٥)ـ، (٥، ٥)ـ، (٥، ٤)ـ.

أـيـ عـنـ النـقـطـةـ (٤، ٤)ـ، (٤، ٥)ـ، (٥، ٥)ـ، (٥، ٤)ـ.

تقـاطـعـ القـطـريـنـ هيـ متـصـفـ كـلـ قـطـرـ، الـذـاـ يـكـوـنـ مـوـقـعـ تـركـبـ

الـنـافـوـرـةـ الثـانـيـةـ عـنـ النـقـطـةـ (٤، ٥)ـ، (٥، ٥)ـ، (٥، ٤)ـ، (٤، ٤)ـ.

أـيـ عـنـ النـقـطـةـ (٤، ٥)ـ، (٥، ٥)ـ، (٥، ٤)ـ، (٤، ٤)ـ.

٣ـ المسـافـةـ بيـنـ تـأـيـرـتـينـ

نـسـتـخـدـمـ القـاعـدـةـ: $\sqrt{(سـ، سـ) + (صـ، صـ)}$.


$$\sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$$

أـيـ أـنـ المسـافـةـ سـوـفـ تكونـ ٤ـ وـحدـةـ طـولـ.

حاول أن تحل

مثال (٤)
تقـعـ المـدرـسـةـ فـيـ المـوـقـعـ ٢ـ شـرقـ، ١ـ جـنـوبـ وـيقـعـ مـنـزـلـ خـالـدـ شـرقـ، ٣ـ شـمـالـ. مـيـتـ عـلـىـ المـسـطـيـ الـإـحـدـاثـيـ مـوـقـعـ المـدـرـسـةـ وـمـوـقـعـ مـنـزـلـ خـالـدـ، ثـمـ أـوـجـدـ مـسـافـةـ مـنـ مـنـزـلـ خـالـدـ إـلـيـ الـمـدـرـسـةـ.

مـلـاحـظـةـ: المـوـقـعـ ٣ـ شـرقـ، ٢ـ شـمـالـ يـعـنـيـ (٢، ٣)ـ.



كلـ وـحدـةـ طـولـ عـلـىـ الـمحـاوـرـ سـارـيـ ٢ـ كـيلـومـترـ

٤٢٣

٩ إجابات وحلول

«دعنا نفكّر ونتناقش»

- ١ (٤، ١٢)؛ ب (١، ١٠)؛ ج (٥، ١)؛ د (٣، ٣)؛
ه (٨، ٨)؛ و (١٢، ٥)؛ ك (٨، ٥)؛ ن (٣، ٨)؛
ف (٥، ٣)؛ ق (٨، ١٥).

٢ د = ٩ وحدات؛ ب ج = ٥ وحدات.

٣ س ب - س ج = ٣ - ١٢ = ٩

س ب - س ج = ٥ - ١٠ = ٥

نلاحظ أن: د = س ب - س ج، ب ج = س ب - س ج.

«حاول أن تحل»

$$م ن = ٩ + ٢٥\sqrt{٧} = ٩(١ - ٤) + ٩(٢ + ٧ -)\sqrt{٧}$$

٥ وحدات طول.

٦٩

التاريخ الميلادي:

المستوى الإحداثي
Coordinate Plane

المجموعة أتمارين أساسية

في التمرين (١-٢)، أوجد المسافة بين كل زوج من النقاط التالية.

(١) (٧، ٢-) (٧، ٢+) (٢)

(٢) (-٧، ٢-) (-٧، ٢+)

في التمرين (٤-٣)، أوجد إحداثي نقطة المنتصف لكل من القطع المستقيمة التالية، بمعلومة إحداثيات طرفي القطعة المستقيمة.

(٣) (٥، ٢-) (٧، ٠)

(٤) (١٤، -٣) (١٠، ١)

في التمرين (٦-٥)، أوجد أطوال أضلاع كل من المثلثات التالية بمعلومة إحداثيات رؤوسها. قرب الإجابة إلى أقرب جزء من عشرة.


(٥) (٦، ٢)، (٦، ٣)، (٢، ٦)

(٦) (١٠، ١)، (١٠، ١)، (١٠، ١)

٧٧

(٧) يقع منزل فيصل ٤ شرق ٢ شمال، ويقع نادي الرماية الذي يتبع إليه فيصل ٢ غرب ٣ جنوب.

(٨) عين على المستوى الإحداثي موقع منزل فيصل وموقع نادي الرماية.



(٩) أوجد إحداثي نقطة المنتصف بين النادي ومنزل فيصل.

(ج) أوجد المسافة بين منزل فيصل والنادي.

(١٠) تفكير ناقد: إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف قطعة مستقيمة، فما هي الصفة التي سوف تتمتع بها إحداثيات طرفي القطعة المستقيمة؟

(١١) ما المسافة بين نقطة الأصل والنقطة (٤، ٣)؟

(ب) أوجد ثلاثة نقاط أخرى تكون على المسافة نفسها من نقطة الأصل.

٧٤

٢) م متصل كل ف تكون $(\frac{1}{2}, 1)$.



٣

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (١-٥)، اختر من القائمة الأولى ما يناسب في القائمة الثانية لحصول على عبارة صحيحة.

القائمة الثانية	القائمة الأولى
(١) ٢	المسافة بين المقطعين بالوحدات المطلوبة
(٢) ٣	(١) (٤, ٠), (٣, ٠) هي:
(٣) ٤	(٢) (-٢, ٤), (-٢, ٣) هي:
(٤) ٥	(٣) (٥, -٦), (٥, -٣) هي:

القائمة الثانية	القائمة الأولى
(١) $(\frac{5}{3}, 5)$	نقطة المتصل \overline{LN} حيث
(٢) $(\frac{5}{3}, 5)$	(٤) (-٢, ٩), (-٢, ١٢) هي:
(٣) $(\frac{5}{3}, 7)$	(٥) (٢, ١٢), (٠, ١٢) هي:
(٤) $(\frac{5}{3}, 7)$	(٦) (٣, ٦), (٣, ٣) هي:



٧٥

(٦) في الشكل المقابل أوجد طول \overline{AB} مقرضاً الإجابة إلى أقرب جزء من عشرة.


(٧) هندسة: في الشكل المقابل، \overline{AB} جد شبه مت旁رف.

(٨) أوجد إحداثيات نقاط متصل كل من \overline{AB} , \overline{BC}

بحيث تكون على الترتيب M, N .

(٩) أوجد طول \overline{MN} وطول \overline{BN} وطول \overline{AN} .

ثم قارن بين طول \overline{MN} والمتوسط الحسابي لمطوي \overline{BN} , \overline{AN} .



المسافة في المستوى الإحداثي = $\sqrt{17^2 + 2^2} = \sqrt{293}$ وحدة طول.

المسافة = $\sqrt{293} \times 2$ تبين المسافة بين منزل خالد والمدرسة

≈ 8.25 كم

لأن كل وحدة طول على المحاور تساوي 2 كم.

٢٩ تقسيم قطعة مستقيمة

١ الأهداف

- يوجد إحداثيات نقطة تقسيم قطعة مستقيمة بنسبة معينة من الداخل.
- يوجد إحداثيات نقطة تقسيم قطعة مستقيمة بنسبة معينة من الخارج.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

تقسيم قطعة مستقيمة من الداخل - تقسيم قطعة مستقيمة من الخارج.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة - ورق رسم بياني - آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

أسئل الطلاب عن النسبة والتناسب والضرب التقاطعي.

(١) شجرة ارتفاعها ١٥ متراً وطول ظلها في فترة من النهار ٦ أمتار. ما نسبة طول الشجرة إلى ظلها؟ أو ما نسبة ظل الشجرة إلى ارتفاعها؟

(٢) ناطحة سحاب ارتفاعها ١٧٤ متراً، يوجد بناء إلى جانبها ارتفاعه ٣٦ متراً. فما نسبة ارتفاع البناء إلى ارتفاع ناطحة السحاب؟

(٣) في فقرة «فلنعمل معاً»، ما نسبة طول قطعة الخشب الصغرى إلى طول قطعة الخشب الكبرى.

(٤) حدد على مستوى إحداثي موقع نقطتين:
 $(٤, ٦), (٣, ٢)$.

(٥) حل التناسب التالي: $\frac{5}{27} = \frac{\text{س}}{\text{ص}}$.

٥ التدريس

قد يجد الطلاب صعوبة في هذا الدرس لجهة الحفظ ومن ثم التذكر، وبخاصة مع قاعدة تقسيم قطعة مستقيمة من الداخل وقاعدة تقسيم قطعة مستقيمة من الخارج بنسبة معينة. دعهم يتعاملون بروية مع الدرس ليتمكنوا من تطبيق المخطط وفهم مجريات الشرح.

تقسيم قطعة مستقيمة
Dividing Line Segment

سوف تتعلم

- تقسيم قطعة مستقيمة من الداخل بنسبة معينة.
- تقسيم قطعة مستقيمة من الخارج بنسبة معينة.

الآن

قطعة خشبية طولها ٩٠ سم، يريد نجار تقسيمها إلى قطعتين مختلفتي الطول. يريد طول القطعة الكبيرة عن طول الصغرى ما يساوي نصف طول القطعة الصغرى. أو جد طول كلٍ من القطعتين.

لفترض أن لدينا القطة الصغرى قسمتها إلى قسمين متطابقين، فيكون طول القطعة الكبيرة ثلاثة أمثال أحد القسمين، وبالتالي هذا يعني أننا قسمت القطعة الخشبية إلى ٥ أقسام متطابقة. ونقسم طول الخشبة ٩٠ سم إلى ٥ أقسام فنحصل على ١٨ سم.

للاحظ أننا قسمت القطعة الخشبية بنسبة ٢:٣، فيكون طول القطعة الصغرى $18 \times 2 = 36$ سم وطول القطعة الكبيرة $18 \times 3 = 54$ سم



١- التقسيم من الداخل

مثال تمهيدي

لتكن AB قطعة مستقيمة بحيث $A(4, 5)$, $B(10, 1)$ والمطلوب تقسيم AB بنسبة ٣:٢ من الداخل من جهة A .

أوجد إحداثيات نقطة التقسيم.

الحل:

لتكن $G(s, ص)$ هي نقطة التقسيم المطلوبة.

نرسم المثلث ADB قائم الزاوية في D .

للحاظ الآتي: إحداثيات D هي $(4, 10)$.

$D = 5$ وتقسيمها بنسبة ٣:٢ من جهة D

يكون طولاً الجزر من هنا $\frac{2}{5}$

$2 = 2 \times \frac{2}{5}$ على الترتيب.

و تكون نقطة تقسيم AB هي $(4, 8)$.

$A = 5$ وتقسيمها بنسبة ٣:٢ من جهة A

يكون طولاً الجزر من هنا $\frac{3}{5}$

$3 = 2 \times \frac{3}{5}$ على الترتيب.


و تكون نقطة تقسيم AB هي $(4, 8)$.

وبذلك تكون G هي $(4, 8)$.

١٢٤

وصفة عامة:

إذا كانت AB قطعة مستقيمة بحيث $A(s, ص)$, $B(m, n)$ ، ويراد تقسيمها من جهة A بنسبة $m:n$ من الداخل وكانت نقطة التقسيم $G(s', ص')$ فإن:

$$s' = s + \frac{m-n}{m+n}n$$


ويمكن إيجاد نقطة التقسيم $G(s', ص')$ للمثال التمهيدي كالتالي:

$$s' = s + \frac{3+2}{3+2} \times 2 = \frac{5 \times 2}{5} = 5$$


$$ص' = ص + \frac{3+2}{3+2} \times 10 = \frac{5 \times 10}{5} = 10$$

نقطة التقسيم $G(s', ص')$:

$$(s', ص') = \left(\frac{4 \times 3 + 6 \times 2}{3+2}, \frac{5 \times 3 + 10 \times 2}{3+2} \right) = (6, 10)$$

في التقسيم من الداخل، اطلب إليهم التمرن على استخدام المخطط كـ هو. ركز على فكرة «التقسيم من جهة أي نقطة» ليعرفوا كيف يكتبون المخطط.

من جهة A مثلاً نكتب:



وهكذا نجد إحداثيات النقطة D هي:

$$\left(\frac{m s_2 + n s_1}{m + n}, \frac{m c_2 + n c_1}{m + n} \right)$$


في المثال (١)، أكد لهم أن الرسم البياني يساعد كثيراً على الإيضاح وعلى التحقق من صحة النتائج.

أما في التقسيم من الخارج فيجب الانتباه أيضاً لجهة أي نقطة سوف يتم التقسيم بنسبة معينة، وبالتالي الاعتماد على القاعدة يمكن أن يوقعنا في أخطاء، لذا يستحسن الاعتماد على المثال (٢) للعودة إلى التقسيم من الداخل. قد يكون رسم صورة لتحديد النقاط على المستوى الإحداثي ضرورياً جدًا، للتتأكد في ما بعد من النتائج التي حصلوا عليها.

أما لجهة القاعدة فيمكن استخدامها إذا كان التقسيم، مثلاً،



فيكون D هي:



$$\left(\frac{m s_2 - n s_1}{m - n}, \frac{m c_2 - n c_1}{m - n} \right)$$

الربط ٦

يعبر المثال (٣) عن عملية ربط بموقف حياتي يستخدم فيه كيفية إيجاد نسبة تقسيم قطعة مستقيمة بواسطة نقطة.

مثال (١)

إذا كان $\frac{1}{3}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{5}{3}$ ، $\frac{6}{3}$ ، $\frac{7}{3}$ من الداخل. فإذا كان $\frac{1}{3}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{4}{3}$ ، فأوجد نقطة تقسيم \overline{AB} من جهة B بنسبة $1:3$.

الحل: نقطة التقسيم $(s, c) = \left(\frac{s_1 + s_2}{3}, \frac{c_1 + c_2}{3} \right)$

$$s = \frac{5}{3} - \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$c = \frac{7}{3} - \frac{1}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

نقطة التقسيم هي: $\frac{4}{3}$ ، 2 .

حاول أن تحل:

إذا كان $\frac{1}{3}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{5}{3}$ ، $\frac{6}{3}$. فأوجد جـ بحيث $\frac{1}{2} \text{ جـ} = \text{جـ بـ}$.

[إرشاد: $\text{جـ} = \text{جـ بـ}$]

ملاحظة: الرسم ليس جزءاً من الحل ولكنه يساعد على التتحقق من مغلوبة الإجابة.

مثال (٢)

إذا كان $\frac{1}{4}$ ، $\frac{2}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{6}{4}$ من الداخل من جهة B في نقطة جـ بنسبة $5:3$. فأوجد إحداثيات النقطة جـ.

الحل: المطلوب إيجاد قيم s ، c [إحداثيات النقطة جـ حيث $\frac{1}{4} < s < \frac{3}{4}$]

$$s = \frac{9}{8} = \frac{9 \times 5 + 4 \times 3}{5 + 3} = \frac{57}{8}$$

$$c = \frac{9 \times 5 + 4 \times 3}{5 + 3} = \frac{57}{8}$$

ن تكون جـ $(\frac{57}{8}, \frac{9}{8})$.

حاول أن تحل:

لتكن $\frac{1}{4}$ ، $\frac{2}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{6}{4}$. فأجد إحداثيات النقطة جـ على \overline{AB} بحيث $\text{جـ بـ} = 2 \cdot \text{جـ جـ}$.

١٢٦

مثال (٣)

يقع منزل سلطان عند النقطة $\frac{1}{4}$ بينما يقع منزل صديقه فهد عند النقطة $\frac{1}{2}$. أوجد نسبة البعد بين كلا الممتلكين ومحطة الوقود إذا تمثلت بالنقطة $\frac{23}{7}$.

علمباً بأن النقاط A ، B ، C على استقامه واحدة.

الحل: نفرض أن نسبة التقسيم m : n جهة منزل سلطان لإيجاد نسبة البعد، نستخدم القانون العام لتقسيم قطعة من الداخل.

$$m + n = 23$$

$$m + n = 7$$

$$m = 16$$

$$n = 7$$

طريقة أخرى للحل:

$$\frac{23}{7} = \frac{m + 5 + n + 2}{m + n}$$

$$\frac{23}{7} = \frac{m + 5 + 7}{m + 7}$$

$$\frac{23}{7} = \frac{m + 12}{m + 7}$$

$$23(m+7) = 7(m+12)$$

$$23m + 161 = 7m + 84$$

$$16m = 84 - 161$$

$$16m = -77$$

$$m = -\frac{77}{16}$$

لاحظ أنه يمكن الاكتفاء بإيجاد النسبة من أحد الحلين بذلك، تكون نسبة البعد من كلا الممتلكين إلى محطة الوقود هي $4:3$ من جهة منزل سلطان.

ملاحظة: نسبة البعد بين كلا الممتلكين ومحطة الوقود هي $3:4$ من جهة منزل فهد.

حاول أن تحل:

في المثال (٣)، يقع منزل صالح على المستقيم المار بمنزل سلطان وفهد وهو يقسم \overline{AB} من الداخل من جهة A بنسبة $4:5$. فأجد إحداثيات منزل صالح.

١٢٧

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطالب في كلتا القاعدتين في تطبيق إحداثيات النقاط وحدّي النسبة. ساعدهم من خلال عدة أمثلة على استخدام المخططات وتحديد النسبة لأي جهة من النقاط.

٨ التقسيم

كن حريصاً على متابعة عمل كل طالب في فقرات «حاول أن تحل»، للتأكد من كونهم يضعون المخطط أو لا ثم يوجدون إحداثيات نقطة التقسيم.

اختبار سريع

لتكن $A(2, -3)$ ، $B(4, 2)$

١ أوجد نقطة تقسيم \overline{AB} من الداخل من جهة B بنسبة $\frac{2}{5}$.

$$\left(\frac{4}{7}, \frac{24}{7}\right)$$



٢ أوجد نقطة تقسيم \overline{AB} من الخارج من جهة A بنسبة $\frac{1}{3}$.

$$(5, 5)$$

٩ إجابات وحلول


«حاول أن تحل»

$$1 \quad \frac{1}{2} \frac{B}{A} = \frac{1}{2} \frac{B}{C}$$



التقسيم من جهة A

$$2 \quad \frac{2}{7} \frac{B}{A} = \frac{2}{7} \frac{B}{C}$$



$$\left(\frac{43}{9}, \frac{8}{3}\right)$$

التقسيم من جهة B .

External Division

٢ - التقسيم من الخارج

مثال تمثيلي
لتكن $A(2, 1)$ ، $B(4, 2)$

ويراد تقسيم \overline{AB} من الخارج من جهة B في نقطة جد بنسية $1:1$.

أوجد إحداثيات جد.

الحل:

لتكن $J(s, c)$ حيث $J \in \overline{AB}$ ، $J \neq A, B$

$JB = s$ و $JA = c$

$JB : JA = 1 : 1$

وهذا يعني أن J يقسم \overline{AB} بنسية $1 : 1$ من الداخل من جهة A .

بنطقي قاعدة التقسيم من الداخل نجد أن:



$$\frac{1 \times s + 3}{1 + 3} = \frac{1 \times 4 + 1}{1 + 3} = \frac{5}{4}$$

ومن ذلك نجد أن: $s = 1 + 5 = 6$ ومنها $c = 5$,

$$\frac{2 + 3}{4} = \frac{5}{4}$$

ومن ذلك نجد أن: $s = 2 + 5 = 7$ ومنها $c = 10$,

أي أن $J(7, 10)$ هي نقطة التقسيم من الخارج.



وبصورة عامة


إذا كانت $A(s, c)$ ، $B(s, c)$ ، $P(s, c)$ فإن النقطة $J(s, c)$ التي تقسم \overline{AB} من الخارج بنسية m من جهة B تكون إحداثياتها: $s = \frac{s+m}{m+1}$ ، $c = \frac{c+m}{m+1}$

ملاحظة: يمكن إيجاد نقطة التقسيم السابقة كالتالي:

$$s = \frac{n-m}{n-m+s} \cdot s + \frac{n-m}{n-m+s} \cdot c$$

١٢٨

بنطقي قاعدة التقسيم من الخارج على المثال التمهيدي من جهة B .



$$s = \frac{1 \times 1 - 4}{1 - 4} = \frac{1 - 16}{-3} = \frac{15}{3} = 5$$

$$c = \frac{2 \times 1 - 8}{1 - 4} = \frac{2 - 32}{-3} = \frac{-30}{-3} = 10$$

ج(10, 5) وهو ما حصلنا عليه نفسه في الحل السابق.

تدريب

أوجد نقطة تقسيم \overline{AB} من الخارج بنسية $4:1$ من جهة B . حيث $J(2, 1)$ ، $B(4, 2)$.

مثال (٤)

إذا كان $A(1, 4)$ ، $B(1, -2)$ ، $C(4, 1)$ ، $D(-2, 1)$ ، ويراد تقسيم \overline{AB} من الخارج جهة B في نقطة جد بنسية $3:2$.

أوجد إحداثيات النقطة جد.

الحل:

المطلوب إيجاد قيم s ، c [إحداثيات النقطة ج من الخارج حيث $J \in \overline{AB}$]

باستخدام قاعدة التقسيم من الخارج لجهة B نكتب:

$$s = \frac{10 - 1}{1 - 1} = \frac{4 \times 3 - 1 \times 2}{3 - 2} = \frac{12}{1} = 12$$

فتكون $J(12, 1)$


حاول أن تحل

٤ - لتكن $J(-2, 2)$ ، $B(3, 1)$. أوجد إحداثيات النقطة ج التي تقسم \overline{AB} من جهة B بنسية $3:8$.

١٢٩

٣ لتكن ج تمثل منزل صالح

$$\frac{ج}{ب} = \frac{٤}{٥}$$



ج(س، ص)

$$س = \frac{١١}{٣}$$

$$ص = \frac{٨}{٩}$$

ج(٨، ١١)، حيث هي إحداثيات منزل صالح.


ج(٤، ٦)

$$\frac{٤٦٧٥}{٤٦٨٧}$$

(ب) (١٠، ٩٧، ٦، ٩٨) تقريرياً.

«تدريب»


ج(٠، ٠)



المجموعة ب تمارين تعزيزية


- (١) أوجد إحداثيات النقطة ن التي تقسم $\overline{أب}$ من الداخل من جهة $أ$ إذا علم أن:
 (أ) (٤، ٦)، ب(٢، ٣) ونسبة التقسيم ٢ : ١.
 (ب) (١٠، ١٥)، ب(٦، ١٠) ونسبة التقسيم ٥ : ١.

٧٦




- (٢) المستقيم الموضح بالشكل يقطع عمودي الإحداثيات في النقاطين $أ$ ، $ب$ على الترتيب. أوجد إحداثيات $م$ التي تقسم $\overline{أب}$ من الداخل من جهة $أ$ بنسبة ٢ : ١.
 (٣) أ. ب، ج، د أربع نقاط على الشكل التالي:
 (أ) (٤، ٤)، ب(٢، ٤)، ج(١، ٤)، د(١، ٢).
 (أ) أثبتت آدأ ب جد متوازي الأضلاع.
 (ب) أوجد إحداثيات النقطة $ن$ ، حيث ن نقطة تقاطع القطرين في متوازي الأضلاع $أب جد$.

* (ج) أوجد إحداثيات النقاط س، ص، ع، ل. حيث س ، ص، ع، ل متوازي أضلاع له المركز نفسه (ن) وأطوال أضلاعه تساوي $\frac{١}{٣}$ أطوال أضلاع متوازي الأضلاع $أب جد$ ، حيث س ، ص، ع، ل تنتهي لقطري متوازي الأضلاع $أب جد$.



- (٤) أ. ب ج مثلث فيه (٢، ٥)، ب(١، ٣)، ج(٤، ١).
 (أ) أوجد إحداثيات النقطة $ن$ التي تقسم $\overline{أب}$ من الداخل من جهة $أ$ بنسبة ١ : ٣.
 (ب) أوجد إحداثيات النقطة $ك$ التي تقسم $\overline{بج}$ من الداخل من جهة $ب$ بنسبة ١ : ٢.

٧٧



مثال (٥) إثبات

أثناء الكسوف تكون الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة كالتالي الصورة المقاييس المسافة بين الأرض والشمس كم تقريرياً والمسافة بين الأرض والقمر كم تقريرياً.

- ١ أوجد نسبة التقسيم من الخارج جهة القمر على جهة الشمس المستقيمة الواقعة بين القمر والشمس حيث توجد الأرض.
 ٢ لماخذ مستوى إحداثي مرکزة نقطة الأصل وهي الشمس.
 إذا كان القمر في هذه الحالة له الإحداثيات (٦، ٦)، فما هي إحداثيات الأرض؟

الحل:

$$\begin{aligned} \text{المسافة بين الأرض والقمر} &= ٣٨٤٠٠٠ \text{ كم} \\ \text{المسافة بين الأرض والشمس} &= ١٤٩٦٠٠٠٠ \text{ كم} \\ \text{النسبة} &= \frac{٣٨٤٠٠٠}{١٤٩٦٠٠٠٠} = \frac{١٢}{٤٧٥} = \frac{٣٨٠٠٠}{٤٦٧٥} \end{aligned}$$

٣ التقسيم من الخارج بالنسبة إلى الأرض والقمر والشمس نكتب:

$$\begin{aligned} \text{القمر} &= (١٠، ٦) \quad \text{الشمس} = (٠، ٠) \\ ٤٦٧٥ &\times ٦ - ٠ \times ١٢ \\ &= ٤٦٧٥ - ١٢ \\ &= ٤٦٦٣ \text{ كم} \\ \text{س} &\approx ٦,٠١٥ \text{ كم} \\ ٤٦٧٥ &\times ٠ - ٠ \times ١٢ \\ &= ٤٦٧٥ - ١٢ \\ &= ٤٦٦٣ \text{ كم} \\ \text{ص} &\approx ١٠,٠٢٦ \text{ كم} \end{aligned}$$

أي أن إحداثيات الأرض هي تقريرياً: (١٠، ٠٢٦، ٦، ٠١٥).

حاول أن تحل

- ٤ في المثال (٥)، أوجد نسبة التقسيم: مسافة بين الشمس والقمر . مسافة بين الشمس والأرض .

٥ إذا افترضنا أن إحداثيات الأرض هي (١١، ٧)، فما هي إحداثيات القمر؟

١٣٠

٣-٩) ميل الخط المستقيم

مِيل الخط المستقيم
Slope of a Straight Line

(١) ٣-٩

دعا نفك ونتناول

يمثل المخطط مسار أحد مصاعد التزلج.

- ١ ما التغير الرأسى من A إلى B؟
- ٢ من B إلى ج؟ من ج إلى د؟
- ٣ ما التغير الأفقي من A إلى B؟
- ٤ من B إلى ج؟ من ج إلى د؟
- ٥ مانسية التغير الرأسى إلى التغير الأفقي
- ٦ كل نقطة هي الأكثر ارتفاعاً فشر.
- ٧ أي مرحلة هي الأكثر ارتفاعاً؟ فشر.

معدل التغير

في المخطط أعلاه، أب جـ لها معدلات غير مخالقات. يسمى معدل التغير بمقدار العلاقة بين كميتيين ينتميان إلى سمارار. يكون ما يلي صحيحًا إذا ارتبطت إحدى الكميتين بالآخر فـ:

المعدل هو مقارنة بين كميتيين بوحدات قياس مختلفة.

معدل التغير = التغير في المتغير التابع / التغير في المتغير المستقل

مثال (١)

باستخدام البيانات في الجدول أدناه أوجد معدل التغير. هل معدل التغير لكل يومين متاليين هو نفسه؟

كلفة تأجير الحاسوب	عدد الأيام
٦ دنار	١
٧,٥ دنار	٢
٩ دنار	٣
١٠,٥ دنار	٤
١٢ دنارًا	٥

الحل:

$$\text{معدل التغير} = \frac{\text{التغير في الكلفة}}{\text{التغير في عدد الأيام}} = \frac{٧,٥ - ٦}{٢ - ١} = \frac{١,٥}{١} = ١,٥$$

$$\text{معدل التغير} = \frac{\text{التغير في الكلفة}}{\text{التغير في عدد الأيام}} = \frac{٩ - ٧,٥}{٣ - ٢} = \frac{١,٥}{١} = ١,٥$$

$$\text{معدل التغير} = \frac{\text{التغير في الكلفة}}{\text{التغير في عدد الأيام}} = \frac{١٠,٥ - ٩}{٤ - ٣} = \frac{١,٥}{١} = ١,٥$$

ذكورة:

معدل التغير يمكن أن يكون موجباً أو سلباً أو صفراء.

سؤال ان حل

١) أوجد معدل التغير مستخدماً اليوم الخامس واليوم الثاني.

٢) تذكر ناقـ: هل إيجاد معدل التغير لزوج واحد من الأيام المتالية يعني أن معدل التغير هو نفسه في كل بيانات الجدول؟ تشر إيجـاتك.

استخدام الرسم البياني لإيجاد معدل التغير

يبين الرسم البياني أن أزواج المرتبة (عدد الأيام، الكلفة) في المثال (١) موجودة على خط مستقيم.

بيانات الجدول هي خطية.

يمكن استخدام الرسم البياني لإيجاد معدل التغير.

يتم تعين المتغير المستقل على المحور الأفقي ويتم تعين المتغير التابع على المحور الرأسى.

إيجاد الميل

درست في سبق أن ميل المستقيم يمكن إيجاده باستخدام العلاقة.

الميل = التغير الرأسى / التغير الأفقي

مثال (٢)

فمنـلا ميل المستقيم الموضح بالشكل المقابل

الميل = التغير الرأسى / التغير الأفقي

$$\text{الميل} = \frac{٥ - ٢}{٤ - ٢} = \frac{٣}{٢}$$

مـيل الخط المستقيم يساوي $\frac{٣}{٢}$.

- الأهداف** ١
- يوجد معدـل التغير لكمـيتـين مختلفـتين.
 - يوجد مـيل الخط المستقيم.
 - يكتب العلاقة بين مـيل المستقيم وـظل الزاوـية التي يـصنـعـها الـاتـجـاهـ المـوـجـبـ لـمحـورـ السـيـنـاتـ معـ الخطـ المـسـتـقـيمـ.

- المفردات والمفاهيم الجديدة** ٢
- مـعدلـ التـغـيرـ - التـغـيرـ الرـأـسـيـ - التـغـيرـ الأـفـقـيـ - المـيلـ.
- الأدوات والوسائل** ٣
- مسـطـرةـ - وـرقـ رـسـمـ بـيـانـيـ - آلةـ حـاسـبـةـ - حـاسـوبـ - جـهاـزـ إـسـقـاطـ (Data show).

- التمهيد** ٤
- أسـأـلـ الطـلـابـ:

- (١) كيف تجد المسافة بين نقطتين على محور السينات وعلى مستقيم موازٍ لمحور السينات بدلاً لإحداثياتهما؟
- كيف تجد المسافة بين نقطتين على محور الصادات أو على مستقيم موازٍ لمحور الصادات بدلاً لإحداثياتهما؟
 - كيف تجد المسافة بين نقطتين في المستوى الإحداثي بدلاً لإحداثياتهما؟

- (٢) أـبـ جـ مـثـلـ قـائـمـ الزـاوـيةـ ١ـ.
- أـوـ جـ ظـاجـ ، ظـابـ.
- (٣) إذا كان ظـاـ = ٣٧٠ ، ٥٦٠ = ١٢٠ .
- فـأـوـ جـ ظـاـ (٥٠١٢٠) .

- التدريس** ٥
- اعرض أمام الطلاب أمثلة متعددة لترسيخ فكرة المـعدـلـ ومـعدلـ التـغـيرـ، كـيـ يتـعـرـفـواـ الفـرقـ بـيـنـ مـعدـلـ التـغـيرـ وـالـنـسـبةـ.
- مثلـ: سـرـعةـ السـيـارـةـ بـالـسـاعـةـ، ثـمـنـ سـلـعـةـ مـعـيـنةـ بـالـدـيـنـارـ، وزـنـ جـسـمـ معـيـنـ بـالـكـيـلوـجـرامـ ...

- قد يـسـاعـدـ المـثالـ (١) بـشـكـلـ كـبـيرـ عـلـىـ فـكـرـةـ مـعدـلـ التـغـيرـ، وبـخـاصـةـ عـنـدـماـ نـسـتـخـدـمـ كـمـيـتـينـ مـخـلـفـتـينـ.

النهاية في المتغير التابع ص
ركز على القاعدة: ميل التغير = التغير في المتغير المستقل / ميل الخط المستقيم
 اشرح لهم معنى المتغير التابع والمتغير المستقل بأمثلة حسية.
 حفز الطلاب على فهم كيفية إيجاد ميل الخط المستقيم وفهم معناه الحقيقي وتطبيقاته على الواقع، وبخاصة بالنسبة إلى شق الطرق ...

في المثال (٣)

أهمية هذا المثال أنه يعطي الطالب طريقة لأثبات أن ٣ نقاط هي على استقامة واحدة.
 توسيع في العلاقة التي تربط ميل المستقيم بظل الزاوية التي يصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

اشرح لهم أن الزاوية المنفرجة يكون ظلها حتى قيمة سالبة بحسب ما سبق أن تعلموه في دائرة الوحدة. وهذا يتفق تماماً مع الميل السالب للخط المستقيم.
ذكرهم بالقاعدة: $\tan(\alpha - \pi) = -\tan(\alpha)$
 $\tan(\alpha) = -\tan(180^\circ - \alpha)$.


٦. الرابط

أراد أحد مهندسي الطرق معرفة ميل طريق غالباً ما يحتاجه، فلاحظ أنه كلما اجتاز مسافة ١٠٠ متر أفقياً يرتفع عن مستوى الأفق ٢٠ سم. ما ميل هذا الطريق؟

$$\text{الميل} = \tan \alpha = \frac{20}{10000}$$

٧. خطوط متوقعة ومعاجتها

قد يكتب الطالب الميل = $\frac{\text{التغير الرأسى}}{\text{التغير الأفقي}}$.
 ساعدتهم على ربط الميل بظل الزاوية في المثلث قائم الزاوية.



ذلك يمكن استخدام نقطتين على خط مستقيم لإيجاد ميله.

في الرسم البياني إلى اليسار،

لإيجاد ميل $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ، حيث $\Delta y = y_2 - y_1$ ، $\Delta x = x_2 - x_1$ ، نستخدم الصيغة التالية:

$$\text{الميل} = \frac{\text{التغير الرأسى}}{\text{التغير الأفقي}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

يجب مراعاة الترتيب المعتمد في كتابة إحداثيات النقطتين عند إيجاد الميل. فمثلاً، إذا بدأنا بالإحداثي الصادي لنقطة ب في البسط فيجب البدء بالإحداثي السيني لنقطة ب في المقام.



مثال (٢) أوجد ميل الخط المستقيم الذي يمر بالنقاطين (١، ٢)، (٢، ٥).

$$\text{الميل} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5 - 2}{2 - 1} = 3$$


$$\begin{aligned} & \text{عرض} \\ & \frac{1-7}{(2)-5} = \frac{-6}{-3} = 2 \\ & \text{بسط} \\ & \text{ميل الخط المستقيم } \frac{1}{2} \text{ يساوي } 2. \end{aligned}$$

حاول أن تحل

٢. أوجد ميل الخط المستقيم الذي يمر بكل زوج من النقاط.

$$\text{١. } \begin{aligned} & \text{م}(4, 3), \text{ـ}(5, 2) \\ & \text{ـ}(2, 4), \text{ـ}(3, 5) \end{aligned}$$

١٣٣



مثال (٣)

تأذن في المستوى الإحداثي النقاط: (١، ١)، (٢، ٢)، (٣، ٢)، (٤، ١). أثبت أن النقاط (١، ٢)، (٣، ٢)، (٤، ١) على استقامة واحدة.

الحل:

$$\begin{aligned} \text{م} &= \text{مائل } \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{(2) - (1)}{(2) - (1)} = 1 \\ \text{م} &= \text{مائل } \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{(2) - (1)}{(4) - (3)} = 1 \\ \text{م} &= \text{مائل } \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{(1) - (2)}{(4) - (1)} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

لأن $m = m$ ،

$\therefore (1, 2) // (3, 2) // (4, 1)$ ولكنها تشترك في النقطة (2).

..
 تكون النقاط (١، ٢)، (٣، ٢)، (٤، ١) على استقامة واحدة.

حاول أن تحل

٢. أثبت أن النقاط (١، ١)، (٢، ١)، (٥، ٥)، (٣، ٣) على استقامة واحدة.

تذكر أن العلاقة بين ظل الزاوية θ التي يصعها مستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات وميل هذا المستقيم m هي: $m = \tan \theta$.

١٣٤

٨ التقييم


تابع عمل الطلاب في فقرات «حاول أن تحل» لتأكد من حسن استخدامهم مفاهيم هذا الدرس ومهاراته.

اختبار سريع

١ أوجد ميل المستقيم المار بال نقطتين (٣، ٥) ، (٥، ١)

ب (٤، ٢)

٢ ارسم المستقيم المار بنقطة (١، ١) وميله ٢.



٧٨

في التمارين (٩-٦)، أوجد ميل المستقيم إن أمكن المار بكل من أزواج النقاط التالية:

(٦) (٢، ٥) ، (٢، ٣)

(٧) (٣، ٢) ، (٥، ٦)

(٨) (٤، ٣) ، (٤، ٣)

(٩) (-٣، ٤) ، (٣، ٤)

١٠ أوجد ميل المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها 60° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

١١ أثبت أن المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45° يوازي المستقيم:

$$\text{س} = \text{ص} + ٧$$



في التمارين (١٢-١٣)، أوجد نسبة التغير في كل حالة.

١٢) يبلغ طول الرضيع ٤٥ سم بعد شهر من الولادة و ٦٩ سم عندما يبلغ شهره العاشر.

١٣) بلغ ثمن ٤ تذاكر للسينما ١٠ دنانير و ١٠ تذاكر ١٩ ديناراً.

في التمارين (١٤-١٥)، ارسم المستقيم المار بالنقطة المعلنة وميله المعطى كالتالي:


١٤) ب (٢، ٥)، الميل = $\frac{1}{2}$



١٦) أوجد نقطتين تقعان على مستقيم ميله $\frac{3}{4}$ ويمر بنقطة الأصل.

٧٩

مثال (٤) أوجد ميل آب حيث (٤، ٠)، ب (-٢، ٠) وقارنه بظل الزاوية θ في المثلث قائم الزاوية بـ θ .



الحل: $\tan \theta = \frac{\text{ارتفاع}}{\text{عرض}} = \frac{أ}{ب}$

$$\text{الميل} = \frac{\text{ص} - \text{ص}_1}{\text{x} - \text{x}_1}$$

$$= \frac{٥ - ٠}{٤ - (-٢)} = \frac{٥}{٦} = \frac{٥}{٣} = \frac{٥}{٣}$$

$$= \frac{٥}{٣} = \frac{٥}{٣}$$


في المثلث أوب: $\text{أ} = ٤$ ، $\text{ب} = ٢$

$$\text{مطابق} = \frac{٥}{٣} = \frac{٥}{٣}$$

$$\therefore \text{ظل} \theta = \text{ميل آب} = \frac{٥}{٣}$$

حاول أن تحل

٤) أوجد ميل المستقيم آن وقارنه بظل الزاوية الحادة التي قياسها θ ، وظل الزاوية المترافقه التي قياسها $٩٠^\circ - \theta$.



١٣٥

٩ إجابات وحلول

«دعنا نفكّر ونناقش»

١ - ٤ تحقق من إجابات الطلاب.

«حاول أن تحل»

$$١) \text{معدل التغير: } \frac{٧,٥ - ١٢}{٢ - ٥} = \frac{-٤,٥}{-٣}$$

(ب) لا، لأنّه عندما نتحدث عن معدل التغير، يجب أن يكون ثابتاً في جميع البيانات.

$$١ = \frac{٢ - ١}{٢ - ٠} = \frac{١}{٢}$$

$$(ب) \frac{٣}{٢} = \frac{٦}{٤} = \frac{(٢ - ٤)}{(٣ - ١)}$$

(ج) صفر (٠)


في التمارين (١٧-١٩)، أوجد قيمة كل من س، ص إذا كانت النقطتان على المستقيم مع المعطيات التالية:

$$(١٧) (س، ٣، ٨)، (ص، ٢)، الميل = \frac{٣ - ٨}{٣ - ٢} = \frac{-٥}{-١} = ٥.$$

$$(١٨) (-٤، ص)، (٢، ٦)، الميل = \frac{ص - ٦}{-٤ - ٢} = \frac{-٦ - ص}{-٦} = ١.$$

$$(١٩) (٥، ٣)، (س، ٢)، الميل غير معروف.$$

(٢٠) هندسة: أوجد ميل كل ضلع في الشكل المقابل إن أمكن.



في التمارين (٢٤-٢٦)، ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة و (٢) إذا كانت العبارة خطأ.

(٢١) من الممكن أن يكون لستقيمين مختلفين الميل نفسه.

(٢٢) إن ميل المستقيم الذي يمر بالثالث ونقطة الأصل هو دائمًا سالب.

(٢٣) لا يمر المستقيم الذي يملاه ساري صفرًا ب نقطة الأصل.

(٢٤) نقطتين لديهما الإحداثي السيني نفسه، فلأنهما ينتميان إلى المستقيم الرأسي نفسه.

(٢٥) تحليلاً الخطأ: وجد سالم أن ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (١، ٧)، (٩، ٤) يساوي: $\frac{-٣}{-٩} = \frac{١}{٣}$. ما هو خطأ سالم؟

(٢٦) أوجد ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (س، ص)، (-س، -ص).

في التمارين (٢٨-٢٧)، حدد إن كانت مجموعة النقاط التالية تقع على استقامة واحدة.

(٢٧) (٤، ١)، (٣، ٢)، (٤، ٣)، (٢، ٤).

(٢٨) (٢، ٣)، (٣، ٢)، (٠، ١)، (١، ٢)، (٢، ٠).

٨٠

(٢٩) أثبت أن المستقيم المار بالنقطتين (-١، ١)، (-٤، ٥) عمودي على المستقيم المار بالنقطتين (٠، ٤)، (٣، ٣).


المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين (٤، -٣)، (١، ٥) مستخدماً (س، ص)، ب (س، ص).

(ب) أوجد ميل المستقيم في (١) مستخدماً (س، ص)، ب (س، ص).



(ج) ماذا تلاحظ؟

(٢) إذا كان معدل التغير في الجدول أو الرسم أدناه ثابتاً، أوجد معدل التغير وفتر ماذا يعني كل معدل تغير في كل حالة على ما يلي:



عدد الأشخاص	سعر الوجبة (اللدينار)
٤	٢
٦	٣
٨	٤
١٠	٥
١٢	٦

في التمارين (٤-٣)، أوجد ميل كل مستقيم مما يلي:



٨١

$$2 - = \frac{6}{3} = \frac{(1) - 5}{2 - 1} = \text{ميل } \overleftrightarrow{AB} \quad (3)$$

$$2 - = \frac{8}{4} = \frac{5 - 3}{(1) - 3} = \text{ميل } \overleftrightarrow{B\bar{J}} \quad (4)$$

$$\text{ميل } \overleftrightarrow{AB} = \text{ميل } \overleftrightarrow{B\bar{J}}$$

$\therefore \overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{B\bar{J}}$ ويشتركان في النقطة ب.

$\therefore A, B, J$ على استقامة واحدة.

$$\frac{1}{2} = \frac{4}{8} = \text{ميل } \overleftrightarrow{AN} \quad (4)$$

= ظل الزاوية التي يصنعها مع \overleftrightarrow{AN} الاتجاه

الموجب لمحور السينات

$$\text{ميل } \overleftrightarrow{AN} = \text{ظا } \theta$$

$$= -\text{ظا } \theta$$

في التمارين (٦-٥)، أوجد ميل المستقيم المار بكل من أزواج النقاط التالية:


$$(5) (4, 4), (2, 5)$$

$$(6) (2, 1), (1, 2)$$

(7) أوجد ميل مستقيم موازٍ لمحور السينات.

(8) أوجد ميل مستقيم يصنع مع محور السينات زاوية قياسها 45° ويمر بنقطة الأصل.

في التمارين (٩-١١)، حدد ما إذا كان ميل المستقيم \overleftrightarrow{AB} يساوي صفرًا أم هو غير معروف.



$$(9) (1, 2), (4, 4)$$

$$(10) (3, 5), (1, 2)$$

$$(11) (1, 4), (1, 5)$$

(12) أوجد نقطتين تقعان على مستقيم ميله $-\frac{1}{3}$ ، ويمر بنقطة الأصل.

في التمارين (١٣-١٥)، أوجد قيمة س إذاً ميل المستقيم المعطى ميله بال نقطتين.

$$(13) (4, 2), (S, 8), \text{ الميل} = 2$$

$$(14) (4, 2), (S, 8), \text{ الميل} = \frac{1}{2}$$

$$(15) (3, 4), (S, 7), \text{ الميل} = 2$$

(16) هندسة: في الشكل المقابل أوجد ميل كل ضلع.




٨٢

في التمارين (١٧-١٩)، ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (٢) إذا كانت العبارة خطأ.

- (١) (١) (١) (١)
 - (٢) (١) (١) (١)
- (١٧) معدل التغير دائمًا موجباً أو يساوي صفر.
- (١٨) كل المستقيمات الأفقية لها ميل نسبي.
- (١٩) المستقيم الذي ميله يساوي ١ دائمًا يمر بنقطة الأصل.

(٢٠) يمثل الشكل المقابل رسم تأثير الأفلام نسبة إلى مدة التأثير.



(أ) أوجد ميل المستقيم. ماذا يمثل هذا العدد؟

(ب) أوجد المبلغ الذي سيدفعه الشخص لاستئجار فيلم مدة عشرة أيام.

(٢١) أوجد ميل المستقيم الذي يمر بال نقطتين (-٣، ص)، (ص، -٣)، (ص، -ص)

في التمارين (٢٢-٢٣)، هل النقط المعلقة تقع على استقامة واحدة؟

$$(22) (4, 2), (2, 4), (2, 2), (5, 2)$$

$$(23) (1, 2), (2, 1), (5, 5), (2, 5)$$

(٢٤) أوجد ميل مستقيم معادل مع المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها 60° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

٨٣

٣-٩ (ب) معادلة الخط المستقيم

معادلة الخط المستقيم
Equation of a Straight Line

دعونا نفك ونناقش

- كماية معادلة الخط المستقيم
- الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم
- إيجاد ميل التغير

تُمثل المعادلة: $y = mx + c$ حيث m يمثل ميل الخط.

إذا كانت $m = 0$ فإن معادلة المستقيم تصبح $y = c$ وهي تمثل مستقيمة موازية لمحور السيني (مستقيمة أفقية).

إذا كانت $c = 0$ فإن المستقيم يمر ب نقطة الأصل و معادلته $y = mx$.

ملاحظة:

- كتابية معادلة خط مستقيم ليس رأسياً نحن بحاجة إلى معرفة:
- الميل (m).
- نقطة من نقاط المستقيم ولتكن (x_1, y_1).

تكون معادلة المستقيم: $y - y_1 = m(x - x_1)$.

مثال (١)

أكتب معادلة الخط المستقيم الذي يملي $\frac{3}{7}$ ويمر بالنقطة (-٤، -١).

الحل:

$$y - (-1) = \frac{3}{7}(x - (-4))$$

$$y + 1 = \frac{3}{7}(x + 4)$$

$$7(y + 1) = 3(x + 4)$$

$$7y + 7 = 3x + 12$$

$$3x - 7y - 5 = 0$$

بالعمريض

بالتبسيط

حاول أن تحل

معلومات رياضية:

معدل درجة الحرارة بالفهرنهايت يرتبط بمعدل الدرجة المئوية (سيليبرة) بالعلاقة:

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

ويمكن كتابتها:

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

وهي معادلة خط مستقيم يملي $\frac{5}{9}$ أو $C = \frac{5}{9}(F - 32) + 0$.

مثال (٢)

أكتب معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطتين (٣، ١)، (٥، -٢).

الحل:

$$\text{نوجد الميل } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-2 - 1}{5 - 3} = \frac{-3}{2}$$

$$y - 1 = \frac{-3}{2}(x - 3)$$

$$2(y - 1) = -3(x - 3)$$

$$2y - 2 = -3x + 9$$

$$3x + 2y - 11 = 0$$

معلومات مفيدة:

الصورة العامة لمعادلة المستقيم هي: $y = mx + c$.

حيث m يملي معادلة الصفر معاً.

لأن مستقيمين غير رأسين ومتوازيين الميل تنسق. أما إذا كان المستقيمان متوازيان وليس أحدهما رأسياً، فناتج ضرب ميليهما ساوي ١. وبالتالي إذا علمنا ميل أحد المستقيمات فيمكن إيجاد ميل المستقيمة المتوازية معه أو ميل المستقيمات المتعامدة معه، كذلك يمكننا إيجاد معادلته بمعرفة نقطته على هذا المستقيم.

مثال (٣)

إذا كان المستقيم L : $y = 2x + 1$ ، فأوجد:

- معادلة المستقيم M الموازي للمستقيم L الذي يمر بالنقطة (-٣، ٢).
- معادلة المستقيم N العمودي على المستقيم L الذي يمر بالنقطة (-٤، -٣).

الحل:

- .. $m_L = 2$ ، $m_M = 2$ ، $m_N = -\frac{1}{2}$.
وبالتالي، معادلة المستقيم M تكتب على الشكل:
$$y - 2 = 2(x - (-3))$$

$$y - 2 = 2(x + 3)$$

$$y = 2x + 8$$
- وبالتالي معادلة N : $y = -\frac{1}{2}x - 3$.

- الأهداف**
- يوجد معادلة الخط المستقيم متى علم ميله ونقطة عليه.
 - يوجد معادلة الخط المستقيم متى علم نقطتين عليه.
 - يتعرف الصورة العامة لمعادلة المستقيم.
 - يتعرف العلاقة بين ميل المستقيم ومعدل التغير.
 - يتعرف معادلة المستقيم الأفقي ومعادلة المستقيم الرأسى.
 - يوجد معدل التغير لكميتيين مختلفتين.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

معدل التغير - معادلة - توازٍ - تعامد - معادلة محور السينات - معادلة محور الصادات.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة - ورق رسم بياني - آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

أسأل الطالب:

(أ) ما هو ميل الخط المستقيم الذي يمر بالنقطتين (٢، ٥)، (٣، -١)؟

(ب) كيف تكون الخطوط المستقيمة متوازية؟

(ج) كيف تكون الخطوط المستقيمة متعامدة؟

(د) إذا كان الخط المستقيم L يصنع زاوية α مع محور السينات، وكان $\alpha = 37^\circ$.

فما قياس هذه الزاوية بالدرجات؟

وما هو ميل هذا المستقيم؟

٥ التدريس

يتطرق هذا الدرس إلى أشكال متعددة من معادلة الخط المستقيم، وذلك بحسب موقعه في المستوى الإحداثي. لقد رأينا في الدرس السابق أن بإمكان الخط المستقيم أن يكون موازياً

لحوz السينات أو لمحور الصادات أو يمر بنقطة الأصل أو ليس أياً ما سبق.

لذا كان من الضروري إيجاد معادلة لـ الخط المستقيم في كل حالة وردت. كما يتطرق هذا الدرس إلى وضعية الخطوط المستقيمة مع بعضها البعض إذا كانت متوازية أو متقاطعة أو متقاطعة متعامدة.

والأهم في كتابة معادلة الخط المستقيم هو إيجاد الميل وتحديد إحداثيات نقطة واحدة يمر بها كما في المثال (١).

إذا كان يمر بـ نقطتين نوجد الميل أولاً، ثم نستخدم واحدة من النقطتين كما في المثال (٢).

ركز مع الطالب على شرط توازي مستقيمين:

مـيل المستقـيم الأول = مـيل المستقـيم الثـاني حيث المـيل مـعـرف

وعلى شروط تعـامـد مـسـتـقـيمـيـن:

مـيل المستقـيم الأول × مـيل المستقـيم الثـاني = ١ ، مـثال (٣)

وضـحـ لـ طـلـابـ أـنـ بـيـانـاتـ كـثـيرـةـ مـنـ مـسـائـلـ الـحـيـاتـيـةـ يـمـكـنـ نـمـذـجـتـهـاـ بـمـعـادـلـاتـ خـطـيـةـ،ـ نـسـتـطـيعـ مـنـ خـلـالـهـاـ وـضـعـ توـقـعـاتـ وـاتـخـاذـ قـرـارـاتـ تـسـاعـدـ كـثـيرـاـ فـيـ حـرـكـةـ الـبـيـعـ وـالـشـراءـ وـالـعـامـلـاتـ فـيـ مـجـالـاتـ مـخـتـلـفـةـ.

ضرورة الاهتمام بالصورة العامة لـ معادلة المستقيم حتى يستطيع الطالب توظيفها في البند التالي (البعد بين نقطة ومستقيم)

وهي على شكل: $Ax + By + C = 0$

٦ لـ ، فـ مـسـتـقـيمـانـ مـعـامـدـانـ .ـ مـيلـ المـسـتـقـيمـ Lـ مـيلـ المـسـتـقـيمـ Fـ = ١ـ .ـ

ذـكـرـ
إذا كان مـيلـ المـسـتـقـيمـ هو $\frac{1}{2}$
فـانـ مـيلـ المـسـتـقـيمـ المـعـامـدـ هو $\frac{1}{2}$
هو $\frac{1}{2}$ حيث $A \neq 0$.

مـيلـ المـسـتـقـيمـ Fـ =
$$\begin{aligned} \text{مـيلـ المـسـتـقـيمـ Fـ} &= \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \times \text{مـيلـ المـسـتـقـيمـ Fـ} \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

مـعادـلـةـ المـسـتـقـيمـ Fـ : $y = \frac{1}{2}x + 1$

حاـولـ أنـ تـحلـ

٧ إذا كان مـيلـ المـسـتـقـيمـ Lـ : $y = 3x + 2$ ، فأـوـجـدـ
٨ مـعادـلـةـ المـسـتـقـيمـ المـواـزـيـ لـلـمـسـتـقـيمـ Lـ وـالـذـيـ يـمـرـ بـنـقـطـةـ (٢ـ،ـ ٣ـ)ـ .ـ
٩ مـعادـلـةـ المـسـتـقـيمـ زـمـوـدـيـ عـلـىـ المـسـتـقـيمـ Lـ وـالـذـيـ يـمـرـ بـنـقـطـةـ (٤ـ،ـ ١ـ)ـ .ـ

يمـكـنـ كـاتـبـ الـبـيـانـاتـ فـيـ جـوـدـلـ لـتـوـضـيـعـ الـبـيـانـاتـ بـنـ مـجمـوـعـتـينـ مـنـ الـبـيـانـاتـ إـذـاـ كـانـ مـعـدـلـ التـغـيـرـ بـنـ الـأـزـوـاجـ مـتـالـيـةـ .ـ

مـثالـ (٤)
هل يمكن إيجاد علاقة خطـيـةـ بـنـ الـأـزـوـاجـ مـتـالـيـةـ فـيـ جـوـدـلـ الـمـوـضـعـ؟ـ إـذـاـ وـجـدـتـ ،ـ فـاكـتـبـ الـمـعـادـلـةـ الـخـطـيـةـ الـتـيـ يـمـكـنـ أـنـ تـمـلـيـنـ جـوـدـلـ هـذـهـ الـبـيـانـاتـ .ـ

الـحـلـ:
الـخـطـيـةـ الـأـوـلـيـ :ـ أـوـجـدـ مـعـدـلـ التـغـيـرـ بـنـ كـلـ زـوـجـينـ مـرـتـيـنـ .ـ

مـعـدـلـ التـغـيـرـ : $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 1}{4 - 2} = \frac{3}{2}$

حاـولـ أنـ تـحلـ

١٣٨

الـخـطـيـةـ الـثـانـيـ :
استـخدـمـ صـيـغـةـ المـيلـ وـنـقـطـةـ لـكتـابـةـ الـمـعـادـلـةـ:
$$y = mx + b$$

مـيلـ المـسـتـقـيمـ : $m = \frac{1}{2}$

نـقـطـةـ : $(2, 1)$

مـعـادـلـةـ : $y = \frac{1}{2}x + b$

مـيلـ المـسـتـقـيمـ : $m = 3$

نـقـطـةـ : $(4, 1)$

مـعـادـلـةـ : $y = 3x + b$

حاـولـ أنـ تـحلـ

٤ هل يمكن إيجاد علاقة خطـيـةـ بـنـ الـأـزـوـاجـ مـتـالـيـةـ فـيـ جـوـدـلـ الـمـوـضـعـ؟ـ فيـ حـالـ وـجـدـتـكـ المـعـادـلـةـ ،ـ اـكـتـبـ الـمـعـادـلـةـ الـخـطـيـةـ الـتـيـ يـمـكـنـ أـنـ تـمـلـيـنـ جـوـدـلـ هـذـهـ الـبـيـانـاتـ .ـ

مـثالـ (٥) **إـلـيـانـيـ**
بيـنـ جـوـدـلـ الـثـالـيـ الـنـسـيـةـ الـمـتـوـنـيـ صـنـ عـدـدـ سـاعـاتـ اـسـتـهـلاـكـ الطـاقـةـ الـكـهـرـيـاـنـةـ (ـسـ)ـ عـدـدـ سـاعـاتـ اـسـتـهـلاـكـ الطـاقـةـ الـكـهـرـيـاـنـةـ (ـسـ)ـ

٣	٢	١
٤٠	٧٦٠	٧٨٠
الـنـسـيـةـ الـمـتـوـنـيـ لـلـطاـقـةـ الـمـتـيـقـيـةـ (ـصـ)	٢٠	٢١

١ اـكـتـبـ مـعـادـلـةـ خـطـيـةـ يـمـكـنـ أـنـ تـمـلـيـنـ عـدـدـ سـاعـاتـ وـالـنـسـيـةـ الـمـتـوـنـيـ لـلـطاـقـةـ الـمـتـيـقـيـةـ .ـ

٢ بـعـدـ كـمـ سـاعـةـ تـصـبـحـ الطـاقـةـ الـمـتـيـقـيـةـ فـيـ الـبـاتـرـيـ ٩%٥ـ

الـحـلـ:

١ مـعـدـلـ التـغـيـرـ : $m = \frac{21 - 20}{780 - 760} = \frac{1}{20}$

٢ فيـكـونـ مـعـدـلـ التـغـيـرـ ثـابـتـ

٣ نـسـتـخـدـمـ الـمـعـادـلـةـ:

$$y = mx + b$$

مـيلـ المـسـتـقـيمـ : $m = \frac{1}{20}$

نـقـطـةـ : $(760, 20)$

مـعـادـلـةـ : $y = \frac{1}{20}x + b$

٤ المـعـادـلـةـ :

$$y = \frac{1}{20}x + b$$

٥ بـالـعـوـيـضـ :

$$21 = \frac{1}{20} \cdot 780 + b$$

٦ بـالـبـيـطـ :

$$21 = 39 + b$$

٧ بـالـنـقـطـةـ :

$$b = 21 - 39 = -18$$

٨ مـعـادـلـةـ :

$$y = \frac{1}{20}x - 18$$

١٣٩

٦ الرابط

يوفر مثال (٥) فرصة كبيرة للربط بين المسائل الحياتية ونمذجتها بمعادلات خطية لإيجاد توقعات واتخاذ قرارات مناسبة.

٥ حاول أن تحل

أي بعد مرور ٤ ساعات و٥ دقائق.

٦ في المثال (٥)، ما عدد ساعات استهلاك الطاقة التي تكون النسبة المئوية لطاقة المتبقية في البطارية تساوي ٩٪٧٠ جاءت نتائج تمدد شريط زنيركي بالستينتر بحسب الأوزان المعلقة عليه، كما بين الجدول التالي:

الوزن (كيلوجرام)	التمدد ص (ستينتر)
١٠	٧
٥	٤
٢	١
٢٠	١٥،٥
١٢،٥	١١
٨	٣

هل العلاقة بين الوزن والتمدد يمكن أن تكون خطية؟ في حال الإيجاب اكتب المعادلة الخطية.

١٤٠

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطالب في استخدام قاعدة المسافة بين نقطتين فيكتبا $\sqrt{b^2 + b^2} = \sqrt{2b^2}$. أعط أمثلة تبيّن خطأ هذه المعادلة. مثال (٧) $\sqrt{3^2 + 4^2} \neq \sqrt{7^2}$. أشر إلى أن هذه المعادلة صحيحة فقط في حالة الضرب

$$\sqrt{b^2 + b^2} = \sqrt{2b^2} \\ \Rightarrow b \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times b$$

٨ التقسيم

راقب عمل الطالب في فقرات «حاول أن تحل» لأنها تعطيك فكرة واضحة عن تمكّنهم مما ورد في الدرس.

اختبار سريع

١ اكتب معادلة المستقيم ل الذي يمر بالنقطتين:

$$\text{ص} = \frac{1}{4} \text{س} + \frac{17}{4}$$

٢ أوجد معادلة المستقيم h الموازي للمستقيم l والمار

ص	س
٦	٢
٨،٥	٣
١٣،٥	٥
١٦	٦

بنقطة الأصل. $\text{ص} = \frac{1}{4} \text{س}$

٣ في الجدول ، هل العلاقة يمكن أن تكون خطية؟ في حال الإيجاب اكتب المعادلة الخطية.

$$\text{نعم، ص} = \frac{5}{2} \text{س} + 1$$

٩ إجابات وحلول

«حاول أن تحل»

١ باستخدام: $\text{ص} - \text{ص}_1 = m(\text{س} - \text{s}_1)$

$$\text{ص} - ٥ = \frac{٢}{٣}(\text{س} + ٦)$$

$$\text{ومنه: ص} = \frac{٢}{٣} \text{س} + ١$$

١) أوجد معادلة الخط المستقيم إذا علم:
 (أ) يمر بالنقطة (٢، ٥) ويميله .٣ =
 (ب) يمر بالنقطة (٤، ٢) ويميله .٢ =
 (ج) يمر بالنقطة (١، ١) ويميله .١ =

٢) أوجد الصورة العامة لمعادلة المستقيم في كل من الأشكال التالية:
 (أ) (ج)
 (ب) (د)
 (ج) (ه)

٣) أوجد الصورة العامة لمعادلة المستقيم الذي يمرّ بالنقطتين في كل من:
 (أ) (٥، ٤)، (٣، ٧).
 (ب) (٣، ٤)، (١، ٧).

٤) أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة (٧، ١) والعمودي على الخط المستقيم: $\text{ص} + ٢ = ١ - \text{س}$.

٥) أوجد معادلة المستقيم المتعامد مع المستقيم: $\text{ص} = -٢\text{س} + ٤$ ويمر بالنقطة (٣، ٣).

٦) أوجد معادلة المستقيم الموازي مع المستقيم: $\text{ص} = -\frac{١}{٤}\text{س} + ١٧$ ويمر بنقطة الأصل.

٨٤

٢) الميل = $\frac{(1-2)}{3-2} = \frac{-1}{1} = -1$, ص - ص₁ = م(س - س₁)

نأخذ إحدى النقاط فيكون ص - ص₁ = 0

٣) ميل المستقيم ك = $-\frac{1}{3}$

لذا يكون ميل المستقيم م = $-\frac{1}{3}$

نأخذ المعادلة: ص - ص₁ = م(س - س₁)

ص - 2 = $-\frac{1}{3}(s + 3)$

ومنه ص = $-\frac{1}{3}s + 1$

(ب) ميل المستقيم ز العمودي على ك يساوي 3

نأخذ المعادلة: ص - ص₁ = م(س - س₁)

ص - 3 = 4(s - 1)

ومنه ص = 3s + 1

٤) $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{(7-3)}{(11-1)}$

$\frac{2}{5} = \frac{(3-1)}{(1-4)}$


$\frac{2}{5} = \frac{6}{15} = \frac{(1-5)}{4-19}$ من الممكن أن توجد علاقة خطية

المعادلة: ص = $\frac{2}{5}s - \frac{13}{5}$


٥) ساعة ونصف

٦) نعم من الممكن أن تكون العلاقة خطية


ص = $\frac{3}{2}s + 5$



(٤) مستقيم أفتى يمر بالنقطة (١٠، ٧).



(٥) مستقيم رأسي يمر بالنقطة $(\frac{2}{7}, 1)$.



(٦) أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطتين: (٢، ٥)، (٣، ٠).

(٧) أوجد معادلة الخط المستقيم في كل مما يلي:

(أ) يمر ب نقطة الأصل ويميله ٧.

(ب) يمر ب نقطة الأصل وبالنقطة (٤، ٣).

(ج) يقطع من الجزء الموجب لمحور السينات جزءاً طوله ٣ وحدات، ومن الجزء الموجب لمحور الصادات جزءاً طوله ٥ وحدات.

(٨) أوجد الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم المار بالنقطة (٥، ٧) والموازي للمستقيم المار بالنقطتين (٤، ٣)، (١، ٢).

٤-٩ البعد بين نقطة ومستقيم

البعد بين نقطة ومستقيم Distance Between a Point and a Straight Line

٤-٩

دعنا نفك ونتناقش

رأينا سابقاً المسافة بين النقطتين $(س، ص)$ ، $(س، ص)$ ، والقاعدة التي توجد هذه المسافة • إيجاد البعد بين نقطة ل على المثلث الثاني:

$$ل = \sqrt{(س - س)^2 + (ص - ص)^2}$$


و معادلة المستقيم هي على الصورة $ص = م + ن$ ، حيث M هي ميل المستقيم.
في هذا الدرس سوف توجد البعد بين نقطة ومستقيم حيث هو طول القطعة المستقيمة العمودية المرسمة من النقطة على المستقيم، ولكن تحدد هذه البعد نحن بحاجة إلى كتابة معادلة المستقيم على الصورة:
 $ص = م + ن$ ، حيث M ، N ، $ب$ لا يساويان الصفر معاً.

إذا كانت معادلة المستقيم على الصورة $ل: ص + ب = ٠$ فإن البعد f بين النقطة D $(س، ص)$ ، والمستقيم L تعطى بالصيغة: $f = \sqrt{س^2 + ص^2}$.

إذا كانت النقطة D تتنتمي إلى المستقيم L فالبعد بينها يساوي صفرًا.

مثال (١)

أثبت أن النقطة $H(2, 1)$ لا تتنتمي إلى المستقيم الذي معادله: $ص = س - ٤$ ، ثم أوجد البعد بين المستقيم L والنقطة H :



بالتعريض عن $(س، ص)$ في المعادلة: $ص = س - ٤$

نحصل على $٣ - س = ٢ - س$

$\# ٢ \neq ٢ \neq ٣$ لـ H لا تتنتمي إلى المستقيم.

لإيجاد البعد بين H ، L ، المستقيم يجب كتابة معادلة المستقيم L على الصورة:

$$\begin{aligned} س + ب ص + ج = ٠ \\ ل: س - ٤ = ٠ \\ ج = ٤ - س \\ ب = ٤ - س \\ ص = س - ٤ \\ \text{البعد} = \sqrt{س^2 + ب^2} \\ \frac{١}{\sqrt{١٠}} = \sqrt{\frac{|٥ - ٦|}{١٠}} = \sqrt{\frac{|٤ - ١ - ٢ \times ٣|}{١٠}} = \end{aligned}$$

٤١

• البعد يساوي $\frac{١}{\sqrt{١٠}}$ وحدة طول.

حاول أن تحل ١ أوجد البعد بين المستقيم L : $ص = س - ٣$ والنقطة $(٢, ٥)$.

مثال (٢)

أوجد البعد من النقطة $D(-٤, -٣)$ إلى المستقيم $L: ص = س - ٧$:

الحل:

نكتب أولًا معادلة المستقيم على الصورة: $س + ب ص + ج = ٠$

$$L: س - ٢ = ٧$$

$$ج = ٣ - س$$

$$ب = ٢ - س$$

$$ص = س - ٧$$

$$\text{البعد} = \sqrt{س^2 + ب^2 + ج^2}$$

$$ف = \frac{|١٣ - (-٤) - (-٣)|}{\sqrt{١٣^2 + ٢^2 + ٣^2}} = \frac{|١٣ - ٤ - ٣|}{\sqrt{١٣^2 + ٢^2 + ٣^2}} = \frac{|١٣ - ٧|}{\sqrt{١٣^2 + ٢^2 + ٣^2}} = \frac{٦}{\sqrt{١٣^2 + ٢^2 + ٣^2}}$$

أي أن البعد من النقطة D إلى المستقيم L يساوي $\frac{٦}{\sqrt{١٣^2 + ٢^2 + ٣^2}}$ وحدة طول.

حاول أن تحل ٢

أوجد البعد من النقطة $(٣, -٤)$ إلى المستقيم $L: ص = \frac{٤}{٩} س + \frac{٨}{٩}$.

٤٢

الأهداف

- إيجاد البعد بين نقطة ومستقيم.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

البعد بين نقطة ومستقيم.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة - آلة حاسبة - مثلث قائم الزاوية خشبي أو بلاستيكي - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

ارسم على السبورة مستقيمين (غير متوازيين) ونقطة A لا تتنتمي لأي منهما.

أسأل الطلاب ...

أي من المستقيمين هو أقرب إلى النقطة A ? وكيف يمكنكم معرفة ذلك؟ أشر إلى إمكانية استخدام المثلث قائم الزاوية الخشبي لمعرفة ذلك. ضع على أحد المستقيمين عدة نقاط.

أسأ لهم: أي من هذه النقاط هو الأقرب إلى A .

٥ التدريس

راجع مع الطلاب كيفية التحقق من انتهاء نقطة إلى مستقيم. أعطهم أمثلة على ذلك. استفد من المناسبة لتذكير الطلاب بنقطتي التقاطع بين المستقيم وكل من محوري الإحداثيات.

أشير إلى أن البعد بين نقطة ومستقيم هو أصغر مسافة بين النقطة وأي نقطة تتنتمي إلى المستقيم.

$$\text{رُكز على الصيغة } f = \frac{|ص - ص'|}{\sqrt{ب^2 + ج^2}}$$

أشير إلى ضرورة استخدام القيمة المطلقة لأن البعد هو عدد غير سالب. أخبر الطلاب أن قاعدة البعد بين نقطة ومستقيم مختلفة تماماً عن قاعدة المسافة بين نقطتين.

أعط الطالب المعادلة: $س - ص + 4 = 0$ والنقطتين $(1, 5)$, $(2, 3)$ واطلب إليهم العمل أزواجاً لإيجاد البعد بين كل من النقطتين A , B والمستقيم. تحقق من صحة التعويض عن S , $ص$ في المعادلة.

٦ الرابط
لا يوجد.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطالب في استخدام صيغة البعد بين نقطة ومستقيم باعتماد الصيغة $ص = مس + ب$ لمعادلة المستقيم.
أشير إلى أن صيغة البعد تعتمد على المعادلة: $مس + ب ص + ج = 0$. وأعطيهم أمثلة تبين كيفية الانتقال من $ص = مس + ب$ إلى $مس + ب ص + ج = 0$.

٨ التقسيم

راقب عمل الطالب في فقرات «حاول أن تحل» لأنها تعطيك فكرة واضحة عن تمكّنهم من الصيغة المطلوبة والتعويض الصحيح لقيم S , $ص$.

اختبار سريع

١ أثبت أن النقطة K $(1, 2)$ لا تنتمي إلى المستقيم L الذي معادلته $ص = 2س + 1$.

$$1 = 2(1) + 1 \neq 2$$

٢ أوجد البعد بين النقطة K والمستقيم L .

$$\frac{3}{5\sqrt{7}}$$

٩ إجابات وحلول

«حاول أن تحل»

١ $البعد = 2\sqrt{2}$ وحدة طول.

٢ يفضل وضع المعادلة على الصورة العامة بعد ضرب

طرف المعادلة في 6 فتصبح $-س + 6ص + 8 = 0$

ويكون البعد $= \frac{19}{3\sqrt{7}}$ وحدة طول.

٤-٩

التاريخ المجري:

البعد بين نقطة ومستقيم

Distance Between a Point and a Straight Line

المجموعة A تمارين أساسية

في التمارين (١-٤)، معادلة المستقيم L : $س - ص + 3 = 0$.
يبين ما إذا كانت النقطة تنتمي إلى المستقيم L أم لا.

(١) $(1, 2)$ (٢) $(2, 0)$
(٣) $(0, 3)$ (٤) $(4, 0)$

(٥) أوجد البعد بين النقطة $J(2, 1)$ والمستقيم: $ص - س - 1 = 0$.

(٦) أوجد البعد بين نقطة الأصل والمستقيم: $ص = 3س + 4$.

(٧) أوجد طول نصف قطر الدائرة التي مررتها $(1, 2)$ إذا كان المستقيم: $ص - 4 = 7 - س$ مماس لها.

(٨) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة $(2, 3)$ على المستقيم: $ص - 2 = 4 - س$.

(٩) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة $(4, 7)$ على المستقيم: $ص = 5 - س$.

(١٠) أوجد طول العمود المرسوم من نقطة الأصل على المستقيم المار بال نقطتين $(3, 7)$, $(5, 0)$.

٨٧

المجموعة B تمارين تعزيزية

في التمارين (١-٣)، معادلة المستقيم L : $ص = س + 1$.
يبين ما إذا كانت النقطة تنتمي إلى المستقيم L أم لا.

(١) $(3, 3)$ (٢) $(0, 2)$ (٣) $(1, 4)$

(٤) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة $(4, 5)$ على المستقيم: $ص = 4 - س$.

(٥) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة $(8, 0)$ على المستقيم: $ص = 12 - س$.

(٦) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة $(2, 7)$ على المستقيم $(1, 5)$.

(٧) أوجد بعد النقطة $(4, 4)$ عن المستقيم المار بنقطة الأصل وميله $\frac{3}{5}$.

(٨) أوجد أقصى مسافة من النقطة $(4, 4)$ إلى المستقيم المار بال نقطتين $(2, 0)$, $(0, 2)$.

٨٨

٥-٩ معادلة الدائرة

معادلة الدائرة Equation of a Circle

٥-٩

دعا نفكّر ونتناقش

إذا كان لديك قطعة من الجيل طولها ٦ أمتار، وأردت أن ترسم دائرة في فناء المدرسة، فما الذي سيفعله؟ تكرّم زملائك.

هذا سيؤدي إلى تعريف الدائرة.

الدائرة هي مجموعة النقاط التي تكون على بعد ثابت من نقطة معلومة، والنقطة المعلومة تسمى مركز الدائرة.

معادلة ماس الدائرة هي العلاقة بين دائرتين في المستوى.

الصورة القياسية لمعادلة الدائرة:

لأي دائرة مرکزها (d, h) ، وطول نصف قطرها في فإن المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة (x, y) على الدائرة يمكن إيجادها باستخدام قانون المسافة بين نقطتين.

$$\text{المسافة} = \sqrt{(x - d)^2 + (y - h)^2}$$

$$= \sqrt{(x - 3)^2 + (y - 2)^2}$$

$$= \sqrt{(x - 3)^2 + (y - 2)^2}$$

$$= \sqrt{(x - 3)^2 + (y - 2)^2}$$

وعلى ذلك، تكون معادلة الدائرة التي مرکزها (d, h) ، وطول نصف قطرها في على الصورة:

$$(x - d)^2 + (y - h)^2 = r^2$$

وتستوي هذه الصورة القياسية لمعادلة الدائرة بمعنوية المركز (d, h) ، وطول نصف القطر r .

مثال (١)

أوجد معادلة الدائرة التي مرکزها $(3, -2)$ ، وطول نصف قطرها ٧ وحدات.

الحل:

معادلة الدائرة على الصورة القياسية: $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 49$ ، حيث (d, h) مرکزها
بالتعريض عن (d, h) يعطى $(3, -2)$.

حاول أن تحل

أوجد معادلة الدائرة التي مرکزها $(5, -3)$ ، وطول نصف قطرها ٥ وحدات.

٤٣

١ الأهداف

- يكتب معادلة الدائرة بالصورة القياسية.
- يكتب معادلة الدائرة بالصورة العامة.
- يعين المركز وطول نصف القطر من الصورة العامة لمعادلة الدائرة.
- يكتب معادلة ماس على الدائرة.
- يوجد العلاقة بين دائرتين في المستوى.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

معادلة دائرة بالصورة القياسية – معادلة دائرة بالصورة العامة – معادلة ماس على الدائرة – شروط تقاطع دائرتين في المستوى – تمس الدائرتين – تداخل الدائرتين – تباعد دائرتين.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة – فرجار – ورق رسم بياني – آلة حاسبة – حاسوب – جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

أسأل الطلاب:

(أ) ما هي الدائرة؟

(ب) ما قياس الزاوية بين الماس ونصف القطر عن نقطة تقاطعهما على الدائرة؟

(ج) ما قاعدة المسافة بين نقطتين في المستوى الإحداثي؟

(د) ما قاعدة البعد بين نقطة ومستقيم في المستوى الإحداثي؟

(ه) اكتب المعادلين: $x^2 + y^2 = 25$ ، $x + 10 = 0$

$4x^2 + 12x + 9 = 0$ على صورة مربعين كاملين.

٥ التدريس

تعتبر معادلة الدائرة بالصورة القياسية:

$(x - d)^2 + (y - h)^2 = r^2$ ، بسيطة إذ لا يحتاج الطالب سوى إلى إحداثيات المركز (d, h) وطول نصف قطر الدائرة

مثال (٢)

أوجد معادلة دائرة قطرها \overline{AB} حيث $A(4, -2)$ ، $B(2, 4)$.

الحل:

نوجد أولًا إحداثيات مركز الدائرة والتي هي منتصف \overline{AB} أي $\left(\frac{4+2}{2}, \frac{-2+4}{2}\right) = (3, 1)$.

نوجد طول نصف قطر الدائرة $\frac{1}{2}AB$.

$$= \frac{1}{2}\sqrt{(4-2)^2 + (-2-4)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{4+36} = \frac{1}{2}\sqrt{40} = \frac{1}{2}\sqrt{4 \cdot 10} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{10} = \sqrt{10}$$

معادلة الدائرة:

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$$

حاول أن تحل

أوجد معادلة دائرة قطرها \overline{AB} حيث $A(-3, 2)$ ، $B(-1, 4)$.

إذا كان في طول نصف قطر الدائرة التي مرکزها نقطة الأصل، فإن معادلتها على الصورة: $x^2 + y^2 = r^2$.

مثال (٣)

أوجد معادلة الدائرة التي مرکزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها ٤ وحدات.

الحل:

إذا فرضنا نقطة مثل (x, y) على الدائرة، فإن $x^2 + y^2 = 16$ = ٤ وحدات،

معادلة الدائرة التي مرکزها نقطة الأصل: $x^2 + y^2 = 16$ = ٤ وحدات.

حاول أن تحل

أوجد معادلة الدائرة التي مرکزها نقطة الأصل وطول قطرها ٦ سم.

٤٤

نها، ثم إلى تطبيق قاعدة المسافة بين نقطتين، واحدة (س، ص) متحركة أينما كانت على الدائرة ومركز الدائرة الذي هو نقطة ثابتة كما في المثالين (١) و (٢). وبالعكس، إذا كان لدينا الصورة القياسية لمعادلة الدائرة. كما ويمكن أيضاً ببساطة إيجاد إحداثيات مركزها وطول نصف قطرها كما في المثال (٤).

شدّد على الصورة العامة لمعادلة الدائرة حيث يجب الانتباه إلى تحويل كل من التعبيرين س، ص إلى مربع كامل للحصول على الصورة القياسية. قدم أمثلة متنوعة ومتعلقة لربط الصورة العامة بالصورة القياسية.

اشرح لهم أن $s^2 + l^2$ هو التعبير الذي سيأخذ الشكل $(s - d)^2 + (l - h)^2$ ، وأن $s^2 + k^2$ هو التعبير الذي سيأخذ الشكل $(s - d)^2 + (k - h)^2$. أخبرهم أنهم قد يواجهون مشاكل في الصورة، بحيث إنهم لن يحصلوا على معادلة دائرة إذا كانت القيمة بعد المساواة سالبة عند تحويلها إلى الصورة القياسية.

رسّخ لدى الطلاب فكرة أن معاملي s^2 ، l^2 يجب أن تكون متساوية، كما أنه لا يجب أن يكون في الصورة العامة حداً يشمل $s \times l$.


اشرح لهم أن معادلة عامة على شكل: $m s^2 + m l^2 + n s + k l + p = 0$ ($m \neq 0$)، يمكن أن تكون معادلة دائرة، وذلك بالقسمة على m فنحصل على المعادلة:

$$s^2 + l^2 + \frac{n}{m} s + \frac{k}{m} l + \frac{p}{m} = 0$$

تعامل مع الطلاب بروية في المثال (٥)، لأنه يتحقق شروط كثيرة من المعادلة بالصورة العامة وصولاً إلى المعادلة بالصورة القياسية.

في المثال (٨)، أكد للطلاب أن معادلة المماس للدائرة سوف تتناول في هذا الدرس حالة واحدة، وهي عندما تكون نقطة على الدائرة، نرسم من هذه النقطة المماس، وهو سوف يكون عمودياً على نصف القطر المار بهذه النقطة، لذا يمكن تطبيق شروط المستقيمين المتعامدين.

لدراسة تقاطع دائرتين في المستوى الإحداثي، أوجد المسافة بين مركزي الدائرتين باستخدام قاعدة المسافة بين نقطتين، ثم قارن هذه المسافة بمجموع طولي نصف القطر للدائرتين، كما هو موضح في الجدول من كتاب الطالب ص ١٥١.




مثال (٤) تطبيقات حياتية

في حديقة، زرعت مجموعة من الأزهار على شكل دائرة مركزها (٣، ٤)، يبعد إن كل زهرة تبعد ٤ وحدات عن المركز. اكتب معادلة الدائرة التي تتواءل عليها مجموعة الأزهار.

الحل:
معادلة الدائرة على الصورة القياسية: $(s - 3)^2 + (l - 4)^2 = r^2$
 $(s - 3)^2 + (l - 4)^2 = 16$

حاول أن تحل

٤. أوجد معادلة الدائرة التي مركزها (٣، ٤) وتتواءل الصادات.



مثال (٥)

أوجد مركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها: $(s + 2)^2 + (l - 3)^2 = 9$ ، ثم ارسم الدائرة.

الحل:
يمقارنة معادلة الدائرة المعمدة بالصورة القياسية لمعادلة الدائرة:
 $(s - d)^2 + (l - h)^2 = r^2$
نجد أن: $d = -2$ $\lll 2 = -d$
 $h = 3$ $\lll 3 = h$
 $r^2 = 9$ $\lll 3 = r$
مركز الدائرة (-٢، ٣) وطول نصف قطر الدائرة = ٣ وحدات.

حاول أن تحل

٥. أوجد مركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها:

١. $(s + 5)^2 + (l - 4)^2 = 36$

٢. $(s - 4)^2 + (l + 5)^2 = 36$

١٤٥

الصورة العامة لمعادلة الدائرة

معادلة الدائرة التي مركزها (د، ه) وطول نصف قطرها تكتب على الصورة التالية: $(s - d)^2 + (l - h)^2 = r^2$
وبال Folk تحصل على الصورة التالية: $s^2 + l^2 - 2ds - 2hl + d^2 + h^2 - r^2 = 0$

بوضع $L = -2d$ ، $K = -2h$ ، $B = d^2 + h^2 - r^2$ تصبح صورة المعادلة:
 $s^2 + l^2 + Ls + Kl + B = 0$ ، حيث $L = -2d$ ، $K = -2h$ ، $B = d^2 + h^2 - r^2$

وتسمى الصورة العامة لمعادلة الدائرة التي مركزها $(\frac{-L}{2}, \frac{-K}{2})$


طول نصف قطرها $r = \sqrt{\frac{L^2 + K^2 + 4B}{4}}$ حيث $L = -2d$ ، $K = -2h$ ، $B = d^2 + h^2 - r^2$

الصورة العامة: $s^2 + l^2 + Ls + Kl + B = 0$ هي معادلة دائرة ونلاحظ التالي:

١. إنها معادلة من الدرجة الثانية في س، ص.

٢. معامل s^2 = معامل l^2 .

٣. لا يوجد الحد الذي يتضمن س، ص.




مثال (٦)

عن مركز وطول نصف قطر الدائرة الممثلة بالمعادلة: $s^2 + l^2 - 6s - 9l - 12 = 0$:

الحل:
 $s^2 + l^2 - 6s - 9l - 12 = 0$
وهي معادلة دائرة على الصورة العامة
 $s^2 + l^2 - 2s - 3l - 12 = 0$
 $(s - 3)^2 + (l - 2)^2 = 25$
المركز = $(\frac{-L}{2}, \frac{-K}{2}) = (\frac{-(-6)}{2}, \frac{-(-9)}{2}) = (3, 2)$
 $r^2 = \frac{25}{4}$
 $r = \frac{5}{2}$

١٤٦



٦ الرابط

يوفر المثال (٤) فرصة كبيرة للربط بين الدائرة واستخداماتها، كما أن الدوالib في الدرجات الهوائية والنارية خير أمثلة على الرابط بالدائرة.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطالب في التحقق من انتهاء النقطة على الدائرة.
قد يخطئ الطالب في الشروط الواجب توافرها في الصورة العامة لمعادلة الدائرة.

ساعدهم بأمثلة تبيّن تحقيق المساواة في معادلة الدائرة عند التعويض بقيم s , c .

٨ التقسيم

لاحظ بعناية ما يقوم به الطالب في فقرات «حاول أن تحل» وما إذا كانوا قادرين على الإجابة بطريقة توضح مدى فهمهم لها.

اختبار سريع

١ هل المعادلة $s^2 + c^2 - 4s + 2c - 4 = 0$ تمثل دائرة؟
في حالة الإيجاب عين مركزها وطول نصف قطرها.

نعم المركز (٢، ١)، $s = 3$

٢ أوجد معادلة الدائرة التي مركزها (١، ٢) وتمر بالنقطة (٥، ٥). $(s - 1)^2 + (c - 2)^2 = 17$

٣ أوجد معادلة مماس دائرة معادلتها:

$(s - 4)^2 + (c - 2)^2 = 10$ عند نقطة التماس $(s - 5, c - 3)$. $s = 12, c = 0$


معادلة مماس دائرة
يسعى وتبين لنا أن نصف قطر الدائرة عمودي على مماس الدائرة عند نقطته التماس.
باستخدام هذه الخاصية، تستطيع إيجاد معادلة مماس الدائرة.



Tangent to a Circle

معادلة مماس دائرة

يسعى وتبين لنا أن نصف قطر الدائرة عمودي على مماس الدائرة عند نقطته التماس.



٤ أوجد معادلة مماس دائرة معادلتها: $(s - 1)^2 + (c - 2)^2 = 5$ عند نقطة التماس $(1, 3)$.
الحل:
النقطة $(1, 3)$ تنتمي إلى الدائرة.
إحداثيات مركز الدائرة $(1, 2)$.
 $\text{ميل } \frac{3-2}{1-1} = \infty$.
نصف قطر التماس وعمودي على مماس الدائرة.
 $\therefore \text{ميل التماس} \times \text{ميل } \frac{1}{2} = -1$.
 $\therefore \text{الميل } = -\frac{1}{2}$.

٥

٩ إجابات وحلول «حاول أن تحل»

١ $(س - ٢) + (٣ + ص) = ٢٥$

٢ إحداثيات مركز الدائرة: (١، ٢)

$$\text{نـ} = \frac{1}{2} \sqrt{64 + 16} = \frac{1}{2} \sqrt{80}$$

معادلة الدائرة: $(س - ٢)^٢ + (ص - ١)^٢ = ٢٠$

٣ $س^٢ + ص^٢ = ٩$

٤ $(س - ٣)^٢ + (ص - ٤)^٢ = ٩$

٥ (أ) المركز (٠، ٠)، نـ = ٧

(ب) (٤، ٥)، نـ = ٦

المركز (١، ٣)، نـ = ٥

١ نـعرف أن نصف قطر النـمس \overline{AO} هو عمودي على النـمس عند النقطة O .
 لكن $m\angle \text{نـمس} = 1 - m\angle \text{نـ} = 1 - \frac{3}{4}m = \frac{1}{4}m$.
 أي $\frac{1}{4}m = 1 - m\angle \text{نـ}$ ومنه $m\angle \text{نـ} = \frac{4}{5}(س - ص)$.
 نـأخذ المعادلة: $ص - نـ = \frac{4}{5}(س - ص)$.
 $ص - \frac{4}{5}س = \frac{4}{5}ص$
 $\therefore \text{معادلة النـمس} ص = \frac{4}{3}س - ١٢$.

حاول أن تحل

٢ أثبتت أن النقطة O تنتهي إلى الدائرة التي يـمر بـها مركزها، معادلتها: $س^٢ + ص^٢ + ٦س + ١٦ = ٠$ ، ثم أوجد معادلة النـمس لهذه الدائرة عند هذه النقطة.


١٥٠

الربط بالتعلم السابق


Intersection of Two Circles

معلومة:
عندما تكتب الدائرة $(أ، نـ)$ فهـذا يعني أن $أ$ يـمر بـها و $نـ$ هي نصف قطرها.

معلومة بـاضـطة:
متباينة المـيل في كل مثلث، طول أي ضلع أصغر من مجموع طولي الضلعـين الآخـرين وأكـبر من الفـرق بين طولـيهـما.



في الشـكل، الدـائـران $(أ، نـ)$ ، $(ب، نـ)$ ، $(أ، ب)$ ، $(نـ، ب)$ ، $(نـ، أ)$ تـقـاطـعـانـ في جـ، دـ.



لـدرـاسـةـ الـعـلـاقـةـ بـيـنـ دـائـرـاتـ $(أ، نـ)$ ، $(ب، نـ)$ ، $(أ، ب)$ ، $(نـ، ب)$ ، $(نـ، أ)$ نـسـتـخـدـمـ متـباـيـنةـ المـيلـ.

إـنـ مـقـارـنةـ الـعـدـدـ بـيـنـ مـرـكـزـيـنـ دـائـرـاتـ $أ$ و $ب$ طـوـلـيـنـ نـصـفـيـنـ قـطـرـيـنـ دـائـرـاتـ $(أ، نـ)$ و $(ب، نـ)$ يـحدـدـ مـوـقـعـ دـائـرـاتـ $(أ، ب)$ و $(نـ، ب)$ كـمـاـ هـوـ مـبـيـنـ فـيـ جـدولـ الثـالـثـيـ:

		الشكل	العلاقة بين دـائـرـاتـ $(أ، نـ)$ و $(ب، نـ)$	العلاقة بين دـائـرـاتـ $(أ، ب)$ و $(نـ، ب)$
البعـدـ بـيـنـ مـرـكـزـيـنـ $أ$ و $ب$ منـجـمـوعـ طـوـلـيـنـ نـصـفـيـنـ قـطـرـيـنـ	أـنـ $ أـب > أـنـ + نــب $	١٠	الـدائـرـاتـ $(أ، نـ)$ و $(ب، نـ)$ تـقـاطـعـانـ فيـنـتـقـاطـعـانـ مـخـالـقـانـ	$ أـب > أـنـ + نــب $
ـمـعـدـدـ بـيـنـ مـرـكـزـيـنـ $أ$ و $ب$ مـجـمـوعـ طـوـلـيـنـ نـصـفـيـنـ قـطـرـيـنـ	ـمـعـدـدـ بـيـنـ مـرـكـزـيـنـ $أ$ و $ب$ مـجـمـوعـ طـوـلـيـنـ نـصـفـيـنـ قـطـرـيـنـ	١٠	الـدائـرـاتـ $(أ، نـ)$ و $(ب، نـ)$ مـتـمـاسـانـ خـارـجـيـ	$ أـب = أـنـ + نــب $
ـمـعـدـدـ بـيـنـ مـرـكـزـيـنـ $أ$ و $ب$ مـجـمـوعـ طـوـلـيـنـ نـصـفـيـنـ قـطـرـيـنـ	ـمـعـدـدـ بـيـنـ مـرـكـزـيـنـ $أ$ و $ب$ مـجـمـوعـ طـوـلـيـنـ نـصـفـيـنـ قـطـرـيـنـ	١٠	الـدائـرـاتـ $(أ، نـ)$ و $(ب، نـ)$ مـتـمـاسـانـ دـاخـلـيـ	$ أـب = أـنـ - نــب $
ـمـعـدـدـ بـيـنـ مـرـكـزـيـنـ $أ$ و $ب$ مـجـمـوعـ طـوـلـيـنـ نـصـفـيـنـ قـطـرـيـنـ	ـمـعـدـدـ بـيـنـ مـرـكـزـيـنـ $أ$ و $ب$ مـجـمـوعـ طـوـلـيـنـ نـصـفـيـنـ قـطـرـيـنـ	١٠	الـدائـرـاتـ $(أ، نـ)$ و $(ب، نـ)$ لـتـقـاطـعـانـ (متـبـاـيـنةـ)	$ أـب < أـنـ + نــب $
ـمـعـدـدـ بـيـنـ مـرـكـزـيـنـ $أ$ و $ب$ مـجـمـوعـ طـوـلـيـنـ نـصـفـيـنـ قـطـرـيـنـ	ـمـعـدـدـ بـيـنـ مـرـكـزـيـنـ $أ$ و $ب$ مـجـمـوعـ طـوـلـيـنـ نـصـفـيـنـ قـطـرـيـنـ	١٠	الـدائـرـاتـ $(أ، نـ)$ و $(ب، نـ)$ لـتـقـاطـعـانـ (متـبـاـيـنةـ)	$ أـب > أـنـ - نــب $

١٥١

٦ معادلة النـمس $(أ، نـ)$ و $(ب، نـ)$ و $(نـ، نـ)$ هي:

$$ص - نـ = ٢$$

$$ص - نـ = ٢$$

$$ص - نـ = ٢$$

$$\therefore \text{معادلة النـمس} ص = ٢ - نـ$$

حاول أن تحل

أـنـجـ معـادـلـةـ دـائـرـةـ معـادـلـهـاـ (س - ٢)^٢ + (ص - ١)^٢ = ٢٥ عـنـدـ النـقطـةـ (٦، ٦).

مثال (٤)

أـثـبـتـ أـنـ النـقطـةـ (٦، ٦) تـنـتـيـ إلىـ دـائـرـةـ التيـ يــمرـ بــهاـ مـرـكـزـهـ (٠، ٠)، معـادـلـهـاـ (س + ٤)^٢ + (ص + ٤)^٢ = ٢٠، ثـمـ أـجـدـ مـعـادـلـةـ دـائـرـاتـ لهـذـهـ دـائـرـةـ عـنـدـ هـذـهـ النـقطـةـ.

الـحلـ:

$$س + ٤ = ٢٠ - ص + ٤$$

الـمـعـادـلـةـ عـلـىـ كـلـ الصـورـةـ الـعـامـةـ لـمـعـادـلـةـ دـائـرـةـ حـيـثـ لـ = ٤، كـ = ٢، بـ = ٢٠ -

$$+ (٤ - ٤) + (٦ - ٦) = ٢٤$$

$$+ ٢٤ - ٨ = ١٦$$

$$+ ٣٦ = ٥٢$$

$$\therefore \text{الـنـقطـةـ (٦، ٦) تـنـتـيـ إلىـ دـائـرـةـ.}$$

مركز دـائـرـةـ (٢، ٠)، طـوـلـ نـصـفـ قـطـرـهـ: نـ = $\sqrt{\frac{٥٢}{٤}} = \sqrt{١٣}$

$$= \sqrt{١٣}$$

مـيلـ نـصـفـ قـطـرـ النـمسـ \overline{AO} : $m = \frac{ص - نـ}{س - س}$

$$= \frac{-٤ - ٦}{٠ - ٠} = -١$$

١٤٩

(أ) معامل s^2 = معامل c^2 = ١

$$l = -4, k = 7, b = 17$$

$$l^2 + k^2 - 4b = 30$$

المعادلة لا تمثل معايير دائرة.

(ب) معامل s^2 = معامل c^2 = ١

$$l = 5, k = 6, b = -4$$

$$l^2 + k^2 - 4b = 16 + 36 + 25 = 77$$

المعادلة تمثل معايير دائرة.

(ج) معامل s^2 = معامل c^2 = ١

$$l = -2, k = 2, b = 2$$

$$l^2 + k^2 - 4b = 8 - 4 + 4 = 8$$

إذاً المعادلة تمثل نقطة.

٥-٩

التاريخ المجري: التاريخ المجري:

معادلة الدائرة

Equation of a Circle

المجموعة ٤ تمارين أساسية

(١) حدد ما إذا كانت المعادلات التالية، معادلة دائرة أم لا.

$$(1) s^2 + c^2 = 4$$

$$(2) (s - 1)^2 + (c + 7)^2 = 4$$

$$(3) s^2 + c^2 - 2s - 2c = 8$$


$$(4) s^2 + c^2 - 2s - 2c = 7$$

(٢) أوجد معادلة كل من الدوائر الآتية إذا علم:


$$(1) \text{ المركز } (0, 0) \text{ وطول نصف قطر} = 3$$

$$(2) \text{ المركز } (4, 0) \text{ وطول نصف قطر} = 2$$

(٣) اكتب معادلة كل دائرة في كل من الأشكال التالية:




(a)




(b)

أوجد طول نصف قطر كل من الدوائر الآتية، وكذلك إحداثياتي مركز كل دائرة:



(a)



(b)

٨٩

(٥) محور السينات هو ماس للدائرة عند النقطة $(-3, 0)$ ، ومركز الدائرة هو $(-4, 4)$. أوجد معادلة هذه الدائرة.

في التمارين (٦-٨)، أوجد مركز وطول نصف قطر كل من الدوائر ذات المعادلات التالية:

$$(6) s^2 + c^2 - 8s - 8c = 0$$

$$(7) s^2 + c^2 - 16s - 17c = 0$$


$$(8) s^2 + c^2 - 20s - 20c = 0$$

(٩) أوجد معادلة ماس دائرة، معادلتها: $(s - 2)^2 + (c + 8)^2 = 64$ عند النقطة $(2, 0)$.


(١٠) أوجد معادلة الدائرة التي مر كرها $(3, 2)$ ، ومس محور الصادات عند النقطة $(0, 2)$.

المجموعة ب تمارين تعزيزية


(١) أوجد طول نصف قطر كل من الدوائر التالية:



(a)



(b)



(c)

(٢) أوجد معادلة كل من الدوائر الآتية إذا علم:

$$(1) \text{ المركز } (0, 3) \text{ وطول نصف قطر} = 7$$

$$(2) \text{ المركز } (-4, 0) \text{ وطول نصف قطر} = 3$$

٩٠


$$8 \quad ٤س + ٣ص - ٠ = ٣٦$$

$$9 \quad ٠ = ١٦ - ١ \times ٨ + ١ \times ٦ + ٢١ + ٢١$$

\therefore أنتهي إلى الدائرة.

معادلة المماس: $٤س + ٥ص - ٠ = ٩$

(٣) اكتب معادلة كل دائرة في كل من الأشكال التالية:



(٤) اكتب معادلة كل دائرة حيث:

(أ) المركز $(٤, ٠)$ وعمر بالنقطة $(٣, ٣)$.

(ب) المركز $(١, ٥)$ وعمر بالنقطة $(١, ٦)$.

في التمرين (٦-٥)، أوجد مركز وطول نصف قطر كل من الدوائر التالية:

$$(٥) س^٢ + ص^٢ - ٤س - ٨ص = ٠$$


$$(٦) س^٢ + ص^٢ - ٢س - ٢ص = ١٦ - ٠$$

(٧) أوجد معادلة مماس دائرة معادلتها $(س - ١)^٢ + (ص + ٢)^٢ = ١٠$ عند النقطة $(٢, ١)$.

(٨) طول قطر الدائرة التي معادلتها $(س - ١)^٢ + (ص + ١)^٢ = ٤$ هو:

$$١٦ - (١)^٢ - (٢)^٢ = ٤$$

$$(٩) أوجد مركز الدائرة المارة ببرؤوس المثلث أب ج.$$



٩١


المرشد لحل المسائل

إجابة «مسألة إضافية»

مركز الخوض $(1, 2)$ ، نصف قطره $r = 3$ م.

نصف القطر مع الرمل $3, 5$ م.

المعادلة: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$



وجد جسم هذه المسألة:

أدى ذلك حركة في بركة ماء إلى تشكيل موجات دائرية يتراوح طول نصف قطرها بعده 6 سم/ثانية.

بعد كم ثانية تصل هذه الموجات إلى مركز صغير كان على مسافة 2 متراً شرقاً ومتراً واحداً شمالاً من مركز الموجة الأولى.

أوجد معادلة الدائرة التي تصل إلى المركز.

كيف تذكر جسم حل المسألة؟

سوف أشيء مخطط للمسألة: لكن و مركز الموجة النقطة A تبعد 2 متراً شرق المركز ،

النقطة B تبعد 1 متراً واحداً إلى شمال النقطة A .

لكي أحصل على الزمن:

أجد المسافة ووب من مركز الموجة الأولى إلى المركز.

أقسم المسافة على السرعة 6 سم/ثانية.

استخدم قاعدة دائرة لأجد معادلتها.

التطبيق:

سأستخدم نظرية فياغورث على المثلث واب القائم في $\triangle AOB$ ، $(AO)^2 + (OB)^2 = (AB)^2$

$$1^2 + 2^2 = 5^2$$

$$(AO)^2 = 5$$

$$AO = \sqrt{5}$$

سأستخدم قاعدة الزمن = $\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$

$$\text{الزمن} = \frac{5}{6} \text{ م} = 0.83 \text{ م}$$

$$\text{الزمن} = \frac{6}{6} \text{ سم/ثانية} = 1 \text{ سم/ثانية}$$

$$\text{الزمن} = 37 \text{ ثانية.}$$

معادلة الدائرة التي يمر بها O و A ونصف قطرها $\sqrt{5}$ هي:

$$x^2 + y^2 = 5$$


سؤال إضافي:

خوض زهور داري الشكل، تندمج دائرة بالمعادلة: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$ (طول نصف القطر بالأستار).

إذا أخذنا الخوض بالرمل بسماكة متساوية 5 سم، فأوجد طول نصف قطر الشكل الجديد ومعادلته.

١٥٢

مخطط تنظيمي للوحدة التاسعة



١٥٣

مراجعة الوحدة التاسعة

- (١) أوجد قيمة ص إذا كانت النقطة $(1, ص)$ تبعد وحدة واحدة عن النقطة $(0, 1)$.
- (٢) أوجد النقاط $(1, ص)$ التي تبعد $\sqrt{7}$ وحدة عن النقطة $(0, 1)$.
- (٣) إذا كان المستقيم: $4س - 4 = ص$, حيث ثابت $6س + 3 = ص + 2 = 0$ متعامدین، فما هي قيمة $؟$
- (٤) يمر مستقيم بال نقطتين: $(-3, 4)$, $(4, 4)$ ومستقيم آخر بال نقطتين: $(9, -8)$, $(4, -1)$. هل المستقيمان متوازيان أم متعامدان؟
- (٥) إذا كان المستقيم $2س - 3 = 10 = مماس لدائرة مركزها (2, 4)$. أوجد معادلة هذه الدائرة.
- (٦) أوجد ميل مثلث فيه $(2, 3)$, $(8, 7)$, $(-2, 5)$. دوّن ميل من الداخل من جهة ب بالنسبة 2 .
- (٧) أوجد إحداثي د.
- (٨) أوجد معادلة $أب$.
- (٩) لتكن معادلة $أب$ هي: $5س - ص + 2 = 0$, اختر نقطة تقع على $أب$ ولكن $ج$ (٢٠).
- (١٠) أوجد معادلة المستقيم المعمودي على $أب$ ويرت梓 على النقطة $ج$.
- (١١) أوجد ميل مثلث فيه $(4, 3)$, $(8, 5)$, $(-2, 7)$ يوازي محور السينات، $ج$ يوازي محور الصادات.
- (١٢) أثبت أن $أب$ ج قائم الزاوية في ج.
- (١٣) في السؤال (١)، أثبت أن $أب$ ج قائم الزاوية في ج.

٩٢

- (٤) أثبت أن $أب$ ج مثلث، إحداثيات رؤوسه على الترتيب هي: $(8, 11)$, $(12, 5)$, $(3, 5)$ ، ق متصف $أب$ ، ك متصف $أج$.
- (٥) أثبت أن $أب$ ج.
- (٦) أثبت أن $أب$ ج.
- (٧) أثبت أن $أب$ ج.
- (٨) أثبت أن $أب$ ليس عمودياً على ج.

٩٣

ملخص

- المسافة بين نقطتين A , B على محور السينات تساوي القاعدة المطلقة لفرق بين إحداثيات نقطتين.
- المسافة المائلة بين نقطتين $(س, ص)$, $(س', ص')$, $A = \sqrt{(س - س')^2 + (ص - ص')^2}$.
- إذا كانت $أب$ قطعة مستقيمة بحث $(س, ص)$, $(س', ص')$, فإن نقطة منتصف $أب$ هي $\left(\frac{س+س'}{2}, \frac{ص+ص'}{2}\right)$.
- تقسيم $أب$ من الداخل من جهة M بنسبة N , J (M , $ص$) نقطة التقسيم حيث: $\frac{M}{N} = \frac{س-س'}{ص-ص'}$.
- تقسيم $أب$ من الخارج من جهة M بنسبة N , J (M , $ص$) نقطة التقسيم حيث: $\frac{M}{N} = \frac{س-س'}{-ص+ص'}$.
- ميل الخط المستقيم $أب$ هو $\frac{ص-ص'}{س-س'} = \frac{ص'-ص}{س'-س}$.
- ميل الخط المستقيم $أب$ هو $\frac{ص-ص'}{س-س'} = \frac{ص'-ص}{س'-س}$.
- ميل الخط المستقيم متساوي ظل الزاوية θ التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات: $m = \tan \theta$.
- إذا كان $أب$ / $جـ$ فإن ميل $أب$ متساوي ميل $جـ$ وبالعكس.
- معادالة الخط المستقيم بعمومية الميل (m) والجزء المقطع من محور الصادات $ص = مس + ن$.
- طول العمود النازل من النقطة $(س, ص)$ على المستقيم (m) وعمادته M $+ ب$ $ص + ج = 0$ هو: $F = \frac{|ص - ص'|}{\sqrt{1 + ب^2}}$.
- معادالة الدائرة التي يمر بها (d, h) وطول نصف قطرها r : $(س - d)^2 + (ص - h)^2 = r^2$.

١٥٤

- الصورة العامة لمعادلة الدائرة: $س^2 + ص^2 + لس + كص + ب = 0$ حيث l , k , b ثوابت وحيث إن مركز الدائرة $(-\frac{l}{2}, -\frac{k}{2})$, $r = \sqrt{\frac{l^2}{4} + \frac{k^2}{4} - 4b}$ حيث $l + k - 4b > 0$.
- لدراسة العلاقة بين دائرين متقاطعين يستخدم ميتابة المثلث.
- لإيجاد ميل المماس عند نقطة على دائرة نستخدم العلاقة: ميل المماس \times ميل ش = -1.

١٥٥

تمارين إثرائية


(١) لتأخذ النقطة و(٠،٠)، (١،٣)، (٢،٣) أوجد:

(أ) معادلة المصف المعمودي لـأ، لـب.

(ب) معادلة الدائرة التي تمر بالنقطات أ وـ ب.

(ج) معادلة الماس على الدائرة في النقطة ب.

(٢) د دائرة معادلتها: $s^2 + c^2 - 6s - 2c + 15 = 0$ ، م مستقيم معادلته: $4s + 3c = 0$.



(أ) ارسم الدائرة والمستقيم في المستوى الإحداثي نفسه.

(ب) ارسم الماسين م، د للدائرة د والمتواريان مع المستقيم م.

(ج) أوجد معادلة المستقيم م الذي يمرّ بمركز الدائرة د ومتعمد مع المستقيم م.

(د) أوجد إحداثيات نقاط التناطح أ، ب للدائرة د والمستقيم م.

(ه) أوجد معادلتي الماسين م، د.

(٣) أوجد معادلة الدائرة التي مرّ بها نقطة الأصل وقى المستقيم: $3s - 4c + 16 = 0$.

(٤) أوجد معادلة الدائرة التي مرّ بها النقطة (-١، ٣) وقى المستقيم: $3s - 6c + 10 + 0 = 0$.

(٥) أوجد معادلة الدائرة التي مرّ بها (٢، ٠) وقى المستقيم الذي معادلته $c = -\frac{3}{4}s + \frac{11}{4}$.

Statistic and Probability

الوحدة العاشرة: الإحصاء والاحتمال

قسمت الدروس في هذه الوحدة إلى أجزاء.

١٠ - ١: تحليل البيانات

جزء ١: إيجاد مقاييس النزعة المركزية: المتوسط الحسابي - الوسيط - المتوسط.

جزء ٢: استخدام هذه المقاييس في تحليل البيانات.

١٠ - ٢: الأربعيات

جزء ١: المدى.

جزء ٢: الأربعيات: الأدنى، الأوسط، الأعلى، مجمل الأعداد الخمسة.

جزء ٣: الصندوق ذو العارضتين.

١٠ - ٣: الانحراف المعياري

جزء ١: التباين والانحراف المعياري.

١٠ - ٤: طرق العد

جزء ١: حل مسائل العد - الشجرة البيانية.

جزء ٢: استخدام قوانين التباديل أو التوافق.

١٠ - ٥: الاحتمال المشروط

جزء ١: الحدث المستقل.

جزء ٢: الحدث التابع.

جزء ٣: إيجاد الاحتمال المشروط.

مقدمة الوحدة

الوحدة
العاشرة

مشروع الوحدة: اختبار وظيفة

١ مقدمة المشروع: هل تحلم بمتابعة دراستك الجامعية؟ أو شراء سيارة؟ أو امتلاك منزل؟ أو تنفيذ مشروع يؤمن لك مستقبلاً زاهراً؟
أسئلة كثيرة تعبر حسناً في مخيلتك، ولكن كيف تجيب عنها؟
إن التفكير بادخار مبلغ من المال لفترات معينة يُمكّن أي شخص من تحقيق أجزاء مهمة من أحلامه.

٢ الهدف: إن الهدف يوضح موازنة صغرى لمدخولك ومصروفك واستخدام برنامج Excel على الحاسوب وصنع قرارات عن كيفية إدارة الأموال سوف يكون الهدف الأساسي لهذا المشروع، حيث ستجد مسبيلاً إلى ادخار مبلغ محدد خلال فترات من أسبوع أو من أشهر.

٣ الموارد: حاسوب - آلة حاسبة.

٤ المتتابعة:

شجع الطلاب على الإجابة عن الأسئلة التالية:
١ ما المبلغ الذي يحصل عليه الطالب؟ (من الأهل - راتب - مقابل عمل ...)
٢ ما المبلغ الذي يصرف الطالب في أسبوع؟ (طعام، نقل، ...) ...
٣ ما المبلغ غير المتوقع الذي يصرفه الطالب؟ (سيما، ألعاب، مجلات، ...) ...
٤ ما المبلغ الذي ادخره الطالب؟ (أسبوعياً، شهرياً ...) ...
٥ التقرير: حفظ الطالب على كتابة تقرير مفصل بين خطوات تنفيذ المشروع مرافقاً بجدولة واضحة للدخل والمصاريف والادخار. شجعهم على تبادل الآثار ومراجعة حساباتهم إذا كان ذلك ضرورياً.

دروس الوحدة

الاحتلال الشروط	طرق العد	الاتجاه السياري	الأرجاء	تحليل البيانات
٥-١٠	٤-١٠	٣-١٠	٢-١٠	١-١٠

يعتبر علم الإحصاء من أهم العلوم التطبيقية في عصرنا الحاضر. إذا نظرت حولك تجد أنه لا يمكن القيام بأي خطوة تنفيذية في أي مجال دون الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء.

تريد معرفة مدى انتشار البرامج التلفزيونية ...
تريد الترويج لمتجر معين ومعرفة ما إذا تحققت الغاية ...
تريد الاستقصاء عن توجه الناخبين في عملية انتخاب مجلس الأمة أو انتخاب رئيس جمهورية ...

في المحصلة انكب العاملون في مجال الإحصاء على إيجاد أسس وقوانين يتوقعون من خلالها الحصول على نتائج علمية تساعد على توقعات محددة واتخاذ قرارات سليمة. لقد كان علم الإحصاء يهتم في البدء بعملية العد والحصر للأشياء، لذا سمي بالعربية «إحصاء» وهي مشتقة من الكلمة أحصى، وكان الاهتمام مخصوصاً فقط ببعض السكان لجهة عدد المواليد والوفيات لمعرفة الموارد البشرية الموجودة في الدولة، ومن هنا جاءت التسمية بالأجنبية «Statistics» حيث هي مشتقة من "State" وتعني الدولة.

وقد عُرف قديماً الإحصاء بأنه جمع معلومات وترتيبها في جداول وتمثيلها في رسوم بيانية. ولكن تطور هذا المفهوم ليصبح على متقدماً بحيث تحول إلى جمع البيانات وتنظيمها وعرضها ووصفها وتحليلها، واستخلاص النتائج وإيجاد التوقعات واتخاذ القرارات المناسبة.

يعتبر علم الإحصاء في عصرنا الحاضر، أداة للتخطيط، حيث أصبحت البيانات هي القاعدة المتبعة التي تبني عليها سياسة الدول في كل المجالات.

في الاقتصاد: يستخدم علم الإحصاء في تفسير الحركة الاقتصادية من حيث العرض والطلب وتأثير الأسعار والعلاقة بين الدخل والإنفاق، ومراقبة الإنتاج في المؤسسات الصناعية لجهة كمية ودرجة وجوده، ومدى ملاءمة كل ذلك لاحتياجات السوق وأذواق المستهلكين. أما في العلوم الطبية، فيستخدم لمقارنة الأمراض وسبل معالجتها وتحديد العلاقة بين بعض الأمراض وسبلها وقياس كفاءة الأدوية المستخدمة ...

مشروع الوحدة

يقدم هذا المشروع فرصة أمام الطلاب ليختبروا إمكاناتهم في عملية إحصاء بسيطة تهدف من خلالها إلى تكوين فكرة عن مدخولهم، مصروفهم، كيف سينظمون هذه المعلومات، كيف سيعرضونها، كيف سيحللونها ليعضوا توقعات ويتخذوا قرارات سليمة، وأكثر من ذلك كيف سيدافعون عن هذه القرارات عند كتابة التقرير.

شجع الطلاب على العمل بجدية في هذا المشروع، لأنه يؤمن خطوة أولى عن كيفية وضع ميزانية صغيرة، وهي مهمة جدًا في بناء شخصية مخططة قادرة على المواجهة في المستقبل.

اشرح لهم بالتفصيل الأسئلة الموجودة في فقرة «المتابعة» وكيفية استخدام أوراق جدولة الانتشار.

سلم التقييم

٤.	الجدوال مفصلة. الحسابات دقيقة. التقرير واضح يبيّن أرقام ميزانية صحيحة ومقبولة.
٣.	معظم الجداول مفصلة. بعض الأخطاء في الحسابات. التقرير واضح مع أخطاء طفيفة في عرض الميزانية.
٢.	بعض الجداول مفصلة. أخطاء كثيرة في الحسابات. التقرير غير مفصل مع أخطاء متعددة في الميزانية.
١.	معظم عناصر المشروع غير كاملة.

الوحدة العاشرة

ابن انت الان (المعارف السابقة المكتسبة)

أضف إلى معلوماتك

أحداث نادرة

إن استياع خط حذو حذو عطل في حاسوب يتيجي بالنقاط المجمعة - تمثيل بياني بالصور - تمثيل بياني بالأصدقاء - تمثيل بياني بالخطوط - تمثيل بياني بالدائرة).

تمللت وصف البيانات (المتوسط الحسابي - الوسيط - العنوان - مخطط الساق والأروق).

استخدمت الشجرة البيانية.

طبقت طرق العد في حالات تكون فيها الترتيب منها التبادل (التتابع) وحالات يكون فيها الترتيب غير مهم (التوافق).

تعلمت حساب الاحتمالات.

استخدمت التجارب لإيجاد الاحتمالات.

ماذا سوف تتعلم؟

حساب مقاييس النزعة المركزية جيروًا وباستخدام التكنولوجيا.

استخدام هذه المقاييس في تحليل البيانات.

تحديث الأرباعيات وجعل الأعداد الخمسة في البيانات وتمثيلها بواسطة المندسق ذو المارتين وتقديرها.

تقدير البيانات الإحصائية.

حل مسائل باستخدام مبدأ العد.

حل مسائل باستخدام قوانين التوافق والتباين.

الاحتمال المشروط.

المصطلحات الأساسية

تحليل البيانات - مقاييس النزعة المركزية - مجمل الأعداد الخمسة - الشتت - الأرباعيات - الصندوق ذو المارتين - الألفاظ المعياري - البيانات - مبدأ العد - التبادل - التوافق - الأحداث المستقلة - الاحتمال المشروط.



١-١٠: تحليل البيانات

تحليل البيانات Data Analysis

١-١٠

عمل تعاوني

بيان الجدول التالي أطوال القاتمات بالسنتيمتر عند ٣٠ طالباً في المرحلة الثانوية.

١٧٢	١٦٣	١٦٨	١٦٧	١٦٩	١٧٥	١٧١	١٦٤	١٥٨	١٧٠
١٥٥	١٦٩	١٦٠	١٦٦	١٦٢	١٦٤	١٧٧	١٦٩	١٥٩	١٧٤
١٦٨	١٦٥	١٦٨	١٧٣	١٧٥	١٧٠	١٧١	١٧٤	١٧٩	

١) استخدم الآلة الحاسبة لإيجاد المتوسط الحسابي لأطوال هؤلاء الطلاب.
 ٢) ما الوسيط لهذه البيانات؟
 ٣) أكمل الجدول التالي:

الفئة	١٧٥	١٧٠	١٦٥	١٥٥
النكرار				
متوسط الفئة				

٤) ما الفئة التي تتضمن الوسيط؟
 ٥) ما الفئة التي تتضمن التكرار الأكبر؟
 ٦) استخدم مراكز الفئات والتكرار لتجد المتوسط الحسابي لأطوال قاتمات هؤلاء الطلاب.
 ٧) قارن بين النتيجة في السؤال ١ والنتيجة في السؤال ٦. ماذا نلاحظ؟

مقاييس الترعة المركزية

على افتراض أن مدير شركة أو مؤسسة يريد إجراء دراسة حول رواتب الموظفين لعدة أعوام ويريد عدداً واحداً يبيّن له متوسط الرواتب في عام معين. في الذي يختار إلية؟

الربط بالحياة:

لإدخال بيانات ذكرت مقارنة ١-١١ (on, freq) باستخدام المودع لعمليات التكرار لكل سطر (5,4,4,3,3,3,2,2,1,1) = (٥,٤,٤,٣,٣,٣,٢,٢,١,١) وحساب الاحصاء المعياري للسكان والمتوسط.

STAT	FREQ
3	3
4	3
4	3
3	3
3	2
2	1
1	1
1	1
1	1
1	1

النتائج: المتوسط ٣ الاحصاء المعياري للسكان: ١.١٥٤٧٠٥٣٨

ال المتوسط الحسابي

ال المتوسط الحسابي لـ n من الأعداد x_1, x_2, \dots, x_n هو:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

ويصورة عامة يمكنني إيجاد المتوسط الحسابي من جدول تكراري ذو فئات باستخدام القانون التالي:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

قانون (الطريقة المباشرة)

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

حيث f_i تكرار الفئة i , x_i متوسط الفئة i , n عدد الفئات

مثال (١)

بيان الجدول التالي الأوزان بالكيلوجرام لـ ٦٠ طالباً في المرحلة الثانوية.

أوجد المتوسط الحسابي لأوزان هؤلاء الطلاب.

الفئة	-٨٠	-٧٥	-٧٠	-٦٥	-٦٠	-٥٥	-٥٠
النكرار	٣	٩	١١	١٤	١٢	٧	٤

١ الأهداف

- يوجد مقاييس الترعة المركزية جرياً وبيانياً.
- يوجد مقاييس الترعة المركزية تقنياً.
- يستخدم هذه المقاييس في تحليل البيانات.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

مقاييس الترعة المركزية: المتوسط الحسابي، الوسيط، المتوسط.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة - آلة حاسبة علمية - حاسوب (اختياري) - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

اكتبه على السبورة البيانات التالية:

.٧، .٥، .٩، .٦، .٨، .٤، .٣، .١٠، .٧، .٥، .٩، .٦، .٨، .٤، .٧

اطلب إلى الطلاب:

- ترتيب هذه البيانات تصاعدياً.
- إيجاد الوسيط.
- إيجاد المتوسط الحسابي.
- إيجاد المتوسط.
- تنظيم هذه البيانات في جدول يبيّن التكرارات.

٥ التدريس

يتطرق هذا الدرس إلى قيم الترعة المركزية (المتوسط الحسابي، الوسيط، المتوسط) عندما تتضمن البيانات قيماً بأعداد كبيرة، فتحتاج عندها إلى استخدام الفئات.

ولكن من المهم جدًا في البدء إيضاح ميزات كل قيمة من قيم الترعة المركزية وسلبياتها.

المتوسط الحسابي: من مميزاته، أنه يوفر طريقة نستخدم من خلالها قيمة واحدة لتمثيل هذه البيانات.

من سلبياته، أنه يعطي فكرة مضللة عن البيانات وخاصة إذا كان هناك قيمة متطرفة.

الوسيط: من مميزاته، أنه لا يتتأثر بالقيم المتطرفة.

لا توجد سلبيات مباشرة في استخدامه.

المتوسط: من مميزاته، أنه يعطي فكرة عن القيم الأكثر تكراراً في البيانات.

من سلبياته أنها لا تستفيد شيئاً إذا كانت كل قيمة من البيانات لا تظهر سوى مرة واحدة، أي أنه لا يوجد منوال في هذه الحالة في فقرة «عمل تعاوني». تابع بدقة النتائج التي يحصل عليها الطلاب لأنها سوف تكون الأساس بالنسبة إلى محりات الدرس. نقاش معهم معنى الفئة، وما هي القيم الموجودة في كل فئة وكيفية فرز القيم واستخدام علامات التكرار. اشرح لهم كيفية إيجاد مركز الفئة.

في المتوسط الحسابي، ساعدتهم على فهم الرموز المستخدمة في القاعدة:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

وأن هذه القاعدة هي متقدمة أكثر عمّا درسوه سابقاً. أخبرهم أن تنظيم جدول يبيّن الفئة ومركز الفئة أو $\sum_{i=1}^n x_i$ (مجموع التكرارات)، وأخيراً $\sum_{i=1}^n x_i$ (مجموع ناتج ضرب التكرارات في القيم الماظرة في البيانات) يساعد كثيراً على استخدام الآلة الحاسبة أو عدم استخدامها في إيجاد المتوسط الحسابي كما في المثال (١).

يمكن تبسيط فكرة القيمة الفرضية من قبل المعلم باستخدام مثال أولى:

كانت درجات صالح في امتحان الرياضيات حيث النهاية العظمى ١٠٠ درجة كما يلي: ٨٢، ٧٨، ٨٠، ٨٨، ٧٥، ٨٦.

وجد صالح المتوسط الحسابي لهذه الدرجات بالحساب الذهني باختيار درجة مناسبة قريبة جداً من الوسط وهي ٨٠

واستنتج ما يلي بالمقارنة مع ٨٠:



وعند جمع هذه القيم، نحصل على:

$$9 = 6 + 2 - 0 + 8 + 5 - 2 +$$

وبالتالي المتوسط الحسابي = $\frac{9}{6}$ أي $\bar{x} = 1.5$

علماً أنه باستخدام الحساب العادي نجد أن:

$$\bar{x} = \frac{86 + 78 + 80 + 88 + 75 + 82}{6}$$

والنتيجة هي نفسها.

ويمكن أيضاً استخدام المثال التالي لإيجاد قيمة تقريرية

الحل:			
يمكن تكوين الجدول التالي: (استخدم الآلة الحاسبة)			
الفئة	مرکز الفئة	التكرار	ت. س
-٥٠	٥٢,٥	٤	٢١٠
-٥٥	٥٧,٥	٧	٤٠٢,٥
-٦٠	٦٢,٥	١٢	٧٥٠
-٦٥	٦٧,٥	١٤	٩٤٥
-٧٠	٧٢,٥	١١	٧٨٧,٥
-٧٥	٧٧,٥	٩	٦٩٧,٥
-٨٠	٨٢,٥	٣	٢٤٧,٥
		$\sum_{i=1}^n x_i = 4050$	$\sum_{i=1}^n f_i = 30$
		$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n f_i} = \frac{4050}{30} = 135$	

أي أن المتوسط الحسابي لأوزان طالباً هو ٦٧,٥ كيلوجراماً.

حاول أن تحل

١) بين الجدول التالي التوزيع التكراري لدرجات طالباً في مادة الرياضيات حيث النهاية العظمى ١٠٠ درجة. أوجد المتوسط الحسابي لهؤلاء الدرجات.

الفئة	التكرار	ت. س
-٩٠	٣	٣
-٨٠	٤	٤
-٧٠	٩	٩
-٦٠	١٣	١٣
-٥٠	١٥	١٥
-٤٠	١٤	١٤
-٣٠	٨	٨
-٢٠	٤	٤

يمكن تبسيط الحسابات وإيجاد قيمة تقريرية أيضاً للمتوسط الحسابي. تأخذ وسطاً فرضياً (من المستحسن أن يكون مركز الفئة الذي يقابل أكبر تكرار للبيانات).

١٦٠

Median

الوسط

الوسط لمعدن من القيم المرتبة تصاعدياً أو تنازلياً هو:

- ١) العدد الذي يحيط به نصف القيم إذا كان العدد فردياً.
- ٢) المتوسط الحسابي للمعددين في منتصف القيم إذا كان العدد زوجياً.

أي أن الوسيط القيمي ترتيبها $\frac{n+1}{2}$ من الأعداد إذا كان العدد فردياً ومتعدد القيمين ترتيبها $\frac{n+1}{2} + \frac{1}{2}$ من الأعداد إذا كان العدد زوجياً.

يمكن إيجاد الوسيط باستخدام التمثل البياني للتكرار المجتمع الصاعد وللتكرار المجتمع النازل أو لكليهما.

مثال (٢)

يوضح الجدول التالي التوزيع التكراري لأطوال قاتمات ٥٥ طالباً في المرحلة الثانية.

أكمل الجدول لإيجاد الوسيط باستخدام التمثل البياني لمحتوى التكرار المجتمع الصاعد.

الفئات	التكرار	أقل من الحدود العليا	النهاية	التكرار الصاعد	المجموع
-١٥٠	٣	١٥٥	٣	٣	
-١٥٥	٧	١٦٠	٧	٧	
-١٦٠	٩	١٦٥	٩	٩	
-١٦٥	١٢	١٧٠	١٢	١٢	
-١٧٠	١٠	١٧٥	١٠	١٠	
-١٧٥	٨	١٨٠	٨	٨	
-١٨٠	٤	١٨٥	٤	٤	
-١٨٥	٢	١٩٠	٢	٢	

الحل:

الفئات	التكرار	أقل من الحدود العليا	النهاية	التكرار الصاعد	المجموع
-١٥٠	٣	١٥٥	٣	٣	
-١٥٥	٧	١٦٠	٧	٧	
-١٦٠	٩	١٦٥	٩	٩	
-١٦٥	١٢	١٧٠	١٢	١٢	
-١٧٠	١٠	١٧٥	١٠	١٠	
-١٧٥	٨	١٨٠	٨	٨	
-١٨٠	٤	١٨٥	٤	٤	
-١٨٥	٢	١٩٠	٢	٢	


١٦١

للمتوسط الحسابي فنأخذ وسطاً فرضياً \bar{x} ، نطبق القاعدة:

$$\bar{s} = \frac{\sum r_i}{n}$$

يبين الجدول التالي التوزيع التكراري لمعدل الكوليستيول عند 30 شخصاً.

أوجد قيمة تقريرية للمتوسط الحسابي لمعدل الكوليستيول عند هؤلاء الأشخاص باستخدام وسطاً فرضياً.



ترتيب الوسيط = $\frac{\sum r_i}{n}$
 $27,5 = \frac{55}{3}$
 من الشكل يتضح أن الوسيط يساوي تقريباً 168,5.

حاول أن تحل

٢ أكمل جدول البيانات التالي لإيجاد الوسيط لأوزان ٢٠ طالباً بالكيلوجرام باستخدام التمثيل البياني لمعنى التكرار المتجمع الصاعد.

التكرار المتجمع الصاعد	أقل من الحدود العليا للفئة	النكرار	الفئات
		٣	-٥٥
		٤	-٦٠
		٥	-٦٥
		٦	-٧٠
		٢	-٧٥

الفئة	النكرار
-٢٢٠	٣
-٢١٥	٦
-٢١٠	٩
-٢٠٥	٤
-٢٠٠	٣
-١٩٥	٥

الحل: نأخذ وسطاً فرضياً $\bar{x} = 212,5$
 نأخذ $\bar{x} = 212,5$ لأنّه يقابل أكبر تكرار. نكون الجدول التالي:

الفئة	النكرار	النحراف عن \bar{x}	$r \times \bar{x}$
-٢٢٠	٣	١٠	٣٠
-٢١٥	٦	٥	٣٠
-٢١٠	٩	٠	٠
-٢٠٥	٤	٥-	٢٠-
-٢٠٠	٣	١٠-	٣٠-
-١٩٥	٥	١٥-	٧٥-

نحصل على: $\sum_{r=1}^7 r = 30$, $\sum_{r=1}^7 r \bar{x} = 650$

فيكون: $\bar{s} = \frac{650 - 210,33}{30} \approx 212,5$

أي أن المتوسط الحسابي لمعدل الكوليستيول عند 30 شخصاً هو 210,33 مليرامات تقريرياً.

لإيجاد «الوسيط» يقدم الدرس ثلاث طرق: الأولى باستخدام منحنى التكرار المتجمع الصاعد، والثانية باستخدام منحنى التكرار المتجمع النازل، والثالثة باستخدام الرسم البياني للتكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل. ومن تقاطع الرسمين البيانيين، نرسم عموداً نازلاً على المحور الأفقي ونقرأ على هذا المحور قيمة الوسيط تقريرياً.

قدم للطلاب تمارين متعددة لتساعدهم على تطبيق القاعدة أو على استخدام الرسم البياني كما في الأمثلة (٢)، (٣)، (٤). في المثال نستخدم قانون الرافعه كما هو مبين في المثال (٦) كما يمكن أيضاً استخدام القاعدة أو استخدام المدرج التكراري كما هو مبين في المثال (٧).

في المثال (٧)، يبيّن المدرج التكراري الفئة التي تسبق فئة المنوال، ثم فئة المنوال، وبعد ذلك الفئة التالية لفئة المنوال بمستويات تختلف أطوالها بحسب تكرار كل فئة. أما القطع المستقيمة التي تربط بين الرؤوس المقابلة في المستويات فتقاطع في نقطة، والعمود المرسوم من هذه النقطة عمودياً على المحور الأفقي يحدد قيمة المنوال تقريرياً.

٦ الرابط

ترتبط الأمثلة في هذا الدرس بين المفاهيم والمهارات وبين المواقف الحياتية.

٧ أخطاء متوقعة ومعاجلتها

قد يخالط الطالب في تحديد الفئة الوسيطية. ساعدتهم في البدء على تحديد ترتيب الوسيط، ثم أخبرهم أن هذا الناتج يجب أن يتواجد في الفئة المناسبة عند تكوين جدول التكرار المتجمع الصاعد.

٨ التقييم

راقب الطلاب وهم يتعاملون مع فقرات «حاول أن تحل» لتأكد من أنهم قد فهموا جيداً ما ورد في هذا الدرس.

مثال (٣)
يوضح الجدول التالي توزيع الرواتب الشهرية لمعونة موظف في أحد الشركات بالديبار.
أكمل الجدول لإيجاد الوسيط باستخدام التسلسل البياني لمنحنى التكرار النازل.

الفئات	التكرار	الحد الأدنى للفئة فأكثر	التكرار المتجمع النازل	الحد الأدنى للفئة فأكثر
٥	-٥٠٠			
٣٠	-٦٠٠			
٣٢	-٧٠٠			
٢٠	-٨٠٠			
١٠	-٩٠٠			
٣	-١٠٠٠			


الحل:

الفئات	التكرار	الحد الأدنى للفئة فأكثر	التكرار المتجمع النازل	الحد الأدنى للفئة فأكثر
٥	-٥٠٠			
٣٠	-٦٠٠			
٣٢	-٧٠٠			
٢٠	-٨٠٠			
١٠	-٩٠٠			
٣	-١٠٠٠			

$$\text{ترتيب الوسيط} = \frac{1}{2} \times ٧٥٠ = ٣٧٥$$

من الشكل يتضح أن الوسيط يساوي تقريرياً ٣٧٥.

الحدود الدنيا للفئات



١٦٦

التاريخ الميلادي: التاريخ الهجري:

تحليل البيانات
Data Analysis


المجموعة ٤ تمارين أساسية

(١) بيان الجدول التالي التوزيع التكراري لأوزان طالبات.

الفئات	التكرار
٣	٤
٩	٣
٨	٣
٣	٣

(١) أوجد المتوسط الحسابي لهذه الأوزان.

(ب) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحنى التكرار المتجمع الصاعد.



٩٦

١٣٦

اختبار سريع

يبين الجدول التالي التوزيع التكراري لدرجات طلاب الصف العاشر في الاختبار النهائي لمادة الرياضيات حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة.

الفئة	-١٦	-١٢	-٨	-٤
التكرار	٢	٩	٨	٦


١ أكمل الجدول لتبيين التكرار المتجمع الصاعد ومركز الفئة.

الفئة	النهاية العظمى الصاعد	النهاية العاشرة	النهاية العاشرة من المجموع	النهاية العاشرة من التكرار
-٤	٦	٦	٨	٣٦
-٨	٨	١٢	١٤	٨٠
-١٢	٩	١٤	٢٣	١٢٦
-١٦	٦	٢٥	٢٠	٣٦

$$\text{أوجد المتوسط الحسابي } S = 11,12$$


٢ ارسم منحنى المتجمع الصاعد

تكرار المجتمع



واستنتج
وسيط قيم
البيانات.
ال وسيط = ١١,٥

٣ استخدم التمثيل البياني للمدرج التكراري لإيجاد قيمة تقريرية للمنوال.



$$\text{المنوال} = 13$$

حاول أن تحل					
٢ أكمل الجدول التالي لإيجاد الوسيط لدرجات ٢٥ طلاباً باستخدام التمثيل البياني لمنحنى التكرار المتجمع النازل.					
الفئة	النهاية العاشرة	النهاية العاشرة فاكثر	النهاية الأولى	النهاية الأولى فاكثر	النهاية الأولى
-٥	٢	-٥	-٨	-١١	-١٧
-٨	٥	-٨	-١١	-١٤	-١٧
-١١	٨	-١١	-١٤	-١٦	-١٧
-١٤	٦	-١٤	-١٦	-١٧	-١٧
-١٧	٤	-١٧	-١٧	-١٧	-١٧


يمكن إيجاد قيمة تقريرية للوسيط باستخدام التمثيل البياني لمنحنى التكرار المتجمع الصاعد ولمنحنى التكرار المتجمع النازل.

مثال (٤)					
يرسم الجدول التالي الرواتب الشهرية لستة موظف في إحدى الشركات بالديار.					
أكمل الجدول التالي لتبيين التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل، ثم استخدم التمثيل البياني لهما معاً لإيجاد الوسيط.					
-١٠٠٠	-٩٠٠	-٨٠٠	-٧٠٠	-٦٠٠	-٥٠٠
٣	١٠	٢٠	٣٢	٣٠	٥

١٦٤

الحل:					
الفئة	النهاية الأولى	النهاية الأولى فاكثر	النهاية العاشرة	النهاية العاشرة فاكثر	النهاية الأولى
١٠٠	٥٠٠	٥	٦٠٠	٥	-٥٠٠
٩٥	٦٠٠	٣٥	٧٠٠	٣٠	-٦٠٠
٦٥	٧٠٠	٦٧	٨٠٠	٣٢	-٧٠٠
٣٣	٨٠٠	٨٧	٩٠٠	٣٠	-٨٠٠
١٣	٩٠٠	٩٧	١٠٠٠	٣	-٩٠٠
٣	١٠٠٠	١٠٠	١١٠٠	-	-١٠٠

يقطنط منحنى تكرار المجتمع الصاعد مع منحنى تكرار المجتمع النازل عند نقطة م. المحدود المرسوم من النقطة م على المحور الأفقي يعطي المعدل تقريباً ٧٥٠ ديناراً تقريباً. الوسيط يساوي ٧٥٠ ديناراً تقريباً.



حاول أن تحل

الفئة	النهاية العاشرة	النهاية العاشرة فاكثر	النهاية الأولى	النهاية الأولى فاكثر	النهاية الأولى
-٩٠	-٨٠	-٧٠	-٦٠	-٥٠	-٤٠
٦	٨	١٢	١٧	١٠	٧

١٦٥

٩ إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

المنوال هو القيمة الأكثر تكراراً في البيانات.

مثال (٥)

أوجد المنوال في ما يلي:

٥،١٠،٦٥،٤٧،٩٠،٨٥	١
٢٣،١٧،١٦،١٥،١١،٢٠،١٤،١٨،١٢	٢
٧،٧،٧،٧،٧	٣
٧،٦،٥،٦،٥،٦،٥	٤
الحل:	
١) المنوال = ٥ (الأكثر تكراراً)	٥
٢) يوجد متوازنان: ١٢،١١	٦
٣) لا يوجد متوازن	٧
٤) يوجد متوازنان: ٦،٥	٨

حاول أن تحل

أوجد المنوال في ما يلي:


١٤،٧،٦،١٢،٥،٧	١
١٠،٧،٨،١٥،١٢،٩،٨،١٥	٢
١،١،١،١،١	٣
٤،٤،٣،٨،٨،٣،٨،٣	٤

ملاحظة:
إذا لم يوجد تكرار في البيانات فلا يوجد متوازن لها.
ويمكن أن يوجد أكثر من متوازن لمجموعة القيم.

١٦٦


٩

(ج) أوجد الوسيط هذه الأوزان باستخدام منحني التكرار المتجمع النازل.



الفئة	النكرار	الكتار المتجمع للنهاية فاكثر	المد الادنى للنهاية فاكثر
٣	-٥٦	-٥٦	
٨	-٦٠	-٦٠	
٣	-٦٤	-٦٤	
٩	-٦٨	-٦٨	
٤	-٧٢	-٧٢	
٣	-٧٦	-٧٦	

(د) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحني التكرار المتجمع الصاعد ومنحني التكرار المتجمع النازل.



الفئة	النكرار	الكتار المتجمع للنهاية فاكثر	المد الادنى للنهاية فاكثر
٣	-٥٦	-٥٦	
٨	-٦٠	-٦٠	
٣	-٦٤	-٦٤	
٩	-٦٨	-٦٨	
٤	-٧٢	-٧٢	
٣	-٧٦	-٧٦	

٩٧

٩

إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

$$(أ) \text{المتوسط الحسابي} = س = \frac{٥٠٥٠}{٣٠}$$

ترتيب البيانات تصاعدياً: ١٦٢، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٥، ١٦٤، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٥، ١٦٣، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧١، ١٧٠، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٩، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٤

الوسيط = ١٦٩

(ب)

-١٧٥	-١٧٠	-١٦٥	-١٦٠	-١٥٥	الفئة
٥	٨	٩	٥	٣	التكرار
١٧٧,٥	١٧٢,٥	١٦٧,٥	١٦٢,٥	١٥٧,٥	مركز الفئة

(ج) فئة الوسيط هي: -١٦٥

(د) فئة التكرار الأكبر هي: -١٦٥

$$(هـ) س = \frac{+١٦٧,٥ \times ٩ + ١٦٢,٥ \times ٥ + ١٥٧,٥ \times ٣}{٣٠}$$

$$\frac{٥٠٦٠}{٣٠} = \frac{١٧٧,٥ \times ٥ + ١٧٢,٥ \times ٨}{٣٠}$$

س = ١٦٨,٦

(و) في السؤال (أ) س = ١٦٨,٣ ، في السؤال (هـ)

س = ١٦٨,٦ أي أن النتائج متقاربة.

«حاول أن تحل»

١

-٩٠	-٨٠	-٧٠	-٦٠	-٥٠	-٤٠	-٣٠	-٢٠	الفئة
٣	٤	٩	١٣	١٥	١٤	٨	٤	التكرار
٩٥	٨٥	٧٥	٦٥	٥٥	٤٥	٣٥	٢٥	مركز الفئة

س = ٥٦,٨٦

إيجاد المتوال للتوزيع التكاري باستخدام قانون الرافعة:

نحدد الفتة المترالية وهي الفتة التي يقابلها أكبر تكرار.

نحدد التكرار للمفتتة السابعة مباشرةً واللاحقة مباشرةً للفترة المترالية على الترتيب كـ، كـ، كـ.

المتوال يقسم الفتة المترالية كـ في الشكل بحيث إن:

$$\text{ف} = \frac{\text{ف}}{\text{ف}} \times \text{س} = \text{كـ} \times (\text{ف} - \text{س})$$

المتوال = الحد الأدنى للفترة المترالية + س.

هذا مما يعرف بطريقة الرافعة حساب المتوال.


ويمكن وضع صيغة رياضية لقانون الرافعة على الشكل التالي:

$$\text{المتوال} = \text{الحد الأدنى للفترة المترالية} + \frac{\text{ف}}{\text{ف}} \times \text{س}$$

التكرار المترافق مع المترالية


المتوال = الحد الأدنى للفترة المترالية + ف

للفترة المترالية



١٦٧


(هـ) أوجد المتوال لهذه الأوزان باستخدام قانون الرافعة.



(زـ) بين الجدول التالي ٥ فـتـاتـ مـثـلـ تـوزـعـ المـصـرـوفـ الـبـيـوـمـيـ لـ ٣٠ عـائـلـةـ بـالـدـيـنـارـ.

الفـ	١٠٠	٨٠	٦٠	٤٠	٢٠
الـتـكـرـارـ	٣	٥	٩	٦	٧

(أـ) أوجد المـتوـالـ لمـصـرـوفـ العـائـلـاتـ الـبـيـوـمـيـ باـسـتـخـادـ قـانـونـ الـرـافـعـةـ.



في التمارين (٣ـ)، ظللـ ① إذا كانت العبارة صحيحةـ وـظـللـ ② إذا كانت العبارة خاطئةـ.

(٣) الوسيط لمجموعـةـ الـقـيمـ ٧، ٨، ٥، ٤، ٢، ٦، ٢٠ يـساـويـ $\frac{٥}{٦}$


(٤) إذا كان المتوسط الحسابي لمجموعـةـ الـقـيمـ ٣، ٩، ٧، ٠، ٣، ٥ يـساـويـ ٦ فـإنـ سـ = ٥

(٥) لأـيـ تـوزـعـ تـكـارـيـ يـكـونـ المـتوـالـ أـكـبـرـ مـنـ المـتوـسـطـ الحـسـابـيـ.

(٦) لـلمـفـرـدـاتـ ٣، ٧، ٥، ٨، ٧، ٣ـ منـ الـمـوـالـ.


- (بـ) ①
- (بـ) ②
- (بـ) ①
- (بـ) ①

الفـ	أـقـلـ مـنـ الـمـحـدـودـ الـعـلـيـاـ لـلـفـتـةـ	الـتـكـرـارـ	أـقـلـ مـنـ الـمـحـدـودـ الـعـلـيـاـ لـلـفـتـةـ الصـاعـدـ
٣	٦٠	٣	٥٥
٧	٦٥	٤	٦٠
١٢	٧٠	٥	٦٥
١٨	٧٥	٦	٧٠
٢٠	٨٠	٢	٧٥



الفـ	الـمـدـأـدـنـىـ الـأـكـثـرـ	الـتـكـرـارـ	أـقـلـ مـنـ الـمـحـدـودـ الـعـلـيـاـ لـلـفـتـةـ
٢٥	٥ فأـكـثـرـ	٢	-٥
٢٢	٨ فأـكـثـرـ	٥	-٨
١٨	١١ فأـكـثـرـ	٨	-١١
١٠	١٤ فأـكـثـرـ	٦	-١٤
٤	١٧ فأـكـثـرـ	٤	-١٧

منحنـىـ التـكـرـارـ الـمـجـمـعـ النـازـلـ التـكـرـارـ



المتوال = الحد الأدنى للنفحة المتوالية + س $3,4,40 \approx 40 + 3 = 43$ وينذلك يكون متواال ساعات الدراسة أسبوعياً عند الطلاب ٤٣ ساعة و ٢٥ دقيقة تقريباً.
معلومات صحية: المعدل الطبيعي للكوليسترول في الدم في دولة الكويت: CHOL ... ٣.١٠ → ٥.٢٠ HDL.D ... ١.٠٤ → ١.٦٨ حاول أن تحل ٦ بين الجدول التالي التوزيع التكراري لمعدل الكوليسترول عند ٢٠ شخصاً. أوجد المتواال لمعدل الكوليسترول عند هؤلاء الأشخاص باستخدام الصيغة الرياضية لقانون الرافعة.


يمكن إيجاد قيمة تقريرية للمتوال بيانياً باستخدام المدرج التكراري من خلال تحديد فئة المتواال والنفحة السابقة مباشرة.

مثال (٧) بين الجدول التالي التوزيع التكراري لرواتب الموظفين بالدينار في إحدى المؤسسات. استخدم التسليل البياني للمدرج التكراري لإيجاد قيمة تقريرية متواال رواتب الموظفين.														
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>-٧٠٠</td> <td>-٦٠٠</td> <td>-٥٠٠</td> <td>-٤٠٠</td> <td>-٣٠٠</td> <td>-٢٠٠</td> <td>الفئة</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>١٠</td> <td>٢٠</td> <td>٣٥</td> <td>٢٧</td> <td>٥</td> <td>التكرار</td> </tr> </table>	-٧٠٠	-٦٠٠	-٥٠٠	-٤٠٠	-٣٠٠	-٢٠٠	الفئة	٣	١٠	٢٠	٣٥	٢٧	٥	التكرار
-٧٠٠	-٦٠٠	-٥٠٠	-٤٠٠	-٣٠٠	-٢٠٠	الفئة								
٣	١٠	٢٠	٣٥	٢٧	٥	التكرار								

١٦٨

يساوي الوسيط تقريباً ٦٨.

الفئات	التكرار	أقل من الحدود العليا للنفحة	النفحة الصاعدة المتكرر الأدنى فأكثر	المجموع التكرار	المجموع النازل
-٤٠	أقل من ٥٠	٧	أكبر من ٤٠	٦٠	
-٥٠	أقل من ٦٠	١٠	أكبر من ٥٠	٥٣	
-٦٠	أقل من ٧٠	١٧	أكبر من ٦٠	٤٣	
-٧٠	أقل من ٨٠	١٢	أكبر من ٧٠	٢٦	
-٨٠	أقل من ٩٠	٨	أكبر من ٨٠	١٤	
-٩٠	أقل من ١٠٠	٦	أكبر من ٩٠	٦	



(أ) $\text{المتوال} = 7$. (ب) يوجد متواالان: ٨، ١٥.

(ج) لا يوجد متواال. (د) يوجد متواالان: ٨، ٣.

المجموعة ب تمارين تعزيزية																	
(١) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لأهداف الفرق في مباريات كأس العالم لسنة ٢٠٠٦.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>٦</td> <td>٥</td> <td>٤</td> <td>٣</td> <td>٢</td> <td>١</td> <td>٠</td> <td>الفئة</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>٢</td> <td>١٠</td> <td>١٢</td> <td>١٨</td> <td>١٣</td> <td>٧</td> <td>التكرار (عدد الفرق)</td> </tr> </table>	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	الفئة	٢	٢	١٠	١٢	١٨	١٣	٧	التكرار (عدد الفرق)
٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	الفئة										
٢	٢	١٠	١٢	١٨	١٣	٧	التكرار (عدد الفرق)										
أوجد المتوسط الحسابي للأهداف.	$6,5,4,3,2,1,0 \approx 1.68$																
(٢) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري على فئات القياسات أربعين رياضياً في أحد النوادي.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>-٤٤</td> <td>-٤٢</td> <td>-٤٠</td> <td>-٣٨</td> <td>الفئة</td> </tr> <tr> <td>٦</td> <td>١٧</td> <td>١٦</td> <td>١١</td> <td>التكرار</td> </tr> </table>	-٤٤	-٤٢	-٤٠	-٣٨	الفئة	٦	١٧	١٦	١١	التكرار						
-٤٤	-٤٢	-٤٠	-٣٨	الفئة													
٦	١٧	١٦	١١	التكرار													
أوجد المتوسط الحسابي للقياسات.	$-44, -42, -40, -38 \approx 40 + 3 = 43$																

٩٩

الحد الأدنى للفئة المتوالية = ٤٣ ، ٥

$$ك \times س = ك \times (ف - س)$$

$$4 \times س = 4 \times (13 - س)$$


$$س = 0,065$$

المتوال = الحد الأدنى للفئة المتوالية + س

$$5,495 = 0,065 + 5,43$$

$$\text{المتوال} = 5,495$$

الحل:
يبين الجدول أن الفئة المتوالية هي ٤٠٠ - والفئة السابقة المباشرة هي ٣٠٠ - والفئة اللاحقة مباشرة هي ٥٠٠ -



من نقطة تقاطع أ بـ ج مع بـ د نرسم عموداً على المحور الأفقي يقطعه في النقطة م. فنحصل على قيمة تقريرية للمتوال وهي ٤٤٥ ديناراً.


حاول أن تحل

٧) بين الجدول الثاني للتوزيع التكراري لأوزان طلاب ثانوي بالكيلوجرام. استخدم المدرج التكراري لإيجاد قيمة تقريرية لسؤال أوزان هؤلاء الطلاب.

الفئة	النكرار
-٨٠	٥
-٧٦	٨
-٧٢	١٠
-٦٨	١٨
-٦٤	١٢
-٦٠	٧


١٦٩

(ب) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحني التكرار المجتمع الصاعد.




النكرار	أقل من الحدود الصاعدة	النكرار المجتمع الصاعد	أقل من الحدود العلية لذمة	الفئة
			١١ -٣٨	
			١٦ -٤٠	
			١٧ -٤٢	
			٦ -٤٤	

(ج) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحني التكرار المجتمع النازل.



النكرار	أقل من الحدود العلية لذمة	النكرار المجتمع النازل	أقل من الحدود الصاعدة	الفئة
	١١ -٣٨			
	١٦ -٤٠			
	١٧ -٤٢			
	٦ -٤٤			

(د) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحني التكرار المجتمع الصاعد ومنحني التكرار المجتمع النازل معاً.




النكرار	أقل من الحدود العلية لذمة	النكرار المجتمع الصاعد	أقل من الحدود الصاعدة	النكرار المجتمع النازل	أقل من الحدود العلية لذمة	النكرار	أقل من الحدود الصاعدة	النكرار المجتمع الصاعد	أقل من الحدود العلية لذمة	النكرار المجتمع النازل	أقل من الحدود الصاعدة	الفئة
	١١ -٣٨											
	١٦ -٤٠											
	١٧ -٤٢											
	٦ -٤٤											


١٠٠

(ه) أوجد المنوال لهذه القياسات باستخدام قانون الرافعة.

(و) أوجد المنوال لهذه القياسات باستخدام المدرج التكراري.



التكرار



المتوال:

٦٩,٥ تقريرًا

٢-٢: الأرباعيات

١ الأهداف

- يتعرف مفهوم مقاييس التشتت.
- يتعرف المدى للبيانات.
- يتعرف الأرباعيات: الأدنى، الأوسط، الأعلى.
- يتعرف على مجمل الأعداد الخمسة.
- يرسم الصندوق ذو العارضتين.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

مدى - أرباعي أدنى - أرباعي أووسط (الوسيط) -
أرباعي أعلى - صندوق ذو العارضتين - مجمل الأعداد الخمسة.

٣ الأدوات والوسائل

مسطرة - آلة حاسبة علمية - حاسوب - جهاز إسقاط
(Data show)

٤ التمهيد

اكتب على السبورة البيانات التالية: ٧، ٦، ٩، ٨، ٥، ٤.

اطلب إلى الطالب:

- ترتيب هذه البيانات تصاعدياً.
- إيجاد القيمة الصغرى والقيمة العظمى ثم الفرق بينهما.
- إيجاد الوسيط لهذه البيانات.
- إيجاد المتوسط الحسابي.
- إيجاد وس立て الأعداد: ٤، ٥، ٦، ثم إيجاد وسيط الأعداد: ١٠، ٩، ٨.

٥ التدريس

تأكد من أن الطلاب يتفاعلون باهتمام كبير مع فقرة «عمل تعاوني»، لأن هذه الفقرة سوف تساعدهم في فهم ما سوف يأقي في سياق الدرس وخاصة في إيجاد الأرباعيات والمدى للبيانات.

ركز مع الطلاب على أهمية إيجاد مجمل الأعداد الخمسة بعد ترتيب البيانات تصاعدياً، لأن ذلك سوف يساعدتهم على رسم مخطط الصندوق.

اشرح بإسهاب دور كل أرباعي في البيانات، وأهمية المدى الأرباعي.
اطلب إليهم، من خلال استخدام أمثلة متعددة، إيجاد النسبة المئوية للبيانات، الموجودة في المدى الأرباعي ٣ - ١٠.
شجع الطلاب على رسم مخطط الصندوق بشكل دقيق حتى

عمل تعاوني

كانت درجات الطلاب في مادة الرياضيات حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة كما يلي:

١٤١٦١٤٠٣١٠٨٥١٤	١٧١٦١٤٠٣١٠٨٥١٤	١١١٠١٥٠١٩٠١٤٠٩٦٠٥٧	١٠١٢٦١٠١٨٠١٦١٧٠١٤
١٣	١٣	١٣	١٣

١. أوجد الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة.

٢. رتب هذه البيانات تصاعدياً.

٣. أوجد الوسيط لهذه البيانات.

٤. يقسم الوسيط قيم البيانات إلى قسمين متساوين:

٥. أوجد الوسيط الأدنى لمجموعة القيم التي هي أصغر من الوسيط الذي حصلت عليه في السؤال (٣).

٦. أوجد الوسيط الأعلى لمجموعة القيم التي هي أكبر من الوسيط الذي حصلت عليه في السؤال (٣).

٧. رتب تصاعدياً القيم التالية:

٨. القيمة الصغرى للبيانات، الوسيط الأدنى، الوسيط، الوسيط الأعلى، القيمة العظمى للبيانات.

إن مقاييس التشتت تعطينا فكرة عن قرب أو بعد قيم البيانات عن المتوسط الحسابي أو عن الوسيط ولكنها لا توضح كيفية توزيع هذه القيم وانتشارها.

تصنف مقاييس الانتشار (التشتت) مدى التغير في البيانات.

يكون التشتت صغيراً عندما تكون مفرادات البيانات مترابطة وبعضها ويكون كبيراً عندما تكون المفردات متباينة فأهمية دراسة التشتت تكمن في معرفة مدى تجانس قيم هذه البيانات.

إذا كان لدينا مجموعة من البيانات لديها نفس المتوسط الحسابي.

فإن المجموعة التي قيم بياناتها قريبة أكثر من المتوسط الحسابي تكون الأكبر تجانساً وانسجاماً في مابينها.

أوسط مقاييس الانتشار هو معيار المدى.

يوضح المدى الانتشار الكامل لقيم البيانات والذي يمكن أن يتضمن القيمة المنطرفة والتي قد تزيد المدى بشكل كبير، وبالتالي تعطي فكرة خاطئة عن انتشار قيم البيانات.

مثال (١)

أوجد المدى لقيم البيانات التالية:

١٤١٦١٩٦١٢١٠، ٨، ٧	٤٧١٨٤٢٠، ١١، ١٠، ١٥، ١٢
١	٢

الحل:

١. المدى = ١٤ - ٦ = ٨
٢. المدى = ١٠ - ٤٧ = ٣٧

٣. القيمة المنطرفة ٤٧ أعطت مدى كبيراً جداً لانتشار القيم.

حاول أن تحل

١. أوجد المدى لقيم البيانات التالية:

٥٩، ٨٤، ٤٥، ٤٠، ٣٥، ٥٧	١٢٤، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٨، ١٧٣، ١٢٥
١	٢

لكي تتجاهل المدى الكبير الناتج عن القيمة المنطرفة في قيم البيانات نستخدم الأرباعيات والمدى الأرباعي.

الأرباعيات Quartiles

يقسم الوسيط قيم البيانات إلى تصنفين وتقسم الأرباعيات قيم البيانات إلى ٤ أربع ومنها تستنتج:

١. الأرباعي الأول، وهو وسيط النصف الأدنى من قيم البيانات ويسمى الأرباعي الأدنى.
٢. الأرباعي الثاني، وهو وسيط قيم البيانات ويسمى الوسيط.
٣. الأرباعي الثالث، وهو وسيط النصف الأعلى من قيم البيانات ويسمى الأرباعي الأعلى.
٤. المدى الأرباعي = ر - ر.

تسمى (القيمة الصغرى، الأرباعي الأدنى، الوسيط، الأرباعي الأعلى، القيمة العظمى) «مجمل الأعداد الخمسة».

بين الجدول التالي نتائج الدوري الكوبي الممتاز لكرة القدم ٢٠١٢ - ٢٠١١.

الفريق	القاعدية	النصر	الشباب
١	١٧	٢٢	٢٤
٢	٢٥	٣٣	٤٠
٣	٥١		
٤			

١. رتب هذه القيم تصاعدياً.
٢. أوجد قيمة المدى.
٣. أوجد قيم الوسيط والأرباعيات (الأدنى والأعلى والمدى الأرباعي).
٤. اكتب «مجمل الأعداد الخمسة».

يلاحظوا جيداً انتشار البيانات داخل الصندوق وخارج حجمه وكيفية اقترابهم من الوسيط أو بعدهم عنه. اطلب إليهم إيجاد النسبة المئوية من البيانات بين الأربعين الأدنى والوسيط وبين الأربعين الأعلى والوسيط وفي كل مرة أسلهم عن ملاحظاتهم. مثال (٣).

في المثال (٤)، إن مقارنة البيانات عن طريق رسم خطوط الصناديق جنباً إلى جنب تساعد كثيراً على مقارنة هذه البيانات وكيفية انتشارها.

٦ الرابط

الأمثلة (٢)، (٣)، (٤) تربط بين البيانات والمفاهيم والمهارات في هذا الدرس.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخاطئ الطالب في تحديد الأربعين الأدنى والأربعين الأعلى. أكّد لهم أن الوسيط يقسم البيانات إلى قسمين متساوين، واطلب إليهم تلوين قيمة الوسيط، ثم تحديد وسيط النصف الأدنى ووسط النصف الأعلى.

٨ التقييم

تابع الطلاب وهم يجيبون عن الأسئلة في فقرات «حاول أن تحل» لتأكد من حسن أدائهم ومن فهمهم لكل ما ورد.

اختبار سريع

تبين من دراسة لأعمر الصغار في إحدى مراكز الحضانة بالسنوات ما يلي: ٣، ٤، ٣، ٤، ٤، ٥، ٣، ٢، ٣، ٤، ٤، ٣، ٥، ٣، ٤، ٣، ٣، ٢، ٥، ٥، ٥، ٤، ٤، ٣، ٣، ٢، ١٧. رتب قيم البيانات تصاعدياً.

$$5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 9, 8, 6, 4, 7, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.$$

أوجد قيم الوسيط، الوسيط الأدنى، الوسيط الأعلى ثم اكتب القيم الخمس.

الإجابة: الوسيط = ٥، الوسيط الأدنى = ٣، الوسيط الأعلى = ١٧.

٢ مثل هذه البيانات بالصندوق ذي العارضتين. ماذا تلاحظ؟



الإجابة: التمثيل بالصندوق

يلاحظ أن الأعمار بالسنوات في مركز الحضانة تتقارب أكثر بين ٣ سنوات و ٥ سنوات أي بين الوسيط الأدنى والوسيط.



الملل:
١٤٠، ٣٣، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ١٧، ١٤
المدى: ١٤ - ٣٧ = ٣٧ (نلاحظ أن المدى كبير)
الوسيط (ر): $\frac{٢٤+٢٤}{٢} = ٢٤$
البيانات مع الوسيط: ٢٤، ٢٢، ١٧، ١٤
الأربعين الأدنى هو وسيط القيم: ٢٤، ٢٢، ١٧، ١٤
 $r = \frac{١٩+١٧}{٢} = ١٩, ٥$
الأربعين الأعلى هو وسيط القيم: ٥١، ٤٠، ٣٣، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ١٧، ١٤
المدى الأربعين = ١٩, ٥ - ٣٦, ٥ = ٣٣, ٥
٣. جمل الأعداد الخمسة: ٥١، ٣٦، ٥، ٢٤، ٥، ١٩، ٥، ٥١، ٤٠، ٣٣، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ١٧، ١٤
٤. ملاحظة: يمكن ترتيب قيم البيانات على الشكل التالي:
٥١، ٤٠، ٣٣، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ١٧، ١٤، ر = ١٧, ٥، ٢٤، ٥، ٣٦, ٥
حاول أن تحل

٢. بين الجدول التالي نتائج الدوري الكويتي لكرة القدم لـ ٢٠١٠ - ٢٠١١.

الفريق	القاعدية	العرب	الكويت	كاظمة	الظهراء	النصر	السالية	الشباب
القطان	٤٧	٤٧	٣٩	٣٨	١٩	١٦	١٤	١٢

١. أوجد الوسيط والمدى والأربعينات والمدى الأربعين لقيم هذه البيانات.
٢. اكتب «جمل الأعداد الخمسة».

Box Plot
مخطط الصندوق هو تمثيل بياني يصنف جمل الأعداد الخمسة لقيم البيانات وهو يتكوّن من مستطيل مرکزي (الصندوق) يمثل الأربعين الأدنى، ر، الوسيط، والأربعين الأعلى، ر، ويفصل بينهما مثباتان تمثّلان القيمة الصغرى والقيمة العظمى ونسبيهما العارضين.

١٧٢

التاريخ المجري: التاريخ الملادي: التاريخ الميلادي:

الأربعينات
Quartiles


المجموعة ١٢ تمارين أساسية

- (١) أوجد المدى لقيم البيانات التالية:
١٧, ٢٤, ٥, ١٠, ٩, ٨, ٦, ٤, ٧, ٣, ٤.

(٢) أوجد جمل الأعداد الخمسة للبيانات: ٦٢، ٩٥، ٦٤، ٦٦، ٦٥، ٥٩، ٥٤، ٥٠، ٦٠، ٥٢.

- (٣) أوجد جمل الأعداد الخمسة لقيم التالية التي تمثل أوزان أكياس من الأرز: ٢٣، ١٧، ١٣، ١٢، ١١، ٥٠، ٢٧، ٢٦.

- (٤) ارسم مخطط الصندوق ذي العارضتين لقيم البيانات في (١). ماذا تستنتج؟ اشرح.



١٠٢

٩ إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

$$١٤ = ٥ - ١٩ \quad ١$$

$$، ١١، ١٠، ١٠، ١٠، ٩، ٩، ٨، ٧، ٦، ٦، ٥ \quad ٢$$

$$، ١٧، ١٦، ١٦، ١٥، ١٥، ١٤، ١٤، ١٤، ١٣، ١٢ \\ . ١٩، ١٨، ١٧، ١٧ \quad ٣$$

$$\frac{١٣ + ١٢}{٢} = ١٢, ٥ \quad (الوسط).$$

$$(أ) الوسيط الأدنى = \frac{١٠ + ٩}{٢} = ٩, ٥$$

$$(ب) الوسيط الأعلى = \frac{١٦ + ١٥}{٢} = ١٥, ٥$$

٥ القيمة الصغرى (٥)، الوسيط الأدنى (٩، ٥)، الوسيط (١٢، ٥)، القيمة الأعلى (١٥، ٥)، الوسيط الأعلى (١٥، ٥)، القيمة العظمى (١٩). (١٩)

«حاول أن تحلل»

$$١٩ = ٤٠ - ٥٩ \quad ١$$

$$٥٢ = ١٢٤ - ١٧٦ \quad (ب)$$

$$(أ) ترتيب البيانات: ١٢، ١٤، ١٢، ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ٤٧، ٣٩، ٣٨، ١٩، ١٦، ١٤ \quad ٢$$

$$\text{الوسط} = \frac{٣٨ + ١٩}{٢} = ٢٨, ٥$$

$$\text{المدى} = ١٢ - ٥١ = ٣٩$$

$$\text{الأربعيني الأدنى} = \frac{١٦ + ١٤}{٢} = ١٥$$

$$\text{الأربعيني الأعلى} = \frac{٤٧ + ٣٩}{٢} = ٤٣$$


$$\text{المدى الأربعيني} = ١٥ - ٤٣ = ٢٨$$

$$(ب) مجمل الأعداد الخمسة = (٥١، ٤٣، ٢٨، ٥، ١٥، ١٢). (٥١، ٤٣، ٢٨، ٥، ١٥، ١٢)$$

٤) بيان الجدول التالي تواريخ وأطوال الأعاصير التي اجتاحت إحدى المدن في سنة ١٩٩٥.

		التاريخ						
		٦/٩	٦/٨	٥/٧	٥/٦	٤/١٩	٤/١٨	٤/١٧
		٩	٨	١٠	٢٠	١١	٧	٣
طول العاصفة (بالكيلومتر)								

ارسم خطوط الصندوق ذي العارضتين. وفسر النتائج.



في القارئين (٥-٥)، ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (٢) إذا كانت العبارة خاطئة.

(٥) إذا كان المدى لمجموعة من القيم يساوي ١٠ وكانت أصغر قيمة من هذه القيم هي ٢ فإن أكبر قيمة تساوي ١٢.

(٦) إذا كان المدى لمجموعة القيم ٣، ٢، ٨، ٧، ٣، س يساوي ١٥ فإن س = ١٣.

(٧) للفيم ١٤، ٢٥، ١٧، ٢٤، ٢٢، ٣٣، ٤٠ يكون الأربعيني الأعلى لا يساوي $\frac{١}{٣}$. (١)

في القارئين (١٠-٨)، اختر الإجابة الصحيحة.

(٨) في البيانات: ١٧، ٣٠، ١٧، ٢٤، ٢٠، ٢٨، ١٥، ١٢، ٢٥، المدى الأربعيني الأدنى هو:

(أ) ١٧ (ب) ١٦ (ج) ١٥ (د) ٢٢

(٩) في البيانات: ١٨، ١٨، ١٤، ٢٦، ٣٠، ١٢، ٢٦، المدى الأربعيني هو:

(أ) ١٦ (ب) ١٨ (ج) ١١ (د) ٢٧

(١٠) في البيانات: ١٠، ١١، ٧، ٤، ١٧، ٦، ٤، ١٤، ١٥، ٩، ١٣، مجمل الأربعيني هو:

(أ) ١٧، ١٤، ١١، ٦، ١١، ٧، ٤، ٤ (ب) ١٧، ١٤، ١١، ٦، ١١، ٦، ١١، ٦ (ج) ١٧، ١٤، ١١، ٧، ٤ (د) ١٧، ١٤، ١١، ٦، ١١، ٦

٢ خطط الصندوق للبيانات الموجدة في فقرة

«حاول أن تحل (٢)»

يمكن رسم خططين لصندوقين مقابلين للتالي:

مثال (٤)

تمثل المجموعة الأولى بيانات معدل مصروف المنزل الشهري على الطعام بالدولار الأمريكي في ١٢ بلدًا أوروبياً:
 $350, 380, 560, 590, 490, 470, 520, 450, 420, 310$

تمثل المجموعة الثانية بيانات معدل مصروف المنزل الشهري على الطعام بالدولار الأمريكي في ١٢ بلدًا عربياً:
 $760, 190, 1190, 1100, 830, 220, 800, 900, 370, 700, 650, 1050$

١ رتب البيانات بطريقة تصاعدية.

٢ أوجد الوسيط والأربعيني الأدنى والأعلى لكل مجموعة من البيانات بالإضافة إلى القيمة الصفر والقيمة الأكبر لكل مجموعة من البيانات.

٣ ارسم خططين لصندوقين مستخدماً البيانات المرتبة تصاعديًا لكل من المجموعتين الأولى والثانية.

٤ قشر الناتج.

الحل:

١ المجموعة الأولى بحسب الترتيب تصاعدي:

$350, 380, 560, 590, 490, 470, 520, 450, 420, 310$

المجموعة الثانية بحسب الترتيب تصاعدي:

$760, 190, 1190, 1100, 830, 220, 800, 900, 370, 700, 650, 1050$

٢ القيمة الصفرى = 310 ، وسط المجموعة الأولى = $\frac{490 + 470}{2} = 480$ ،

الأربعيني الأدنى = 400 ، والأربعيني الأعلى = 575 ،


القيمة الكبرى = 750 ،

القيمة الصغرى = 190 ، وسط المجموعة الثانية = $\frac{800 + 760}{2} = 780$ ،

الأربعيني الأدنى = 510 ، والأربعيني الأعلى = 975 ،

القيمة الكبرى = 1190 ،

١٧٤



نلاحظ توزيع متقارب بين الوسيط والأدنى
والوسيط الأعلى وذلك لنقاط الفرق.

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) أوجد مجمل الأعداد الخمسة للبيانات التالية:

٨٠، ٧٧، ٦٧، ٦٤، ٦٢، ٥٨، ٤٩

(ب) ١١٠، ١٠٩، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠

(ج) ٢٠، ١٩، ١٩، ١٧، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١

(٢) بيّن الجدول التالي عدد أكبر الزلازل التي حدثت في العالم حيث قوتها تحضّت ٧ درجات على مقياس ريختر وذلك بين ١٩٨٥ و١٩٩٤.

السنة	عدد الزلازل
١٩٩٤	١٥
١٩٩٣	٣٣
١٩٩٢	١١
١٩٩١	١٣
١٩٩٠	٧
١٩٨٩	٨
١٩٨٨	١١
١٩٨٧	٦
١٩٨٦	١٤
١٩٨٥	٦

(أ) أوجد مجمل الأعداد الخمسة لقيم هذه البيانات.

١٠٤


(أ) ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠

الأعداد الخمسة = (٤، ٥، ٦، ٧، ٩)

(ب) ١٢، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٠، ٣٨

الأعداد الخمسة = (٥، ٦، ٩، ١٣، ١٩)

مخطط الصندوق جنباً إلى جنب.



٤) الصندوق الذي يمثل الدول العربية أطول من الصندوق الذي يمثل الدول الأوروبية ما معناه أن هناك تبايناً في المصرف الشهري بين الدول العربية والدول الأوروبية على الطعام. ففي الدول الأوروبية نجد أن الوسيط أقرب إلى الأربعين الأدنى وهو أبعد من الأربعين الأعلى مما يدل على أن المصرف على الطعام أقرب إلى المدai بـ ٤٥٠ دولاراً شهرياً علماً أنه لا يوجد قيماً متناظرة لأن المدى يساوي:

$$440 - 310 = 750$$

أما في مجموعة الدول العربية الوسيط أقرب إلى الأربعين الأعلى من الأربعين الأدنى مما يعني أن المجتمعات العربية تتفق كثيراً على الطعام حوالي ٧٨٠ دولاراً شهرياً، ولكن نجد أيضاً أن هناك تفاوت كبير في المجتمعات العربية لأن المدى يساوي:

$$1190 - 190 = 1000$$


ما يدل على التفاوت الاجتماعي في الدول العربية.

حاول أن تحل

٤) ارسم مخططين صندوقين لقيم البيانات التالية وفتر الناتج:


$$6, 10, 9, 5, 4, 8, 7$$

$$38, 19, 16, 5, 13, 10, 12$$



١٧٥

(ب) ارسم مخطط الصندوق ذي العارضتين لقيم هذه البيانات بدون القيمة المطردة.




(٣) بيان الجدول التالي معدل دخل الفرد السنوي في بعض الدول العربية بالدولار الأميركي بحسب البنك الدولي
(أعداد تقريبية).

الدولة	الإمارات العربية المتحدة	السعودية	الكويت	سلطنة عمان	دولة قطر	لبنان	الأردن	تونس	سوريا	البحرين
٢٤	١٠	٢٢	٩	٢٩	٦	٢	٣	١	١٤	

(١) أوجد مجمل الأعداد الخمسة لقيم هذه البيانات.

(ب) ارسم مخطط الصندوق ذي العارضتين لقيم هذه البيانات. ماذا تستنتج؟ اشرح.



١٠٥

ونتيجة لذلك، يساعد الانحراف المعياري لمجموعتين من البيانات على مقارنتهما لتحديد الأفضل بينهما، وهذه العملية تستخدم في الإنتاج بين عدة مصانع لسلعة واحدة كما في المثال (٢).

٦ الرابط

يربط المثالان (٢) ، (٣) بين التباين والانحراف المعياري والمواصفات الحياتية، حيث تظهر أهمية استخدام هذا المؤشر في عملية الإحصاء لتوقع نتائج واتخاذ قرارات مناسبة.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد ينقطع الطلاب في استخدام الآلة الحاسبة عند إدخال البيانات، ساعدهم على فهم برنامج كل آلة حاسبة وكيفية استخدامها ليحصلوا على نتائج صحيحة.

٨ التقسيم

إن متابعة الطلاب وهم يجيبون عن الأسئلة في فقرات «حاول أن تحل» توضح للمعلم قدرة الطالب على التفاعل مع مفاهيم هذا الدرس ومهاراته.

اختبار سريع

أخذت عينة من الطلاب في القسم الثانوي لدراسة الأعمار بالسنوات فكانت النتائج كما يلي: ١٦، ١٥، ١٤، ١٥، ١٥، ١٧، ١٨، ١٥، ١٨، ١٧

١) أوجد المتوسط الحسابي لأعمار الطلاب س.

$$\bar{S} = \frac{18 \times 4 + 14 \times 2 + 16 \times 15 + 17 \times 10}{16}$$

$$= \frac{160}{16} = 10$$

٢) كون جدولًا يبين ت_ر(س_ر - س)² والمجموع.

س _ر	ت _ر	س _ر - س	ت _ر (س _ر - س) ²
٤	= ٢(٢-١)	٢-	١
٤	= ٢(١-٤)	١-	٤
	٠	٠	١
٢	= ٢(١٢)	١	٢
٨	= ٢(٢)	٢	٢
المجموع		١٨	١٨

مثال (٢)

يمكن استخدام الآلة الحاسبة بين الجدول التالي عند الساعات الفصوصي لعمر ٧ مصابيح كهربائية بالساعات من إنتاجين مختلفين.

٩٧٠	٩٦٠	٩٤٠	١٠٣٠	١٠٠٠	٩١٠	١٠٥٠	١٣٧	إنتاج (أ)
٨٧٠	١١٨٠	١٠٥٠	٩٦٠	٩٧٠	٧٠٠	١١٣٠	١٣٧	إنتاج (ب)

١) أوجد المتوسط الحسابي سٌ للإنتاج (أ) والمتوسط الحسابي مٌن للإنتاج (ب).
 ٢) أوجد ويسط الإنتاج (أ) ثم ويسط الإنتاج (ب).
 ٣) سببين الحجيات في السؤالين (أ، ب) أن المتوسط الحسابي في الإنتاجين هو نفسه وأن الوسيط في الإنتاجين هو نفسه.
 أوجد الانحراف المعياري سٌ في الإنتاج (أ) والانحراف المعياري مٌن في الإنتاج (ب). ماذا تستنتج؟
 أي إنتاج هو الأفضل؟

الحل:

$$\bar{S} = \frac{970 + 960 + 940 + 1030 + 1000 + 910 + 1050}{7} = 980$$

$$\bar{M} = \frac{870 + 1180 + 1050 + 960 + 970 + 700 + 1130}{7} = 980$$

١٧٨

٣-١٠

التاريخ الميلادي: التاريخ المجري:

الانحراف المعياري
Standard Deviation

المجموعة # تمارين أساسية

(١) أوجد الانحراف المعياري لقيم البيانات التالية (يمكن استخدام الآلة الحاسبة):
 ٦٦، ٧٠، ٥٤، ٤٣، ٥٢ (١)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(ب) ١٥، ١٠، ٨، ١٥، ١٢، ١٧، ٢١

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

١٠٦

٣ استنتاج التباين والانحراف المعياري.

$$\text{التباین مع}^2 = \frac{18}{10}$$

$$\text{الانحراف المعياري مع} = \sqrt{1.8} \approx 1.87$$

٤ إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

(أ) المتوسط الحسابي في الجدول الأول: $\bar{x} = 14$

(ب) المتوسط الحسابي في الجدول الثاني: $\bar{x} = 14$

(ج) إن الطلاب الأوائل في الشعبتين لديهم نفس معدل الدرجات لذا لا يمكن تحديد الشعبة الأفضل من خلال \bar{x} و s

(د) شعبية (أ)

$(\bar{x} - \bar{s})^2$	$\bar{x} - \bar{s}$	\bar{s}
٤	٤-	١٠
٢	٢-	١٢
٤	٢-	١٢
١	١-	١٣
٠	٠	١٤
١	١	١٥
٩	٣	١٧
٢٥	٥	١٩
المجموع = ٦٠		

شعبية (ب)

$(\bar{x} - \bar{s})^2$	$\bar{x} - \bar{s}$	\bar{s}
٩	٣-	١١
٤	٢-	١٢
١	١-	١٣
٠	٠	١٤
٠	٠	١٤
١	١	١٥
٤	٢	١٦
٩	٣	١٧
المجموع = ٢٨		

١٧٩

نلاحظ أن مع بساوي مع، تقريباً.

للتباين (ب) الشتت عن المتوسط الحسابي كبير وبالتالي المصايب الكهربائية في التباين (أ) هي الأفضل.

معلمة:

من المتغير عليه عند الإحصائيين أنه كلما كان الانحراف المعياري صغيراً كلما كان تشتت قيم البيانات أقرب إلى المتوسط الحسابي، وكلما كان كبيراً كان تشتت قيم البيانات بعيداً عن المتوسط الحسابي.

حاول أن تصل

لتكن (أ)، (ب) مجموعتين من البيانات

(أ): ٢٠، ١٩، ٨، ١٥، ٧، ١٠، ١٢،

(ب): ١٩، ١١، ٨، ٩، ١٢، ١٨، ١٤

١ أوجد المتوسط الحسابي \bar{x} لقيم (أ) والمتوسط الحسابي \bar{x} لقيم (ب). ماذا تلاحظ؟

٢ أوجد وسبيط قيمة المجموعة (أ)، ثم وسبيط قيمة المجموعة (ب). ماذا تلاحظ؟

٣ أوجد الانحراف المعياري مع، لقيم المجموعة (أ) والانحراف المعياري مع، لقيم المجموعة (ب). أي القيم أقل تشتت عن متوسطها الحسابي؟ اشرح إجابتك.

ملاحظة: لحساب التباين لقيم بيانات في جدول تكراري ذو فئات متغير مع، هي مركز الفئة.

مثال (٣)

يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لدرجات طالب في امتحان نهاية العام الدراسي حيث النهاية المعنوية ١٠٠ درجة.

الفئة (درجات)	التفكر
-٨٠	-٦٠
-٤٠	-٢٠
-٢٠	-٠
٠	٤
٦	١٦
١٦	٢٤
٢٤	١٠

أوجد المتوسط الحسابي \bar{x} والتباين مع^٢ والانحراف المعياري مع لقيم هذه البيانات.

١٨٠

«حاول أن تحل»

١ نوجد أولاً المتوسط الحسابي $\bar{x} = 6$

نكون الجدول:

$S_r - \bar{S}$	$(S_r - \bar{S})^2$	$S_r - \bar{S}$
٩	٣	٩
١	١	٧
٤	٢	٨
٠	٠	٦
٤	٢	٤
١٦	٤	٢

المجموع = ٣٤

$$\text{م} = \frac{34}{6}$$

الانحراف المعياري $\sigma = 2.38$

٢) (٤، ١٩، ١٥، ١٢، ١٠، ٨، ٧، ٢٠)

٣) (١٩، ١٨، ١٤، ١٢، ١١، ٩، ٨)

٤) $S = 13$

البيانان (٤) و (٣) لها المتوسط الحسابي نفسه وهو ١٣.

٥) وسیط قیم (٤) = ١٢

وسیط قیم (٣) = ١٢

وهما أيضًا الوسیط نفسه وهو ١٢.

٦) للمجموع (٤)

$S_r - \bar{S}$	$(S_r - \bar{S})^2$	$S_r - \bar{S}$
١	١	١٢
٩	٩	١٠
٣٦	٦	٧
٤	٤	١٥
٢٥	٥	٨
٣٦	٦	١٩
٤٩	٧	٢٠

$$\sigma = \sqrt{\frac{160}{7}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{160}{7}} = 4.8$$

$\sigma \approx 4.8$

الحل:

$$\bar{x} = \frac{360}{60} = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

المتوسط الحسابي: $\bar{x} = 6$

.. $S = \sqrt{3}$

الفئة	مركز الفئة	عدد التكرار	القطر	$(S_r - \bar{S})^2$	$(S_r - \bar{S})$
-١٠	-٥	٤٠	٤	١٠	-٠
-٣٠	-٢٠	١٨٠	٦	٣٠	-٢٠
-١٠	١٦	٨٠	١٦	٥٠	-٤٠
١٠	٢٤	١٦٨٠	٢٤	٧٠	-٦٠
٣٠	٩٠	٩٠٠	٩٠	٩٠	-٨٠
المجموع:	٣٦٠	٣٦٠	٦٠	٣٦٠	٣٦٠

$$\text{البيان} = \frac{473 \frac{1}{3}}{60} = \frac{28400}{60} = \frac{28400}{\sqrt{3}}$$

البيان = $\sqrt{473 \frac{1}{3}}$

الانحراف المعياري: $\sigma = \sqrt{473 \frac{1}{3}}$

حاول أن تحل

٢) يبين الجدول التالي التوزيع التكراري لأوزان طالب ثانوي (الوزن بالكيلوجرام).

الفترة	النكرار	٤٢	١٨	٥	٨	٢٧	-٧٢	-٦٨	-٦٤	-٦٠	-٧٢	٧٦
٤٢	١٨	٥	٨	٢٧	-٧٢	-٦٨	-٦٤	-٦٠	-٧٢	٧٦	٤٢	

أوجد المتوسط الحسابي S والانحراف المعياري σ لهذه الأوزان.

١٨١

(٢) يبين الجدول التالي الطاقة الكهربائية المستهلكة بالميغاواط / ساعة خلال خمسة أيام متالية في إحدى المدن.

اليوم	الطاقة المستهلكة
٥	٤٩,٩
٤	٤٦,٦
٣	٥٢,٣
٢	٥٣,٢
١	٤٨,٠

أوجد البيانات والانحراف المعياري لقيم هذه البيانات.

(٣) يمثل الجدول التالي الاستهلاك الأسبوعي من البنزين لعينة مكونة من ٥ سيارة لأقرب لتر.

السيارات	النكرار	٦	٧	٨	٩	-٤٥	-٤٠	-٣٥	-٣٠	-٢٥	-٢٠	٥	١٤	١٠	٦	٧	٤	٥
٦	١٤	١٠	٨	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٥	١٤	١٠	٦	٧	٤	٥

أوجد المتوسط الحسابي S والانحراف المعياري لاستهلاك السيارات من البنزين.

(٤) يبين الجدول التالي التوزيع التكراري لدرجات ٢٠ طالباً في أحد الاختبارات حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة.

النكرار	النكرار	٦	٧	٥	٤	-١٦	-١٢	-٨	-٤
٢	٦	٧	٥	٤	٣	-١٦	-١٢	-٨	-٤
١٨	١٤	١٠	٦	٣	٢	٢	٦	٧	٤

أوجد الانحراف المعياري لدرجات الطلاب.

١٠٧

١٥١

للمجموعة (ب)

ص _r	ص _r - ص	ص _r - ص ²
١	١	١٤
٢٥	٥	١٨
١	١-	١٢
١٦	٤-	٩
٢٥	٥-	٨
٤	٢-	١١
٣٦	٦	١٩

$$\text{متوسط} = \frac{\sum x}{n} = \frac{108}{7} \approx 15.4$$

يعتبر تشتت القيم في المجموعة الثانية أفضل من تشتت القيم في المجموعة الأولى.

$$\text{متوسط} = \frac{(70, 6 - 70)(42 + (70, 6 - 66)(18 + (70, 6 - 62)27 + (70, 6 - 78)8 + (70, 6 - 74)27 + 15, 16)}{100}$$

$$= 3,9$$

الانحراف المعياري ٣,٩ صغير، وبالتالي أوزان هؤلاء الطلاب متقاربة جداً من المتوسط الحسابي ٧٠,٦.

- في التمرينين (٦-٥)، طلّل (١) إذا كانت العبارة صحيحة وطلّل (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.
- (٥) مجموع انحرافات مجموعة من القيم عن متوسطها الحسابي يساوي صفراً.
- (٦) إذا كان الانحراف المعياري لمجموعة قيم يساوي ٣ وكان مجموع مربعات انحرافات هذه القيم عن متوسطها الحسابي يساوي ١٨٠ فإن عدد القيم هو ٦.

- في التمرينين (٨-٧)، اختر الإجابة الصحيحة.
- (٧) في البيانات: ١٥, ١٣, ١٠, ١٢, ٧, ٩، الانحراف المعياري هو:
- (أ) ٦ (ب) ٧ (ج) $\sqrt{7}$ (د) ليس أيٌ مما سبق
- (٨) إذا كان الانحراف المعياري لمجموعة قيم بيانات يساوي ٤ ومجموع مربعات انحرافات قيم البيانات عن متوسطها الحسابي يساوي ١٩٢ فإن عدد قيم هذه البيانات هو:
- (أ) ٤٨ (ب) ١٦ (ج) ١٢ (د) ليس أيٌ مما سبق

المجموعة ب تمارين تعزيزية

- (١) أوجد الانحراف المعياري لقيم البيانات التالية، ماذا تنتهي؟
 .٣,٩,٨,٤,٦,٧,٥ (أ)

٤) $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

$$\text{القاعدة: } \bar{x} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$\text{بالتعميض: } \bar{x} = \frac{480}{n}$$

$$\text{ومنه } n = \frac{480}{\bar{x}}$$

عدد قيم هذه البيانات هو ٣٠.

(ب) .٣٩، ٤٤، ٤٣، ٣٦، ٤٢، ٣٧، ٤٥، ٣٤

١٠٩

(٢) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لاستهلاك الطاقة الكهربائية بالميغاواط/ ساعة طيلة شهر أغسطس في إحدى المدن:

النكرار	الكمية
٥	٤٢
٨	٣٣
٦	٣٦
٦	٣٩
٤	٤٠
٤	٤١
٥	٤٢

(أ) أوجد المتوسط الحسابي.

(ب) أوجد التباين والانحراف المعياري لقيم هذه البيانات باستخدام الآلة الحاسبة.

(٣) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لكتمة المياه بالستينات الموجودة في ١٠٠ عبوة.

سعة العبوة الواحدة المفترضة ١٠٠ سنتيلتر.

الفترة	النكرار
-١٠٦	٥
-١٠٢	٩
-٩٨	٣٢
-٩٤	٣٩
-٩٠	١٠
-٨٦	٥

أوجد المتوسط الحسابي، التباين، الانحراف المعياري لقيم هذه البيانات.

١١٠

٤-٤: طرق العد

طرق العد Methods of Counting

٤-١٠

دعا نفك ونتناقش

يقوم خالد برمي حجري نرد معاً مرة واحدة، الأول لونه أحمر والثاني لونه أخضر.
انظر الشكل أدناه.

١. مم يتألف كل نتاج؟
٢. اكتب كل نتائج ضاء العينة في قائمة.
٣. ما عدد النواتج الممكنة؟
٤. ما النتائج التي تشكل الحدث ارجعي نرد بما يحيث يكون مجموع العدددين الظاهرين يساوي ٤٦٩؟

كانتا تعرفن كيف نعد، ولكننا سترى في هذا الدرس على طرق للعد أكثر تطوراً.
مبدأ العد هو في صلب المفهوم، ويتضمنه عدد دراسة الحالات.
المزيد من المسائل البسيطة أو المقدمة تتطلب تحديد عدد عناصر مجموعة أو الطرق التي يمكن بها ترتيب أشياء أو تجميعها.

Counting Principle

مبدأ العد

يمكن أن نحل بعض مسائل العد عن طريق ترتيب المجموعة التي سوف نقوم بعدها. وسوف نبدأ بمثالين يتعلمان هذه الطريقة.

مثال (١) العد عن طريق القوائم

ما عدد الرموز ثلاثة الحروف التي يمكن تكوينها من بين المروفة: أ، ب، ج، دون تكرار لأي حرف منها؟
الحل:

أكتب قائمة بالامثليات بشكل مربذ (متوازي بحسب الترتيب):

أ ب ج	أ ب د	أ ج د	ب ج د
ب أ ج	ب أ د	ب د ج	ج أ د
ج أ ب	ج أ د	ج د ب	د أ ب
د أ ب	د أ ج	د ب ج	ج ب د

يوجد $6 \times 2 = 12$ إمكانية. يمكن كتابة ١٢ رمزاً.

حاول أن تحل

١. ما عدد الرموز التي يمكن تكوينها من حروف «نوف» من دون تكرار لأي حرف منها شرط أبداً الرمز بـ «أ»؟

١٨٣

إذا كان عدد الإمكانيات صغيرةً بما يكفي، فإن الشجرة البيانية يمكن أن تساعد في تنظيم مهمة العد.

مثال (٢) الشجرة البيانية

في تغزير على سلوك الحيوان، استخدم أيام النفس نوعين من الأطعمة على التوالي كمكافأة، كل مكافأة عبارة عن واحدة من ثلاثة أنواع ممكنة. كم عدد التشكيلات المختلفة الممكنة في حال كانت أنواع الحيوانات غير مكررة؟
الحل:

ميز بين الأنواع الثلاثة من الحيوانات كالتالي: أ، ب، ج.
الشجرة البيانية إلى السادس توضح كل الإمكانات. كل طريق عبر الشجرة البيانية بالإنجاء من اليمين إلى اليسار تقبل بتبايناً ممكنًا جدًا، لأن هناك ست طرق لذلك سيكون لدينا ست تشكيلات ممكنة.
لاحظ أن: $6 = 3 \times 2$.

حاول أن تحل

٢. يقدم أحد المطاعم وجبة مكونة من سلطة أو سلطة، دجاج أو سلطة، حلويات أو فاكهة.
استخدم الشجرة البيانية لإعطاء عدد الوجبات الممكنة.

يصبح استخدام خطط الشجرة البيانية غير عملي في حال كانت مجموعة الإمكانيات الجاري عدتها كبيرة. في مثل هذه الحالات نستخدم طريقة الغرب التي تقتضي بحددها العدد على الشجرة البيانية.

Counting Principle

مبدأ العد

إذا كان لدينا عملية مركبة يتعذر تجزئها إلى عدة عمليات متابلة عددها n وهي:

ـ n_1 ، n_2 ، \dots ، n_n . وإذا كانت:

ـ n_1 يمكن أن تحدث بـ m_1 طرق،

ـ n_2 يمكن أن تحدث بـ m_2 طرق،

ـ n_n يمكن أن تحدث بـ m_n طرق،

:

ـ يمكن أن تحدث بـ m طرق،

فإن عدد الطرق التي يمكن أن تحدث بها الإجراء ط هي:

ـ $m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

إن مثلاً حل مسائل مبدأ العد هو أن تحدد المراحل بـ n ، n_1, n_2, \dots, n_n . وب مجرد تعريفها، يتم تحديد عدد مرات حدوث كل منها، ومن ثم ضرب هذه الأعداد للحصول على عدد الطرق الممكنة حل المسألة.

١٨٤

١ الأهداف

- يحل مسائل باستخدام مبدأ العد.
- يحل مسائل باستخدام قوانين التباديل والتوافيق.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

مبدأ العد - التباديل - التوافيق.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة علمية - حاسوب - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

أسأل الطلاب الإجابة عما يلي:

- إذا أقيمت قطعة نقود معدنية منتظمة، فما هي النواتج الممكنة؟
- إذا أقيمت حجر نرد رقم من ١ إلى ٦، فما هي النواتج الممكنة؟
- إذا أقيمت قطعة نقود معدنية منتظمة ثم حجر نرد رقم من ١ إلى ٦، فما هي النواتج الممكنة؟
- بكم طريقة يمكنك تنظيم لونين مختلفين من أربعة ألوان: أصفر (ص)، أخضر (خ)، أسود (س)، أزرق (ز)؟

٥ التدريس

يساعد مبدأ العد على حل مسائل كثيرة تواجهه الطلاب عند دراسة احتفال حدث معين. لذا من المهم جداً متابعة عملهم في فقرة «دعا نفك ونتناقش» لمعرفة مدى قدرتهم على إيجاد فضاء العينة وترتيبها في قائمة منتظمة.

يبين المثال (١) الطريقة المتبعه والمطلولة في تنظيم قائمة لإيجاد فضاء العينة أو عدد النواتج الممكنة، وما يتطلبه ذلك من جهد وانتباه وتركيز. لذا كان من الضروري التوجه إلى مبدأ العد، الذي يوفر الوقت ويعطي النتيجة المتواخة بشكل سريع.

أخبر الطلاب أن خطط الشجرة البيانية يصبح دون فائدة إذا كانت العينة والحدث يتضمنان عناصر كبيرة العدد أيضاً. أما في المثال (٢)، فقد استخدم خطط الشجرة البيانية. يعطي المثال (٣) فكرة واضحة عن كيفية استخدام مبدأ العد.

١٥٤

أسأل الطلاب ما إذا كان ممكناً رسم مخطط شجرة بيانية أو تنظيم قائمة، لإيجاد نواتج لحدث يتكون من حرفين من بين ٢٨ حرفاً يتبعها ثلاثة أرقام من بين ١٠ أرقام. هنا تكمن أهمية فهم مبدأ العد وكيفية التعامل معه. يعالج المثال (٤) حالة حياتية مهمة في مضمار الرياضة. شجع الطلاب على رسم مخطط مشابه مع إعطائهم مثلاً آخر لتأكد من فهمهم مبدأ العد.

ركز على فهم التباديل أولاً، ثم كيفية استخدام القاعدة حسابياً، وبعد ذلك إيجاد النتائج على الآلة الحاسبة. ابدأ بمقدمة بسيطة تبين أمام الطلاب الفرق بين التباديل والتوافق. أكد لهم أن موقع العنصر وترتيبه في العملية الأولى مهم، أما في العملية الثانية فلا يهم موقع العنصر أو ترتيبه.

اربط ذلك بما عرفوه سابقاً، على سبيل المثال، الزوج المرتب (س، ص) الذي يحدد موقع نقطة في المستوى الإحداثي (٢، ٥) ≠ (٥، ٢)، ولكن المجموعة المكونة من عنصرين لا تتغير بتغيير موقع عنصريها {٥، ٢} = {٢، ٥}.

ويمكن أيضاً تعليم الفكرة إلى ثلاثة عناصر أو أكثر.

المهم توجيه الطلاب إلى قراءة النصوص جيداً لفهم ما إذا كان المطلوب هو إيجاد التباديل [اختيار: رئيس، نائب رئيس، أمين سر، أمين صندوق، كما في المثال (٥)] أو إيجاد التوافق [ما عدد اللجان المؤلفة من ثلاثة أشخاص اختارها من بين ٤ أشخاص، كما في المثال (٨)].

ساعدهم على فهم التوافق وإدراك علاقتها بالتباديل في القاعدة $\text{نـقـر} = \frac{ر!}{ن!}$.

أرشدهم إلى إيجاد الإجابة حسابياً أولاً عن طريق التبسيط، ثم باستخدام الآلة الحاسبة.

ناقش معهم أنواع النواتج في المثال (١١) لتأكد من أنهم قادرون على التمييز في النصوص لاستخدام التباديل أو التوافق.

٦ الربط

جميع الأمثلة في هذا الدرس هي من واقع الحياة، يواجهها الطالب في مواقف متعددة.

مثال (٣) استخدام مبدأ العد

تبدأ لوحات السيارات في إحدى المدن بحرف من الحروف الأبجدية يبيّنها ثلاثة أرقام. كم عدد اللوحات التي يمكن الحصول عليها؟ افترض أنه يوجد تكرار لأي من الحروف أو الأرقام في أي من لوحات التراخيص.

الحل:

يع: ختم اللوحة
يع: ختم الحرف الأول
يع: ختم الحرف الثاني
يع: ختم الرقم الأول
وهي كل الدلائل:
العمليات

عدد الطرق لاستكمال كل عملية :

$$\begin{array}{l} \text{يع: ختم اللوحة} \\ \text{يع: ختم الحرف الأول} \\ \text{يع: ختم الحرف الثاني} \\ \text{يع: ختم الرقم الأول} \\ \text{وهي كل الدلائل:} \\ \text{العمليات} \end{array}$$

عدد طرق ختم اللوحة = $4 \times 3 \times 2 = 24$ طريقة

يمكن الحصول على ٢٤ لوحة في هذه المدينة.

حاول أن تحل

٣ استخدم مطابق المثال (٣)، ما هو عدد اللوحات التي يمكن الحصول عليها إذا كان رقم الأحادي فردي؟

مثال (٤) استخدام مبدأ العد

يوجد ثانية متسابقين في سباق جري. ما هو عدد الناتج الممكن لهذا السباق؟ افترض عدم وجود تعادل بين أي متسابقين. على أي متسابقين وصل كلاً منهم إلى خط النهاية.

الحل:

يع: قائمة العدائين يرتقي إلها السباق.
يع: المتسابق الذي ينهي السباق أولاً.
يع: المتسابق الذي ترتيبه الثاني في إنتهاء السباق.

١٨٥

العمليات:

$$\begin{array}{l} \text{يع: ختم اللوحة} \\ \text{يع: ختم الحرف الأول} \\ \text{يع: ختم الحرف الثاني} \\ \text{يع: ختم الرقم الأول} \\ \text{وهي كل الدلائل:} \\ \text{العمليات} \end{array}$$

عدد الطرق لاستكمال كل عملية :

$$\begin{array}{l} \text{يع: ختم اللوحة} \\ \text{يع: ختم الحرف الأول} \\ \text{يع: ختم الحرف الثاني} \\ \text{يع: ختم الرقم الأول} \\ \text{وهي كل الدلائل:} \\ \text{العمليات} \end{array}$$

عدد الطرق لإجراء بع = $2 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 = 40320$

يوجد ٤٠٣٢٠ ناتجاً ممكناً لهذا السباق.

حاول أن تحل

٤ اشتراك ٢٠ في سباق للمهجن ووصلت جميعها إلى خط النهاية في أوقات مختلفة (أي أنه لا يوجد أي تعادل). ما هو عدد الناتج الممكن لهذا السباق؟

التباديل

في المثالين السابقين، كان الترتيب مهمًا ومحتملاً، مثل هذا الترتيب يسمى **التباديل**. عموماً عدد تباديل ن من الأشياء هو $N!$ (مضروب بـ $(N-1) \times (N-2) \times \dots \times 1$). فمثلًا $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$.

٥ اشتراك ٢٠ في سباق للمهجن ووصلت جميعها إلى خط النهاية في أوقات مختلفة (أي أنه لا يوجد أي تعادل).

ما هو عدد الناتج الممكن لهذا السباق؟

إيجاد عدد التباديل

افتراض أن $31!$ عصراً يمثل جميع الرياضات في مدرستك يريدون اختيار أربعة أشخاص لأربعة مناصب: رئيس، نائب رئيس، أمين سر، أمين الصندوق. حدد كم طريقة يمكن بها اختيار لهذه المناصب.

الحل:

اختبار الرئيس: طريقة
اختبار نائب الرئيس: طريقة
اختبار أمين السر: طريقة
اختبار أمين الصندوق: طريقة

عدد الطرق التي يمكن بها اختيار الأشخاص للمناصب الأربعة هو: $28 \times 29 \times 30 \times 31 = 755160$

حاول أن تحل

٥ في إحدى الجمعيات الخيرية يوجد ٢٠ عضواً يشكلون مجلس الأئمة. يريدون اختيار رئيساً، أميناً للسر، أميناً للصندوق.

حدد كم طريقة يمكن بها اختيار لهذه المناصب.

١٨٦

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

لا يميز الطالب في مبدأ العد بين التباديل والتوافق.
أعط أمثلة بسيطة واطلب إليهم من خلالها أن يحاولوا التمييز بينها.

٨ التقييم

إن متابعة الطلاب في الإجابة عن فقرات «حاول أن تحل» توضح للمعلم قدرة كل طالب على إيجاد التباديل أو التوافق وتطبيقاتها.

اختبار سريع

١ أخذ ٥ أشخاص المصعد من الطابق الأرضي في مبني من ٨ طوابق. بكم طريقة يمكن أن ينزل كل من الأشخاص الخمسة من المصعد في الطوابق على أن ينزل كل منهم في طابق مختلف عن الآخرين.

$$6720 = 5!$$

٢ ما عدد الكلمات التي يمكن تأليفها باستخدام ثلاثة أحرف مختلفة دون الاهتمام بالمعنى من أحد حرف كلمة سراب؟ $24 = 3!$

٩ إجابات وحلول

«دعنا نفك ونناقش»

(أ)، (ب)، (ج)، (د) تحقق من إجابات الطلاب.

«حاول أن تحل»

$$18 = 1 \times 2 \times 3 \times 3$$



عدد الوجبات الممكنة = $2 \times 3 \times 2 = 12$ وجبة ممكنة.



قانون التباديل Law of Permutations

عدد تباديل n من العناصر المختلفة مأخوذ منها في كل مرة هو:
 $n! = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)$, $r, n \in \mathbb{N}$, $r \leq n$
 عددياً: $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-r+1)$
 لاحظ: $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-r+1)$

$$\frac{n!}{(n-r)!} = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)}{(n-r)(n-r-1) \dots (n-r+1)} = 1$$

قانون $n! = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)$, حيث $n \in \mathbb{N}$, $r \leq n$.

مثال (٢) أوجد قيمة كل تبديل بدون استخدام الآلة الحاسبة بصورة مباشرة.

الحل: ١. الطريقة الأولى:


$$\frac{16!}{12!} = \frac{16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12!}{12!} = 16 \times 15 \times 14 \times 13 = 360$$

الطريقة الثانية:

$$360 = 3 \times 2 \times 5 \times 6 = 3 \times 2 \times 5 \times 3 \times 2 \times 1 = 4!$$

$$990 = 9 \times 10 \times 11 = \frac{11 \times 9 \times 10 \times 11}{18!} = \frac{11!}{(3-11)!}$$

$$11! = \frac{n!}{(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)(n-11)}$$



مثال (٧)

ما عدد الكلمات التي يمكن أن تتشكل من خمسة حروف مختلفة من الأبجدية العربية وذلك في حال عدم تكرار أي منها؟

الحل: المطلوب في المسألة إيجاد عدد التباديل لـ ٥ حروف من ٢٨ حرفًا في الوقت نفسه.

مساعدة: ترتيب الحروف مهم في كتابة الكلمات. ككلمة كتاب تختلف عن الكلمة كتاب.

حاول أن تحل!

٧ ما عدد الأعداد التي يمكن أن تتشكل من ٤ أرقام من أرقام النظام العشري بدون الصفر وذلك في حال عدم تكرار أي رقم؟

التوافق Combinations

عندما تزيد إيجاد عدد المجموعات الجزئية والمكون من منها من ر عنصر، والتي يمكن اختيارها من مجموعة مكونة من n عنصر ($n > r$) دون الاعتماد على الترتيب فنحسب التوافق.

مثال (٨)

ما عدد اللجان المكونة من ثلاثة أشخاص، والتي يمكن تكوينها من مجموعة من أربعة أشخاص؟

الحل: شرط الأشخاص الأربع أ. ب، ج، د ثم قيام باعتبار قائمة كتيلك الموجودة في المثال (١) وذلك كالتالي:

لاحظ أن هناك آلة حاسبة، ترتيبها ٢٤ تمكنها لاختيار ثلاثة منها.

$$\text{عدد الطرق الممكنة} = 8 \times 9 \times 5 \times 27 \times 28 = 272,160$$

٢٧٢ ١٦٠

$$\text{أوجد} ! 20 = 2,432,902,008 \dots \text{أو}$$

$$1810 \times 2,432,902,008$$

$$\text{أوجد: } 18 \times 19 \times 20 = \frac{!20}{!17} = \frac{!20}{!(3-20)}$$

٦٨٤٠ طريقة

$$60 = 3 \times 4 \times 5 = \frac{!5}{!(3-5)}$$

$$(b) 11^4 = 7 \times 8 \times 9 \times 10 = \frac{!10}{!(4-10)}$$

$$(ج) 11^5 = \frac{!n}{!(n-4)} = n(n-1)(n-2)(n-3)$$

مثال (٩)

إذا كان فريق كرة سلة يتكون من ١٢ لاعباً، في عدد الفرق المختلفة التي يمكن تكوينها من خمسة لاعبين من بين لاعبي هذا الفريق (يمكن لأي لاعب اللعب في كل المراكز)؟

الحل:

يجب أن يوجد (١٢) وهي عدد الفرق المختلفة المكونة من ٥ لاعبين واللذين يمكن اختيارهم من ١٢ لاعباً.

٧٩٢ = $5 \text{ nCr shift } 792$ عدد استخدام الآلة الحاسبة ١٢

يوجد (٧٩٢) فريقاً مختلفاً، كل فريق مكون من ٥ لاعبين وتم اختيارهم من بين ١٢ لاعباً.

حاول أن تحل

٤ إذا كان فريق كرة قدم يتكون من ٢٠ لاعباً، في عدد الفرق المختلفة التي يمكن تكوينها من ١١ لاعباً من بين لاعبي هذا الفريق؟ (يمكن لأي لاعب اللعب في أي مركز)

مثال (١٠)

ضرططع العديد من الآلات الحاسبة أن تخطئ "ق" بـ"ب" مباشرة من دون ضرورة لإثبات الخطوات الوسطية، وعلى الرغم من ذلك فتحت نوافذها هنا لأنها قد تساعدك في بعض الأحيان التي تكون فيها الأعداد كبيرة بحيث يصعب أن تعيطي إجابة دون استخدام الآلة الحاسبة. وفي حالة الأعداد الكبيرة جداً قد لا تساعدك بعض الآلات الحاسبة مثل ...، ففيما يلي القانون.

٣٠٤٠ = 10 nCr 51 عدد استخدام الآلة الحاسبة ١٠

١,٢٧٧٧٧٧١١٨٧٠ = 10^{10} عدد المواجهات المختلفة الممكنة هو ١٢٧٧٧٧٧١١٨٧٠

١٩٠

٤-١٠

طرق العد Methods of Counting

المجموعة # تمارين أساسية

في التمارين (١-٣)، اكتب قائمة بكل الإمكانيات أو ارسم شجرة بيانية للإجابة عن الأسئلة التالية:

(١) كليات مكونة من ثلاثة حروف: ما عدد الكلمات المختلفة التي تستطيع تكوينها من بين ثلاثة حروف: ع، ل، م، دون تكرارها (دون الاهتمام بالمعنى)؟

(٢) الطرق الممكنة: توجد ثلاثة طرق ممكنة تصل بين القرية A والقرية B، وتوجد أربعة طرق ممكنة تصل بين القرية B والقرية C. كم عدد الطرق المختلفة من القرية A إلى القرية C مروراً بالقرية B؟

(٣) الرئيس ونائب الرئيس: يوجد ثلاثة مرشحين لمنصب الرئيس وأربعة مرشحين لمنصب نائب الرئيس. كم عدد الأزواج التي يمكن أن تكون من رئيس ونائب رئيس؟

في التمارين (٤-٦)، استخدم مبدأ العد الأساسي.

(٤) أرقام الهاتف: كم عدد أرقام الهاتف التي يمكن أن تكونها من سبعة أرقام على بأنه لا يمكن أن يبدأ الرقم من اليسار بـ ٠، ١، لماذا؟

١١١

لاحظ أن لجنة معينة مكونة من ثلاثة أشخاص A، B، C تظهر ٦ مرات في القائمة.

أب ج أجد باج بجا جاب جبا
تشكل هذه الترتيبات ستة مجموعات واحدة لذلك فإن إجمالي أعداد اللجان مساوٍ لـ ٦، ترتيبات مكونة من ٦ ترتيبات مختلفة لكل لجنة.

$$\text{عدد اللجان} = \frac{!6}{!3} = \frac{!4}{!3} = \frac{!4}{!3!} = \frac{!4}{!3!} = \frac{!4}{!3!} = 6$$

حاول أن تحل

٨ ما عدد اللجان المكونة من شخصين والتي يمكن تكوينها من مجموعة من أربعة أشخاص؟

وبصفة عامة، عدد التوفيق المكون من كل منها من رعنصر والختارة من بين مجموعة مكونة من N عنصر يمكن إيجادها كالتالي:

$$\text{عدد التوفيق} = \frac{!N}{(N-r)!r!}$$

تعريف: قانون التوفيق
إذا كان R عددان صحيحان موجيان حيث N > R، فإن:
عدد التوفيق المكونة كل منها من R من الأشياء والختارة من بين N من الأشياء هو:

$$\frac{!N}{(N-r)!r!}$$

ملاحظات:

$$(1) \text{ عندما } r=0 \text{ يُعرف } \binom{N}{0} = 1 \\ (2) \text{ عندما } r=N \text{ يُعرف } \binom{N}{N} = 1$$

١٨٩

$$3024 = 6 \times 7 \times 8 \times 9 = \frac{!9}{!4(4-9)} = !9$$

٧

$$6 = \frac{3 \times 4}{2} = \frac{!4}{!2!(2-4)}$$

٨

$$\frac{!20}{!11!(11-20)} = 167960$$

٩

$$\frac{!60}{!15!(15-60)} = 1319408919$$

١٠

١١ (أ) توفيقاً.
(ب) تبديلًا.

(٥) لوحات التخيس: كم عدد لوحات التخيس التي يمكن أن تكونها من رقمين يتبعهما حرفان ثم ثلاثة أرقام بدون أن تكرر أي حروف أو أرقام؟

(٦) رمي حجر نرد: عند رمي حجري نرد أحدهما أحمر والثاني أخضر معاً وملائحة الوجه العلوي لكل منها: كم عدد النواتج الممكنة؟

في التمارين (١٠-٧)، أوجد قيمة كل عايلي:

(٧)

(٨)

(٩)

(١٠)

في التمارين (١٣-١١)، حل المسائل التالية:

(١١) تكونون للجان: سوف يتم انتخاب لجنة مكونة من ٣ سيدات من بين ٢٥ سيدة. كم عدد اللجان المختلفة التي يمكن انتخابها؟

(١٢) شراء أفراد حاسوب مدمجة: لدى جيكان نقد تكفي لشراء ثلاثة أفراد حاسوب مدمجة فقط من بين ٤٨ فرداً. كم عدد مجموعة أفراد الحاسوب التي يمكن شراؤها؟

(١٣) يجري مدير شؤون الموظفين مقابلات شخصية مع ثمانية أشخاص موشحون ثلاثة، وظائف شاغرة. كم عدد المجموعات المكونة من ثلاثة أشخاص التي يمكن توظيفها؟

١١٢

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (١-٣)، اكتب قائمة بكل الإمكانيات أورسم شجرة بيانية للإجابة عن الأسئلة التالية:

(١) كلمات مكونة من ثلاثة حروف: ما عدد الكلمات المختلفة التي تستطيع تكوينها من ثلاثة حروف دون تكرارها من بين ٤ حروف ل، ع، ب، ه؟

(٢) الطرق الممكنة: توجد ثلاثة طرق ممكنة تصل بين القرية أ والقرية ب، وتوجد أربعة طرق ممكنة تصل بين القرية ب والقرية ج.

كم عدد الطرق المختلفة من القرية أ إلى القرية ج وارجع إلى القرية أ مروراً بالقرية ب في كل اتجاه؟

(٣) تذاكر الطيران: عندما تطلب تذكرة طيران يمكنك أن تختار في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية. يمكنك أيضاً أن تختار مكانك إلى جانب نافذة الطائرة أو في المرأة أو في الكرسي الأوسط إلا في حالة عدم وجود كرسى أوسط كي هو الحال في الدرجة الأولى حيث يوجد كرسيان فقط.

كم عدد الطرق المختلفة التي يمكن أن تختار بها مكانك على متن الطائرة؟

حاول أن تحل
١٠ أثناء الإعداد لزيارة المتحف الوطني، أراد منظمو الزيارة إعداد لوائح للطلاب لاستخدام حفارات تسع كل منها ١٥ طالباً. علينا أن نجد عدد الطلاب هو ٦٠ طالباً، فإذا عدد اللوائح المختلفة التي يمكن إعدادها لهذه الزيارة؟

مثال (١١)

في كل ما يلي سُئلَ ما إذا كان المال بين تبديلاً أو توفيقاً واحسب عدد الطرق في كل حالة.

١ اختيار رئيس، نائب رئيس، أمين سر من بين ٢٥ عضواً في نادي القراءة.

٢ اختيار ٥ جراث بقطاط من كيس يحتوي على ١٢ حبة لإعداد وجبة غذائية.

٣ وضع معلم خططاً بين مقاعد طالباً في غرفة بها ٢٥ مقعداً.

٤ اختيار ٤ أيام من قصيدة شعرية مكونة من ١١ بيتاً لكتابتها وتعليلتها في غرفة الفصل.

الحل:

١ الترتيب مهم في الاختيار .. تبديل. $!5 = 13800$

٢ الترتيب غير مهم في الاختيار .. توافق. $!5 = 792$

٣ الترتيب مهم .. تبديل. $!5 = 110 \times 2,5852$

٤ الترتيب غير مهم .. توافق. $!5 = 330$

حاول أن تحل

١١ في ما يلي، حدد ما إذا كان المال بين تبديلاً أو توفيقاً.

١ اختيار ٣ طلاب من الصف العاشر للمشاركة في مسابقة نلاوة القرآن.

٢ مراكز المشاركون الثلاثة في مسابقة نلاوة القرآن.

١١٣

١٩١

٥-٥: الاحتمال المشروط

الاحتمال المشروط Conditional Probability

٥-١٠

دعا نفر ونتناشر

سوف تتعلم

- الحدث المستقل
- الحدث التابع
- الاحتمال المشروط

تتألف لغة الدواميتو من بساطات على شكل متوازي مستويات، دون عمل أحد أو جهها نقاطاً عددها ينبع من الصفر (فراغ) إلى ٦.

١) تكون جدولًا بين الأزواج الممكنة. ما عددها؟
٢) ما عدد النواتج الممكنة من رقمين متساوين؟
٣) تم سحب بطاقة رفقة غير متساوية، ما احتمال أن يكون مجموع الرقمين يساوي ٤٥؟
٤) سُحب بطاقة رفقةها متساوية، ما احتمال أن يكون مجموع الرقمين أصغر من ٤٥؟

في كل تجربة عشوائية، يتم أولًا بعمرقة مجموعة النواتج الممكنة والتي تسمى فضاء العينة (F). كل حدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة.

إذا كانت جميع نواتج التجربة لها فرصه الظهور نفسها فإن احتمال الحدث A هو:

$$P(A) = \frac{\text{عدد نواتج الحدث } A}{\text{عدد النواتج في فضاء العينة}}$$

أي أن: $P(A) = \frac{n(A)}{n(F)}$

يكبر الاحتمال بصورة كسر عشرى أو كسر أو نسبة أو نسبة مئوية.




مثال (١) في لعبة «رمي حجري نرد متظنين ومتباين» والتجربة هي ملاحظة الوجه المعلوي لكل من المحرجين

١) ثم يتألف كل ناتج؟ اكتب فضاء العينة. وما عدد النواتج الممكنة؟
٢) مثل فضاء العينة بيانياً.
٣) ما احتمال الحدث A: ظهور عددين مجموعهما يساوي ٤؟

الحل:
١) يتألف كل ناتج من زوج مرتب (١،١)، (١،٢)، ...، (٦،١)، ...، (٦،٦).
ف = {(١،١)، (١،٢)، ...، (٦،١)، ...، (٦،٦)}
:

١٩٤

وتطبّق مبدأ العد، عدد النواتج هو $6 \times 6 = 36$ ناتجاً، وكل هذه النواتج لها فرصه الظهور نفسها.



٤) يتألف الحدث A من ثلاثة نواتج: {(١،١)، (١،٢)، (٢،١)}.
 $P(A) = \frac{n(A)}{n(F)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

حاول أن تحل

١) في المثال (١): ما احتمال الحدث A؟
٢) ما احتمال الحدث B؟
٣) ما احتمال الحدث C؟
٤) ما احتمال الحدث D؟

ولأن أي حدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة، فإن عدد النواتج في حدث ما يكون دائمًا أصغر من أو يساوي عدد نواتج فضاء العينة. لذلك فإن احتمال وقوع حدث ما، هو عدد ينتمي إلى الفئة [٠،١].

ملخص مفيدة:
فضاء العينة، في تجربة رمي حجري نرد متظنين ومتباين هو نفسه
فضاء العينة في تجربة رمي حجري نرد متساوين.

مواصفات الحدث ما:
لتكن A حدث في فضاء عينة F منه و غير خال فـإن:
١) $1 \geq P(A) \geq 0$.
٢) إذا كان $\emptyset = \{ \}$ ، فإن $P(\emptyset) = 0$ ويسمي أحـدثـاً مـسـحـيـلاً.
٣) إذا كان $\Omega = F$ فإن $P(\Omega) = 1$ ويسمي أحـدثـاً مـؤـكـداً.
٤) مجموع احـتمـالـاتـ جميعـ النـواتـجـ فيـ فـضـاءـ العـيـنةـ يـساـويـ ١ـ .

١٩٣

الأهداف

- يتعرف الحدث المستقل.
- يتعرف الحدث التابع.
- يوجد الاحتمال المشروط.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

حدث مستقل - حدث تابع - جدول ذو مدخلين - مخطط فن - احتمال مشروط - التقاطع - الاتحاد - المتمم - حدثان متنافيان.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة علمية - جهاز إسقاط (Data show).

٤ التمهيد

أسأل الطالب:

- بكم طريقة يمكن اختيار: رئيس، أمين سر، أمين صندوق من بين ٧ أشخاص؟
- بكم طريقة يمكن اختيار مجموعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص لتمثل مجموعة من ٧ أشخاص؟
 - ما قيمة P حسابياً؟
 - ما قيمة Q حسابياً؟
- أوجد P ، Q باستخدام الآلة الحاسبة.

وتطبّق مبدأ العد، عدد النواتج هو $6 \times 6 = 36$ ناتجاً، وكل هذه النواتج لها فرصه الظهور نفسها.

مثال (١) التمثيل البياني لفضاء العينة.

٤) يتألف الحدث A من ثلاثة نواتج: {(١،١)، (١،٢)، (٢،١)}.
 $P(A) = \frac{n(A)}{n(F)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

حاول أن تحل

١) في المثال (١): ما احتمال الحدث A؟
٢) ما احتمال الحدث B؟
٣) ما احتمال الحدث C؟
٤) ما احتمال الحدث D؟

ولأن أي حدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة، فإن عدد النواتج في حدث ما يكون دائمًا أصغر من أو يساوي عدد نواتج فضاء العينة. لذلك فإن احتمال وقوع حدث ما، هو عدد ينتمي إلى الفئة [٠،١].

مواصفات الحدث ما:
لتكن A حدث في فضاء عينة F منه و غير خال فـإن:
١) $1 \geq P(A) \geq 0$.
٢) إذا كان $\emptyset = \{ \}$ ، فإن $P(\emptyset) = 0$ ويسمي أحـدثـاً مـسـحـيـلاً.
٣) إذا كان $\Omega = F$ فإن $P(\Omega) = 1$ ويسمي أحـدثـاً مـؤـكـداً.
٤) مجموع احـتمـالـاتـ جميعـ النـواتـجـ فيـ فـضـاءـ العـيـنةـ يـساـويـ ١ـ .

٥ التدريس

تعرف الطلاب في مراحل سابقة حالات استخدموها فيها الاحتمال الأولي، حيث طبقوا القاعدة لحدث بسيط كما يلي:

$$\frac{\text{عدد النواتج في الحدث}}{\text{عدد النواتج الممكنة}} = \frac{(\text{الحدث})}{\text{النواتج الممكنة}}$$

والآن سوف يتعرفون ويطبقون نوعاً متقدماً من الاحتمال، ألا وهو الاحتمال المشروط حيث يتدرج من لعبة «رمي مكعبين منتظمين» وإيجاد فضاء العينة أوّلاً أو التنتائج الممكنة كما في المثال (١)، ثم التقدم شيئاً فشيئاً ليستخدموا ما تعلموه في الدرس السابق من قواعد التباديل والتوفيق في أحداث معينة كما في المثال (٣). وبعد ذلك، سوف يتعرفون على مفهوم النواتج المشروطة في حل أحد الأمثلة في المثال (٤)، ويتعلّمون أيضاً الجدول المزدوج كما في المثال (٧).

أكّد للطلاب أن جميع هذه الأدوات والوسائل سوف تكون مهمة عند إيجاد إجابات لمواضيع، يتطلب فيها موقف ما معرفة احتمال حدوثه.

شدد أيضاً مع الطلاب على العمليات المستخدمة على الأحداث، وارتباطها بها سبق أن تعلّموه عن المجموعات. أعط أمثلة متعددة قبل البدء بفقرة تقاطع المجموعات، والاتحاد المجموعات، ومتّهم الجزء من مجموعة معينة. أشر إلى الربط بين فضاء العينة والمجموعة الكاملة، وبين الحدث والجزء من المجموعة.

تعامل بهدوء مع المثال (٧)، ليتمكن الطلاب من فهم هذه العمليات.

توسيع في شرح معنى الأحداث المستقلة والأحداث التابعة. أعط أمثلة متعددة ليميز الطلاب بين حدث تابع وحدث مستقل.

Venn Diagram

منطقتان

تساعد النماذج الهندسية أحياناً على فهم المسائل وإيجاد الاحتمالات.

مثال (٤) منطقتان (مثال إثباتي)

في إحدى المدارس الثانوية يهتم ٥٤% من الطلاب بالأنشطة الكشفية، و٦٢% بالرياضيات. نصف الذين يهتمون بالأنشطة الكشفية يهتمون أيضاً بالرياضيات.

١ ما النسبة المئوية للطلاب الذين يهتمون فقط بالرياضيات؟

٢ اختيار طالب عشوائياً من طلاب هذه المدرسة، فما احتمال أنه يهتم بالرياضيات؟

الحل: ترتيب المعلومات وعرضها تختار مستطيل مثلث فضاء العينة (كل طلاب المدرسة) ونرسم داخل المستطيل منطقةين متداخلتين تمثل الطلاب الذين يهتمون بالأنشطة الكشفية والطلاب الذين يهتمون بالرياضيات.

ندون داخل هذه المنشآت النسب المئوية كالتالي:

المجموعة المعاشرة تضم: $\frac{54}{100} \times 100 = 54$ %

المجموعة المعاشرة تضم: $\frac{62}{100} \times 100 = 62$ %

المجموعة المعاشرة تضم: $54 - 62 = -8$ %

يمكننا الآن الإجابة عن الأسئلة بقراءةخططهن.

١ النسبة المئوية للطلاب الذين يهتمون فقط بالرياضيات $= \frac{8}{100} \times 100 = 8$ %

٢ احتمال اختيار طالب بالرياضيات $= \frac{62}{100} = 62%$

٣ حل آخر: $1 - 54 = 46$ %

٤ يقرأ ٨٤% من طلاب الصف العاشر كتب مطالعه باللغة العربية، ويقرأ ١٨% من طلاب هذا الصف كتبًا باللغة الإنجليزية، ويقرأ ١٥% من الطلاب كتاباً باللغتين.

اختيار طالب عشوائياً من طلاب هذا الفصل،

١ ما احتمال أن يكون من يقرأ كتب باللغة الإنجليزية فقط؟

٢ ما احتمال أن يكون هذا الطالب من لا يقرأ كتب باللغتين معاً؟

ناقش معهم النتائج الموجودة في المثالين: (٨) و(٩) لتأكد من فهمهم للأحداث وكيف تكون تابعة أو مستقلة. شدد على مفهوم الاحتمال المشروط لأنها المرة الأولى التي يتعرف عليها الطالب.

اشرح بإسهاب معنى «حدث يحصل بعد حصول حدث قبله».

أكّد لهم أن $L(B|A)$ لا تعني أبداً أننا نوجد احتمال الكسر $\frac{L(B)}{L(A)}$ بل هو احتمال حدوث ب بعد حصول حدث A كما في المثالين (١٠)، (١١).

أعط أمثلة متعددة لتطبيق القاعدة:

$$L(B|A) = \frac{L(B \cap A)}{L(A)}$$

٦. الرابط

كل الأمثلة الواردة في هذا الدرس تربط مفاهيمه ومهاراته بالحياة الواقعية.

٧. أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخاطئ الطلاب في استخدام قاعدة الاحتمال المشروط. ساعدهم على التعرف من خلال النص إلى ما هو مقصود بحدث يحصل أولاً، ليتبعه حدث آخر يحصل بعد ذلك.

١٩٦

التاريخ المحرجي:
التاريخ الملادي:
العنوان:
٥٠-١٠

الاحتمال المشروط
Conditional Probability

المجموعة # تمارين أساسية

في المثالين (١ - ٣)، عند رمي حجر تردد أحمر اللون وحجر تردد أخضر اللون معاً ولاحظة الوجه العلوي. في النتائج الممكنة لهذا الحدث؟ وما احتمال وقوع كل حدث معاً؟

(١) مجموع العددين الظاهرين ٩.

(٢) مجموع العددين الظاهرين هو عدد زوجي.

(٣) العدد الظاهر على الحجر الأخر أكبر من العدد الظاهر على الحجر الأخضر.

في المثالين (٤ - ٦)، ج تضمن نسبة لألوان الحلوى التقليدية التي يتوجهها مصنع للحلوى وهي: ج = {بني، الأخضر، البرتقالي، الأخر، البرونزي، الأصفر}.
احتمال كل حدث في ج يساوي نسبة إنتاج هذا اللون من الحلوى من إجمالي الألوان. وقد صرح المسؤول في هذا المصنع ببعض المعلومات عن احتمال الإنتاج في الجدول التالي:

الاحتياج	اللون	البني	الأصفر	الأخضر	البرتقالي	البرونزي
الاحتياج	٠,٣	٠,١	٠,٢	٠,٢	٠,١	٠,١

إذا قمت بأخذ قطعة حلوى عشوائياً من علبة مفتوحة حديثاً من إنتاج هذا المصنع، فما احتمال أن تأخذ حلوى بالألوان التالية:

(٤) البني أو البرونزي؟

٨ التقييم

تابع الطلاب وهم يحاولون الإجابة عن فقرات «حاول أن تخل» لتكوين فكرة عن أدائهم في هذا الدرس، وعن مدى اكتسابهم المفاهيم والمهارات الواردة.

أوجد ل(?)

١. يكن هـ الحديث: «الشخص يكون امرأةً وطيب»، احسب ل(هـ) باستخدام الجدول.

٢. أكتب مستخدماً الحديث بـ، جـ الحديث وـ؛ «الشخص يكون امرأةً أو طيب»، ثم احسب ل(وـ).

٣. احسب ل(جـ).

الحل:

١. اختيار الشخص عشوائياً يعني أن نواتج التجربة لها فرصة الظهور نفسها ومنها:

$$L(\text{؟}) = \frac{252}{350} = \frac{12}{25}$$

$$L(\text{هـ}) = \frac{280}{350} = \frac{4}{5}$$

$$L(\text{جـ}) = \frac{20}{350} = \frac{2}{35}$$

$$L(\text{وـ}) = \frac{28}{350} = \frac{4}{50}$$

$$L(\text{ـ}) = \frac{2}{350} = \frac{1}{175}$$

٢. تحسب احتمال الحديث بـ جـ، بحسب الجدول الحديث $H = \frac{1}{2}$ جـ لديه ٤ ناتجًا وبالتالي: $L(\text{هـ}) = L(\text{بـ}) \cap L(\text{جـ}) = \frac{4}{5} \times \frac{2}{35} = \frac{8}{175}$

٣. تحسب احتمال الحديث بـ لـ، حيث إن بـ، جـ ليسا حدثين متساوين
 $L(\text{لـ}) = L(\text{بـ}) \cap L(\text{جـ}) = L(\text{بـ}) - L(\text{جـ}) = 0$

٤. بـ، جـ حدثان متساويان إذا: $L(\text{لـ}) = L(\text{جـ}) = L(\text{بـ}) + L(\text{ـ}) = 0 + \frac{1}{175} = \frac{1}{175}$

حاول أن تخل

٥. في فضاء عينة فـ لدينا حدثان، بـ، متساويان حيث $L(\text{ـ}) = 4$ ، $L(\text{بـ}) = 5$.

٦. احسب ل(بـ).

٧. احسب ل(ـ).

١٩٨

اختبار سريع

في كيس ٧ كرات متشابهة: ٣ كرات سوداء مرقمة من ١ إلى ٣، ٤ كرات حمراء مرقمة من ١ إلى ٤. سحبت عشوائياً كرة من الكيس ومن دون إعادتها سُحبَت كرة ثانية. أوجد احتمال كل من الأحداث التالية:

١. لـ (كرة حمراء ثم كرة سوداء).
- $$\frac{2}{7} = \frac{3}{6} \times \frac{4}{7}$$
٢. لـ (كرتين مجموع رقميهما ٢).
- $$\frac{1}{21} = \frac{2}{42} = \frac{1}{6} \times \frac{2}{7}$$
٣. لـ (الكرة الثانية حمراء إذا علمنا أن الكرة الأولى سوداء).
- $$\frac{2}{3}$$

الأحداث المستقلة

يكون حدثان مستقلان إذا كان وقوع (أو عدم وقوع) أحدهما لا يؤثر على وقوع (أو عدم وقوع) الآخر. فمثلاً، في تجربة عشوائية عند رمي عملة معدنية مرتين وملاحظة الوجه العلوي فإن الحديث «ظهور صورة في الوجه الأول» لا يؤثر على وقوع الحديث «ظهور صورة في الوجه الثاني»، لأن أي من الوجهين لا يؤثر على الآخر بأي طريقة، ولذلك فالحدثان مستقلان.

إذاً كتنا نعلم الأحداث الفردية حدثان مستقلان فإنه يمكننا إيجاد احتمال وقوع الحدين معاً باستخدام القاعدة التالية:

قاعدة الضرب للأحداث المستقلة

Multiplication principle of Independent Events

إذا كان A بـ حدثان مستقلان فإن احتمال وقوع الحدين معاً هو:

$$L(A \cap B) = L(A) \times L(B)$$

مهم الأربع الآلات الحاسبة يمكنها إنتاج أعداد عشوائية تقع بين ٠٠ و١٠. كل عدد عشوائي ينتجه يمكن مستقلأً عن العدد الآخر السابق له.

مثال (٨)

قام أحمد بتطبيق قاعدة باستخدام الآلة الحاسبة الآلية لإنتاج أرقام عشوائية من ٠ إلى ٩ (انظر إلى الشكل المقابل).

فما احتمال أن يكون الرقم الأول الذي حصل عليه زوجياً وإن يكون الرقم الثاني مصاعداً لـ؟

الحل:

- * int() هي أكبر دالة أعداد صححة.
- * rand() هي متغير الأعداد.
- * int(١٠ * rand()) هي متغير العشوائية بين صفر، ١.
- * int(١٠ * rand()) هي متغير العشوائية بين صفر، ٩.
- * rand() = ٨، ١٧.
- * ١٠ * rand() = ٨، ١٧.
- * int(١٠ * rand()) = ٨

حاول أن تخل

في تجربة عشوائية عند رمي قطعة نقود ثلاثة مرات وملاحظة الوجه العلوي.

ما احتمال أن يكون الناتج (صـ، كـ، مـ)؟

١٩٩

مثال (٦)

إذا كان A بـ حدثان في فضاء العينة وكان:

$$L(\text{ـ}) = 1 - L(\text{بـ}) = 1 - 0,00 = 0,99$$

الحل:

$$L(\text{ـ}) = 1 - L(\text{ـ}) = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$L(\text{ـ}) = L(\text{ـ}) + L(\text{ـ}) = 0,2 + 0,2 = 0,4$$

$$L(\text{ـ}) = 1 - L(\text{ـ}) = 1 - 0,4 = 0,6$$

حاول أن تخل

إذا كان A بـ حدثان في فضاء العينة، وكان $L(\text{ـ}) = 5$ ، $L(\text{بـ}) = 6$ ، $L(\text{ـ}) = 2$ ، $L(\text{ـ}) = 0$.

أوجد $L(\text{ـ})$.

مثال (٧)

بيان الجدول المزدوج التالي توزيعاً للأشخاص العاملين في إحدى المستشفيات:

المهنة	المجموع	الجنس	الجنس	المجموع
طبيب	٤٢	١٤	٢٨	٤٢
مريض	٢٥٢	٢٣٢	٢٠	٢٥٢
تقنيـ إداري	٥٦	٣٤	٢٢	٥٦
المجموع	٣٥٠	٢٨٠	٧٠	٣٥٠

تم اختيار شخص عشوائياً من بين ٣٥٠ شخصاً عاملأً في المستشفى.

١. أوجد احتمال كل حدث من الأحداث التالية:

: (الشخص مريض) بـ: (الشخص امرأة) جـ: (الشخص طبيب)

١٩٧

٩ إجابات وحلول

«دعنا نفك ونتناقش»

١ - ٣ تحقق من إجابات الطلاب.

«حاول أن تحل»

$$\text{١) } L(B) = \frac{6}{36}$$

(ب) $L(C) = 0$

$$\text{٢) } L(D) = \frac{3}{36}$$

$$L(B) = \frac{36}{36}$$

٣ نوجد احتمال (٢) قطع ليست بالشوكولاتة

نفرض أن حدث اختيار قطعتي حلوى عشوائياً ليست

بالشوكولاتة هو الحدث ب

$$\text{فإن } L(B) = \frac{28}{66} = \frac{2}{33} \cdot \frac{14}{12}$$

١١٥

- (١٨) ليكن A ب حدثان مستقلان في فضاء عينة Ω حيث $L(\Omega) = 5$.
احسب: $L(A)$.

- في الممارين (١٩-٢١)، اختر الإجابة الصحيحة.
- (١٩) إذا كان A ب حدثان مستقلان وكان $L(A) = 2$ ، $L(B) = 5$.
فإن $L(A \cap B) =$
 $(A) L(A)B =$
 $(B) L(A)B =$
 $(C) L(A \cap B) =$
 $(D) L(A)B =$
- (٢٠) إذا كان A ب حدثان في فضاء العينة وكان $L(A) = 7$ ، $L(B) = 5$.
فإن $L(A \cap B) =$
 $(A) 0$
 $(B) 0, 8$
 $(C) 0, 7$
 $(D) 0, 6$
- (٢١) إذا كان A ب حدثان مستقلان في فضاء العينة وكان $L(A) = 6$ ، $L(B) = 4$.
فإن $L(A \cap B) =$
 $(A) 0$
 $(B) 0, 2$
 $(C) 0, 4$
 $(D) 0, 6$

المجموعة ب ممارين تعزيزية

- في الممارين (٢٣-٢٥)، عند رمي حجر تردد أحمر اللون وحجر تردد أخضر اللون معاً وملحوظة الوجه الملوى لها.
فما الواقع الممكن لهذا الحدث؟ وما احتمال ونوع كل حدث في ما يلي؟
(١) جمجم العدددين الظاهرين أصفر من ١٠.


- (٢) العددان الظاهران عددان فردان.

١١٦

الحدث التابع

يكون الحدث تابعاً عندما يتأثر ظهوره بحدوث سابق.

مثال (٩) الشجاعة البالغية




دون إعاقة الكرة الأولى يصبح لدينا في الكيس ٤ كرات حراء فقط وفي الكيس هناك ٧ كرات وبالتالي $L(B) = \frac{4}{7}$
 $L(Kرتان حراوتان) = L(\Omega) \times L(B) = \frac{4}{7} \times \frac{9}{14} = \frac{36}{98} = \frac{18}{49}$

حاول أن تحل

٤ تمني على حلوى على ١٢ قطعة، ٤ منها بنكهة شوكولاتة والباقي بنكهة الحليب.
فما احتمالأخذ قطعة بنكهة شوكولاتة وأكلها، ثمأخذ قطعة بنكهة الحليب؟

٢٠٠



(أ) ٪.٣

(ب) احتمال الذين لا يقرأون كتاباً باللغتين معاً

= ٪.٦٩ يقرأون فقط بالعربية

+ ٪.٣ يقرأون فقط بالإنكليزية

+ ٪.١٣ لا يقرأون كتاباً

٪.٨٥ =

أو ٪.٨٥ = ٪.١٥ - ٪.١٠

٠،٢ = (أ) ل (ب) ∩ ،٢

٠،٥ = (ب) ل (ب)

(٣) العددان الظاهران عددان زوجيان.

في التمرين (٤)، حل المسألة التالية:

(٤) رقم التأمين الاجتماعي: ما احتمال أن يتم بشكل عشوائي اختبار رقم تأمين اجتماعي مكون من تسعة أرقام مختلفة ليس من بينها الصفر؟

(٥) ما احتمال اختيار رقمٍ عشوائياً واحداً من ١ إلى ٩ يحقق الشرطين التاليين:

رقم أولى أو من مضاعفات الرقم ٦.

في التمارين (٦-٧)، يتضح المصطلح حلوى مشوه بالغول السوداني مشكلة بالألوان الموضحة بالجدول. يوضح الجدول التالي احتمال إنتاج الملوى بحسب لونها:

اللون	البيج	الأحمر	الأخضر	الأزرق
الاحتمال	٠.١	٠.٢	٠.٢	٠.٣

إذا قمت باخذ قطعة حلوى عشوائياً من كل من علبتين مفتوحتين حديثاً من إنتاج هذا المصنع، فما احتمالأخذ حلوى بالألوان الثالثة؟

(٦) كلتاها بنيبة اللون.

(٧) كلتاها برقة اللون.

(٨) الأولى بنيبة اللون والثانية صفراء.

(٩) ولا واحدة صفراء.

(١٠) الأولى ليست حراة والثانية ليست برقة اللون.

(١١) ليكن A ب حدثان مستقلان في فضاء عينة Ω حيث $L(A) = 0.2$ ، $L(B) = 0.1$.

احسب:

(أ) $L(A \cap B)$ (ب) $L(A|B)$ (ج) $L(A \cup B)$ (د) $L(A|B)$

Conditional Probability

الاحتمال المشروط

في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة الوجه العلوي له فإن فضاء العينة $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.ليكن الحدث A (ظهور عدد أكبر من ٣) فإن $L(A) = ٤/٦$ ويكون $L(A) = ٣/٦$.ولتكن الحدث B (ظهور عدد زوجي) فيكون $B = \{2, 4, 6\}$.

$$L(B) = \frac{٣}{٦} = \frac{١}{٢}$$

$$L(B|A) = \frac{٢}{٣} = \frac{١}{٣}$$

لنسال الآن: إذا علمتنا أن الحدث A قد وقع، فإنه احتمال وقوع الحدث B بشرط وقوع الحدث A . يعني آخر ما هو احتمال

الحصول على عدد زوجي بشرط أن يكون أكبر من ٣.

نلاحظ أن الشرط المعنوي يجعل فضاء العينة الجديد هو $\{2, 4, 6\}$ وللحصول على عدد زوجي أكبر من ٣ نوجد:

$$B = \{2, 4\}$$

وبالتالي احتمال الحصول على عدد زوجي بشرط أن يكون أكبر من ٣ هو $٢/٣$.احتمال وقوع الحدث B بشرط وقوع الحدث A يسمى بالاحتمال المشروط (الشرط) ويكتب $L(B|A)$ ويقرأ احتمال الحدثبشرط A ويمكن إيجاد $L(B|A)$ باستخدام القاعدة الثالثة:

قاعدة الاحتمال المشروط

إذا كان وقوع الحدث B مشروطاً بوقوع الحدث A فإن:

$$L(B|A) = \frac{L(A \cap B)}{L(A)}$$

$$\text{وكذلك } L(A \cap B) = L(A) \times L(B|A)$$

$$\text{ل}(b) = 1, 2 - 1, 6 + 1, 5 = 6$$

$$\text{ل}(b) = 1, 9 - 1 = 8$$

$$7 \quad \text{ل}(b) = 1, 9$$

$$8 \quad (b)\text{ل}(b) = 1$$

$$8 \quad \frac{1}{8}$$

$$9 \quad \frac{8}{33} = \frac{8}{11} \times \frac{4}{12}$$

$$10 \quad \text{ل}(b) = 1, 6$$

$$11 \quad \text{ل}(b) = \frac{1}{3}$$

مثال (10)

في تجربة عشوائية لـ ب حدثان حيث $\text{ل}(b) = 3, 0, 2 = 6$. أوجد احتمال كل من الأحداث التالية:

١) $\text{ل}(b) = 1$

٢) $\text{ل}(b) > 1$

الحل:

$$\text{ل}(b) = \frac{\text{عدد الممكنت}}{\text{مجموع الممكنت}} = \frac{2}{3}$$

$$\text{ل}(b) = \frac{\text{عدد الممكنت}}{\text{مجموع الممكنت}} = \frac{1}{3}$$

حاول أن تحل

١١) في تجربة عشوائية، إذا كان $\text{ل}(b) = 3, 0, 0, 1 = 4$. أوجد $\text{ل}(b)$.

مثال (11)

رمي جسم حجر نرد منتظم ولاحظ الوجه العلوي له. نسمى الحدث بـ «الحصول على عدد أكبر من أو يساوي ٤»، الحدث أـ «الحصول على عدد فردي». احسب $\text{ل}(b)$ (احتمال ظهور عدد أكبر من أو يساوي ٥ بشرط أن يكون عدداً فردياً).

الحل:

$$\text{ف} = \{1, 3, 5\} = 3$$

$$\text{ن} = \{2, 4, 6\} = 3$$

$$\text{ب} = \{1, 3, 5\} = 3$$

$$\text{ل}(b) = \frac{\text{عدد الممكنت}}{\text{مجموع الممكنت}} = \frac{1}{3}$$

$$\text{ل}(b) = \frac{\text{عدد الممكنت}}{\text{مجموع الممكنت}} = \frac{1}{3}$$

$$\text{ل}(b) = \frac{\text{عدد الممكنت}}{\text{مجموع الممكنت}} = \frac{1}{3}$$

حاول أن تحل

١١) في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم، إذا كان الحدث بـ «الحصول على عدد زوجي»، والحدث أـ «الحصول على عدد أولي». فاحسب $\text{ل}(b)$.

المرشد لحل المسائل

إجابات «مسألة إضافية»

(أ) $\bar{x} = 312,25$ مليلتر

(ب) $s = 0,45, 27$, الانحراف المعياري غير مقبول
لذا، يكون تشتت القيم عن المتوسط الحسابي كبير.

القيمة x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
١	-٦,٣	٣٩,٦٩
٢	-٥,٣	٢٨,٠٩
٤	-٣,٣	١٠,٩٩
٥	-٢,٣	٥,٢٩
٧	-٠,٣	٠,٠٩
٨	٠,٧	٠,٤٩
٩	١,٧	٢,٨٩
١٠	٢,٧	٧,٢٩
١٢	٤,٧	٢٢,٠٩
١٥	٧,٧	٥٩,٢٩
المجموع		١٧٦,١

جدول (ب)

المتوسط الحسابي $\bar{x} = 7,3$

$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$

$s = \sqrt{\frac{176,1}{10}}$

$s = 17,61 = 4,17$

وبالتالي $s = 10,17 = 1,017$.

(ج) تستنتج أن $s = 10,17$.

مثال (٢)

بيت دراسة إحصائية أن ٢٪ من القطع التي تصنعها إحدى الشركات فيها خلل تقني. لإلغاء هذه القطع وضع اختبار للمجموعة وكانت نتائجه كالتالي:

يبلغ الاختبار إذا كان ٩٨٪ من القطع التي فيها خلل.

يبلغ الاختبار إذا كان ٥٪ من القطع التي ليس فيها خلل.

أخذت عشوائياً قطعة مصنعة في هذه الشركة.

ما احتمال أن يكون فيها خلل إذا كان لم يبلغها الاختبار الجودة؟

الحل:

ليكن ع المحدث: «القطعة فيها خلل»، خ المحدث: «اختبار الجودة يبلغ القطعة».

٢٠٤

المرشد لحل المسائل

مثال (١)

(١) تأخذ البيانات التالية:

١٥٠, ١٢٠, ١٠٠, ٩٠, ٨٠, ٧٠, ٥٠, ٤٠, ٣٠, ٢٠, ١٠, ٠٠

(٢) كم تستوي التباين في بيانات المجموعة (ب) من قيم البيانات في المجموعة (أ)؟

(٣) أوجد التباين s^2 لقيم المجموعة (أ) والبيان s لقيم المجموعة (ب).

(٤) استنتج العلاقة بين s_A و s_B .

ما الذي أفرز s قيم مموجة من البيانات.

ما الذي أفرز s قيم متساوية؟

الربط بين قيم المجموعة (أ) وقيم المجموعة (ب).

العلاقة بين تباين قيم المجموعة (أ) وتبابن قيم المجموعة (ب).

كيف سهل المسألة؟

(١) بالنظر إلى قيم البيانات في المجموعة (أ) وقيم البيانات في المجموعة (ب) نلاحظ أن جميع قيم المجموعة (ب) هي قيم المجموعة (أ) مقسومة على ١٠.

(٢) تكون جدول \bar{x} لكل من قيم المجموعتين:


القيمة x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
٣٦٩	-٦٣	٣٩٦٩
٢٨٠٩	-٥٣	٢٨٠٩
١٠٨٩	-٣٣	١٠٨٩
٥٢٩	-٢٣	٥٢٩
٩	-٣	٩
٤٩	-٧	٤٩
٢٨٩	-١٧	٢٨٩
٧٧٩	-٢٧	٧٧٩
٢٢٠٩	-٤٧	٢٢٠٩
٥٩٢٩	-٧٧	٥٩٢٩
المجموع		١٧٦١٠

المتوسط الحسابي $\bar{x} = ١٧٦١$

$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$

$s = \sqrt{\frac{١٧٦١٠}{١٠}} = ١٧,٦١$

٢٠٣



أولاً: نرسم شجرة بيانية لتمثيل المعطيات

٧٪ من القطع فيها خلل

٩٣٪ لا خلل فيها.

يبلغ الاختبار ٩٨٪ من القطع فيها خلل

٢٪ من القطع فيها خلل لا يبلغها.

يبلغ الاختبار ٥٪ من القطع التي لا خلل فيها

٩٥٪ من القطع التي لا خلل فيها لا يبلغها الاختبار.

$$s_A = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

تحضير المدخل يوجد (خ)، ثم (ل). بالنظر إلى الشجرة البيانية، يبلغ الاختبار قطعة ما في حالين.

لذلك $s_A = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$

$$s_A = \sqrt{\frac{(٩٨ - ١٠٢)^2 + (٩٥ - ٩٥)^2}{١٠}} = ٤,٢٤$$

$$s_A = \sqrt{\frac{(٩٨ - ٩٨)^2 + (٩٥ - ٩٥)^2}{١٠}} = ٠,٩٧٥٥$$

$$s_A = \sqrt{\frac{(٩٨ - ٩٨)^2 + (٩٥ - ٩٥)^2}{١٠}} = ٠,٠٠٤٤$$

$$s_A = \sqrt{\frac{(٩٨ - ٩٨)^2 + (٩٥ - ٩٥)^2}{١٠}} = ٠,٠٠٤١$$

$$s_A = \sqrt{\frac{(٩٨ - ٩٨)^2 + (٩٥ - ٩٥)^2}{١٠}} = ٠,٩٧٥٥$$

احتمال أن يكون في القطعة خلل علماً أنه لم يبلغها الاختبار الجودة يساوي ٠٠٠٤١، تقريرياً.

مسألة إضافية

١ آلة مجهرة لعينة عبوات بالصابون السائل تحتوي كل منها على ٣١ مليلترات. اظهرت نتائج الكشف على ١٦ عبوة كما

يلى:


٣١١, ٣٠٩, ٢٩٦, ٣١٥, ٣٠٠, ٤١٢, ٣٠٧, ٢٣٢, ٢٩٨, ٢٩١, ٣٠٣, ٣١١, ٣٠٣, ٣١٨, ٢٧٩

١ أوجد المتوسط الحسابي لمحتويات هذه العبوات بالمليلتر.

٢ أوجد الانحراف المعياري. ماذا تستنتج؟

٢٠٥

مخطط تنظيمي للوحدة العاشرة



٢٠٦

مراجعة الوحدة العاشرة

(١) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لعدد الرجال غير المتزوجين في إحدى الدول.

الفئة (العمر)	الرجال
٤٥٠٠	-٢٠
٤٨٠	-٣٠
٣٧٠	-٤٠
٢٩٠	-٥٠
١٨٠	-٦٠
١١٠	-٧٠
٣٠	-٨٠

(٢) أكمل الجدول بإضافة مراكز الفئات والتكرار المجتمع الصاعد.

مركز الفئة	التكرار المجتمع الصاعد	أقل من المحدود	اللبل للنسبة	الرجال	الفئة (العمر)
		٤٥٠٠	-٢٠		
		٤٨٠	-٣٠		
		٣٧٠	-٤٠		
		٢٩٠	-٥٠		
		١٨٠	-٦٠		
		١١٠	-٧٠		
		٣٠	-٨٠		

مذكرة

- المتوسط الحسابي هو ناتج قسمة مجموع قيم البيانات على عدد هذه القيم: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$
- الوسيط هو القيمة التي تأتي في المنتصف بعد ترتيب هذه القيم تصاعدياً أو تنازلياً: $M_d = \frac{n+1}{2}^{\text{th}}$
- في البيانات حيث التوزيع التكراري على فئات تستخدم مركز اللغة لإيجاد المتوسط الحسابي.
- في البيانات حيث التوزيع التكراري على فئات تستخدم قانون الراغفة:
$$\text{المواه} = \text{المدى الأدنى} + \frac{\text{المدى}}{\text{المجموع}} \times \text{ف}$$

حيث إن $\text{ف} = \text{دور اللغة المولدة}$, $\text{ك} = \text{دور اللغة المولدة السابقة مباشرةً للغة المولدة}$, $\text{ل} = \text{دور اللغة اللاحقة مباشرةً للغة المولدة}$.

- يمكن إيجاد الوسيط باستخدام بمتخلي المجتمع الصاعد أو منحني المجتمع النازل أو كلها.
- يمكن إيجاد المواه بالاستخدام دائمون الراغفة.
- يمكن إيجاد المدواه باستخدام دائمه الراغفة.
- يمكن إيجاد المدواه باستخدام المدرج التكراري.
- تستخدم الأربعاء لتلخيص البيانات.
- المدى = القيمة العظمى من البيانات - القيمة الصغرى من البيانات.
- الأربعاء الأدنى = وسيط القيمة الأدنى للبيانات أصغر من الوسيط ويعرف بالرموز.
- الأربعاء الأعلى = وسيط القيمة الأعلى للبيانات أكبر من الوسيط ويعرف بالرموز.
- يعرف الوسيط للبيانات بالرموز.
- جمل الأعداد الخامسة في البيانات هو: القيمة الصغرى، R_1 ، R_2 ، القيمة العظمى.
- يوضح خطط الصندوق في العارضتين كثيفة توزيع القيم الحمس والعاملة فيها وتنشط قيم البيانات.
- اثنان هو القيمة من البيانات الناتجة من حساب القاعدة: $x_{\text{م}} = \frac{x_{\text{أ}} + x_{\text{ب}}}{2}$
- * الاتجاه المعياري بين تنشت البيانات عن المتوسط الحسابي لهذه البيانات ويعطي بالقاعدة:
$$x_{\text{م}} = \frac{x_{\text{أ}} + x_{\text{ب}} - \bar{x}}{2}$$

إذا كبر الاتجاه المعياري يكون التنشت كبيراً ويعيداً عن المتوسط الحسابي وإذا صغر الاتجاه المعياري يكون التنشت قريباً من المتوسط الحسابي.

٢٠٧

تمارين إثرائية


(١) بين الجدول التالي التوزيع التكراري لأوزان ٧٥ رأساً من قطع الماء العربية بالكيلوجرام.

النفرة	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠
التكرار	١	٧	٥	٨	١١	٢٢	١٧	٤

(٢) أكمل الجدول بإضافة التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل.


النفرة	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠
النفرة	١	٧	٥	٨	١١	٢٢	١٧	٤
النفرة	٢	٩	٧	١٠	٣	٥	٨	٦
النفرة	٣	٦	٤	٩	٧	٢	١	٥
النفرة	٤	٣	١	٦	٩	٧	٩	٤
النفرة	٥	٢	٧	٣	٦	٤	٨	٥
النفرة	٦	٨	٣	٦	٩	٧	٢	٤
النفرة	٧	٩	٦	٣	٦	٨	٣	٥
النفرة	٨	٦	٩	٣	٦	٣	٩	٤
النفرة	٩	٣	٦	٩	٦	٣	٦	٣
النفرة	١٠	٦	٣	٦	٩	٦	٣	٦

(٣) أوجد الوسيط لقيم هذه الأوزان باستخدام منحنى التكرار المتجمع الصاعد ومنحنى التكرار المتجمع النازل.



١٢٢

(٤) أوجد المترادفات لقيم هذه الأوزان باستخدام قانون الرافعه وباستخدام المدرج التكراري.



(٥) أوجد المتوسط الحسابي لقيم هذه الأوزان.

(٦) سجل أحد الأشخاص أسعار الحاسوب بالدينار الكوبي من عدة محلات ليبع هذه الأجهزة كالتالي:

٢٥٠، ٢٤٥، ٢٤٠، ٢٥٥، ٢٦٠، ٢٥٥، ٢٦٥، ٢٦٥، ٢٧٠، ٢٣٥، ٢٦٥، ٢٦٥، ٢٧٠.

(٧) أوجد المتوسط الحسابي لقيم هذه الأسعار.

(٨) أوجد الانحراف المعياري لقيم هذه الأسعار.

(٩) حلوي مخدوش بالفول السوداني: ينتج مصنع حلوي مخدوش بالفول السوداني مشكلة بالألوان، كما يوضح الجدول التالي:

اللون	البرتقالي	الأحمر	الأصفر	الأخضر	البني	الابيض
الاحتلال	٠,١	٠,٢	٠,٢	٠,٢	٠,٣	٠,٣
الاحتلال	٠,١	٠,٢	٠,٢	٠,٢	٠,٣	٠,٣
الاحتلال	٠,٢	٠,٣	٠,٣	٠,٣	٠,٤	٠,٤


إذا أخذت ثلاثة قطع من علبة واحدة، فكم عدد الألوان التي يحصل على كل منها؟

(١٠) تسلية: في إحدى الألعاب يتم رمي خمسة أحجار نرد متباينة في وقت واحد وملحوظة الوجه العلوي لها. كم عدد النواuges التي يمكن تمييزها إذا كان لكل حجر لون مختلف؟


١٢٣

(ب) أوجد المتوسط الحسابي لأعمار الرجال.

(ج) أوجد الوسيط لأعمار الرجال مستخدماً منحنى التكرار المتجمع الصاعد.



(د) أوجد المترادفات لأعمار الرجال باستخدام المدرج التكراري.



(١) جاءت درجات أحد السنة الماضية في اختبار مادة العلوم حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة كالتالي:


١٦، ١٤، ٨، ١٦، ٩، ١٣، ١٢، ١٥، ١٠، ١٧.

(٢) أوجد المتوسط الحسابي لهذه الدرجات.




(ج) ارسم خطوط الصندوق ذي العارضتين.

ماذا تلاحظ؟




(د) أوجد الانحراف المعياري لهذه الدرجات.




١٢٠

(١) إذا كانت درجات أحد الطلاب في اختبارات مادة الرياضيات على مدار السنة حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة كالتالي: ١٧، ٨، ١٥، ١٤، ٩، ١٢، ١٠، ٧.

(٢) أوجد المترادفات الخمسة لقيم هذه الدرجات.



(٣) إذا كانت درجات أحد الطلاب في اختبارات مادة الرياضيات على مدار السنة حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة كالتالي: ١٧، ٨، ١٥، ١٤، ٩، ١٢، ١٠، ٧.



ماذا تلاحظ؟



١٢١

١٢٤

(٤) أرقام المأهات: ما احتمال أن يتم بشكل عشوائي اختيار رقم هاتف مكون من سبعة أرقام دون تكرار أي منها؟

(٥) ما احتمال اختيار رقم واحد عشوائي من ١ إلى ٩ يحقق الشروط التالية: عدد فردي أو من مضاعفات العدد ٤؟

(٦) في فصل الشتاء، أصبت موجة زكام ربع المواطنين. ثلث المواطنين تلقوا لقاحاً ضد الزكام، ولسبب عدم فاعلية اللقاح ١٠٠٪ نفترض أن مريضاً مصاباً بالزكام من ١٠ قد تلقى لقاحاً.

ما احتمال أن يكون مواطن من بين الذين تلقوا اللقاح مصاباً بالزكام؟

(٧) المعلم والامتحان النهائي: أعلى معلم طالبه ٢٠ سؤالاً للامتنان على أن يجتاز الامتحان النهائي على ثانية أسلمة منها. كم عدد الامتحانات النهائية المختلفة التي يمكن وضعها؟

(٨) مسح للخريجين: اختارت إحدى الكليات عدداً من دفعة عام ١٩٩٦ المكونة من ٢٥٤ خريجاً من بينهم ١٧٢ سيدة، حيث التحق ١٢٤ سيدة بالدراسات الجامعية و ٥٨ رجلاً. في احتمال كل من الأحداث التالية؟

(أ) أن يكون الخريج سيدة.

(ب) أن يتخرج الخريج بالدراسات الجامعية.

(ج) أن يكون الخريج سيدة وقد التحقت بالدراسات الجامعية.

(٩) تحديد نوع الطفل: افترض أن احتمال أن يكون الطفل المولود حديثاً من نوع معين هو ٥٠٪، في عائلة مكونة من أربعة أطفال. في احتمال كل حدث معين؟

(أ) كل الأطفال إناث.

(ب) كل الأطفال من نوع مختلف.

(ج) كل الأطفال إما ذكور أو إناث.

(١٠) عدم إشارة المرور التي تتألف من ثلاثة ألوان للاحظنا أن: من السيارات تتوقف عند الإشارة الخضراء.

٦٥٪ من السيارات تتوقف عند الإشارة الصفراء (كما يطلب قانون المرور).

٩٧٪ من السيارات تتوقف عند الإشارة الحمراء.

قررت مرافقية سلوك سيارة عند إشارة المرور. لنفترض أنه عند وصول السيارة إلى الإشارة، لون الإشارة عشوائي وأن احتمال أن يكون اللون هو الأخضر ٦٠، احتمال أن يكون اللون هو الأصفر ١٠، احتمال أن يكون اللون هو الأحمر ٣٠.

(أ) ما احتمال أن تكون السيارة المرافقية قد توقفت؟

(ب) تجاوزت السيارة الإشارة. في احتمال أن تكون قد تجاوزت الإشارة عندما كان لونها أحراً.

المجموعة ١ تمارين أساسية

(٣) $210 = 26 + 28$ نعم.

(٢) $s = 48^\circ$

(١) $s = 120^\circ$

(٦) محطة

(٥) محطة

(٤) كلا، $216 \neq 25 + 215$.

(٩) ١٣ سم

(٨) ٨ سم


(٧) ٧٨ سم

(١٠) $t_1 = t_2 = t_3 = t_4$.

\leftrightarrow المنصف العمودي لـ t_2 .

ذلك \leftrightarrow المنصف العمودي لـ t_1 .

$\therefore t_1 \parallel t_2$. (إذا تعامد مستقيمان مع مستقيم ثالث يكون المستقيمان متوازيين).



(١١) ٨ سم.

(ب) $B \times D = B \times D = 17 \times 120 = 2040 \text{ سم}^2$. المساواة $\approx 24,88 \text{ سم}^2$.

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(٢) $22,5 + 26 = 48$ نعم.

(١) $s = 30^\circ$

(٣) محطة

(٤) أطوال القطع الأربع متساوية. نظرية.

(ج) ٢٩ سم

(ب) ٨٢ سم

(أ) $s = 27^\circ$

(٧) $\frac{s}{2}$

(٦) ٣٥

(٩) (أ)

(٨) (ج)

(١١) (د)

(٩) (ج)

المجموعة ١ تمارين أساسية

(ج) $s = 7$

(ب) $s = 2$

(أ) $s = 14$

(٢) تنوّع الإجابات. مثال: $\overline{جـب} \cong \overline{دب}$ ؛ (جـب) = (دب).

(جـ) س = ٨, ٩

(بـ) س = ٥, ٣٨

(أـ) س = ٦

(٤) لا يعلم إذا كانت الأوتار متساوية البعد من مركز الدائرة.

(بـ) ١٠ سم

(أـ) ٥ سم

(بـ) ١٥, ٥٤ سم

(أـ) ٣, ٥٤ سم

(١٠) (دـ)

(٩) (بـ)

(٨) س = ٨, ٩

(٧) س = ١٢

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(جـ) س = ١٠

(بـ) س = ٨

(أـ) س = ٥٠

(٢) مركز الدائرة.

(جـ) س = ٢٠, ٧٨

(بـ) س = ٩, ٩٥

(أـ) س = ١٢, ٥٣

(٥) س = ٩

(٤) س = ٦, ٢

(٦) = ١٠ سم، لأن ΔL و م قائم الزاوية في و.

تمرين ٦-٣

الزوايا المركزية والزوايا المحيطية

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) (أـ) س = ٥١١٦

(بـ) س = ٥١٨٠

(جـ) س = ٥٢١٨، ص = ٥١٠٩

(دـ) س = ٥٣٦، ص = ٥٣٦

(هـ) س = ٥٥٠، كـ = ٥٩٠، ص = ٥٩٠

(٢) (أـ) س = ٥١٢٣

(بـ) س = ٥٥٢، ص = ٥٦٤

(جـ) ص = ٥٦٥، س = ٥١٣٠

(دـ) ٥٦٥

(جـ) ٥٤٠

(بـ) ٥٥٠

(أـ) ٥٤٠

(جـ) ٥٨٥

(بـ) ٥١٠٥

(أـ) ٥٧٨

(٥) $\text{ن}(\widehat{ب}\widehat{ج}) = \text{ن}(ب\widehat{ج}د)$ بالتبادل الداخلي. لذا: $\widehat{أ}\widehat{ج} \cong \widehat{ب}\widehat{د}$

(٦) شبه منحرف متطابق الضلعين. لأن مجموع قياسي زاويتين متقابلتين يساوي 180° .

(٨) (٩٤٠)

(٧) (٩٤٠)

(٩) (٩٤٨) \simeq

(١٠) (٩٤٨) \simeq

(١٠) (أ) $\text{ن}(ب\widehat{ج}د) = \frac{1}{2}\text{ن}(\widehat{ب}\widehat{د})$, $\text{ن}(ج\widehat{ب}د) = \frac{1}{2}\text{ن}(\widehat{ج}\widehat{ب})$, $\widehat{ج}\widehat{د} \cong \widehat{د}\widehat{ب}$.

(ب) Δ ب ج د قائم الزاوية في د و متطابق الضلعين.

(١١) (أ) قائم الزاوية في ت.

(ب) (٦٥)

(ج) (٣٧ + ٣) ن

(١٢) (أ) $\text{ن}(ب\widehat{أ}ت) = \text{ن}(ب\widehat{و}ج) = \frac{1}{2}\text{ن}(ب\widehat{ت})$ (بالانتظار).

(١٣) (أ) نه = ١٠ سم.

(ب) (٦١٠) $\widehat{ب} \simeq$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) (أ) س = 54° , ص = 30° , ك = 96°

(ب) س = 112° , ص = 120° , ك = 38°

(ج) س = 85° , ص = 47° , ك = 90°

(د) س = 101° , ل = 84° , ك = 80° , ص = 67°

(٢) (أ) س = 22° , ك = 156° , ص = 78°

(ب) ل = 60° , س = 30° , ص = 60° , ك = 124° , م = 62°

(٣) (٩) $\simeq 123^\circ$.

(٤) (أ) (ج) $\widehat{ج} = 110^\circ$, (أ) (د) $\widehat{د} = 50^\circ$.

(٥) ليكن و مركز الدائرة.

قياس كل زاوية في المثلث تساوي $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

فيكون Δ د ه ز متطابق الأضلاع.

(أ) (د) (٨)

(ج) (٧)

(أ) (٦)

المجموعة أ تمارين أساسية

$$(1) ده = ٢١ \quad (2) من = ١٢$$

$$(3) س = ١٥ \quad (4) س = ٢٥, ٨, ٤, ص \approx ١٢, ٤$$

$$(5) \bar{6}, ٦ \quad (6) \bar{2}, ٢$$

$$(7) س \approx ٩, ٨, ص = ٢ \quad (8) س \approx \bar{6}, ١٠, ص = ١٠$$

$$(9) يجب كتابة (٥ + ٧, ٦) = س$$

(10) ه متصرف م فيكون: $\underline{\underline{م}} \perp \underline{\underline{و}}$
 اب نماص للدائرة عند ج $\therefore \underline{\underline{أ}} \perp \underline{\underline{و}}$.
 \leftrightarrow
 $\underline{\underline{ل}} \perp \underline{\underline{ام}} / \underline{\underline{أ}}$

$$(11) هب = ٨٠$$

$$(12) س = ٣٠٠$$

$$(13) جد = ٦ \quad (أ) جب = ١٢, ٦٥ \approx ٦٥$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

$$(1) هب = ١٠$$

$$(2) د = ١٢, جد = ٩$$

$$(3) س = ٣, ٥$$

$$(4) س \approx ٣, ٥, ص \approx ٢, ٩$$

$$(5) ١٤, ١ تقريباً.$$

$$(6) دك = ٨, ٥$$

$$(7) ماج = ٤$$

$$(8) (أ) لب \times لـه = لـد \times لـج$$

$$\therefore لـب = لـد \therefore لـج = لـه$$

$$(ب) د \times ه = أب \times ماج$$

$$\therefore د = أب \therefore ه = ماج \text{ ومنه } ب ج = ده.$$

مراجعة الوحدة السادسة

- (١) س = ٥٩٤ (٢) س = ٤٠
- (٣) س ≈ ٧,٢ (٤) س ≈ ٩,٨
- (٥) س(أب) = ٥١٢٠ (٦) س(أب) = ٥٦٥
- (٧) ز = ٥٦٠ (٨) س تقريرًا.
- (٩) س = ٥٧٠ ، ص = ٥١١٠ (١٠) س = ٦,٥
- (١١) س = ١٠,٥ (١٢) س = ٨
- (١٣) س = ٥٣٤ (١٤) س = ٥١٠٠
- (١٥) س = ٨,٨ (١٦) س = ٤٤ متراً.
- (١٧) س(ن) = ٥١٠٠ (١٨) س = ٥٦٠ ، س = ٥٣٠ ، س = ٥١٢٠ ، س = ٥٦٠

ćمارين إثائية

(١) Δ و ب متطابقان إذا: $C(\hat{A}B) = C(A\hat{B})$

Δ و ج متطابقان إذا: $C(\hat{A}J) = C(A\hat{J})$

ثم $C(\hat{A}B) = C(\hat{A}J)$ (تقابض بالرأس).

نستنتج أن: $C(\hat{A}B) = C(\hat{A}J)$.

يبقى $C(\hat{A}S) = C(\hat{A}J_S)$ لذا $S \leftrightarrow J_S$ // ص ص'.

(٢) $M \overline{H} \perp \overline{B}$ ، $H_B = H$ الذا M منصف عمودي على \overline{B}

وهكذا H منصف عمودي على B J

وأيضاً H منصف عمودي على $\overline{A}J$

فتكون H نقطة تقاطع المنصفات العمودية على أضلاع المثلث AJB

أو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث AJB .

$$(٣) C(H\hat{B}J) + C(H\hat{J}B) = ٥٤٥ - ٥١٣٥ = ٥١٨٠$$

$$٥٩٠ = ٥٤٥ \times ٢ = [C(H\hat{B}J) + C(H\hat{J}B)]$$

ويبيقى في المثلث AJB لأن $C(\hat{M}) = ٥٩٠$.

(٤) $\widehat{جَوْد}$ زاوية مركبة فيكون $\widehat{جَوْد} = \widehat{جَوْد}$

$\widehat{أَوْب}$ زاوية مركبة فيكون $\widehat{أَوْب} = \widehat{أَوْب}$

ولكن $\widehat{جَوْد} = \widehat{أَوْب}$ فيكون

$\widehat{جَوْد} = \widehat{أَوْب}$ نستنتج

$\widehat{جَمَّ ج} = \widehat{أَجَّ ب}$ (الوضع التبادلي الداخلي)

ومنه $\widehat{جَمَّ ج} / \widehat{أَجَّ ب}$

(٥) $\Delta دَج \cong \Delta دَب$ لأن: $دَج = دَب$ (صلع مشترك).

$دَج = أَب$ (شبه منحرف متطابق الضلعين).

$\widehat{جَدَّ} = \widehat{دَجَّ}$ زوايا القاعدة في شبه المنحرف

متطابق الضلعين، فيكون تطابق المثلثين على الحالة (ض. ز. ض)

ومنه نستنتج $\widehat{دَجَّ} = \widehat{دَبَّ}$

ولها صلع مشترك $دَج$ فيكون $دَج$ درباعي دائري.

تمرين ١-٧

تنظيم البيانات في مصفوفات

المجموعة ١ تمارين أساسية

٢ × ٣ (٢)

٢ × ١ (١)

٧ - ; ٣ × ٣ (٤)

كلاً، الرتبة ليست نفسها.

(٦) س = ٣ - ، س = ٣ ، ص = ٠ ، ص = ٥

(٥) (ج)

أنواع الكتب	الأسباب			
	الأسبوع الأول	الأسبوع الثاني	الأسبوع الثالث	الأسبوع الرابع
كتب الفقه	١٧٥	٢٠٠	١٥٠	١٧٥
تاريخ	١٢٥	١٧٥	١٢٥	١٢٥
علوم	١٥٠	١٧٥	٧٥	١٠٠
رياضيات	١٥٠	١٢٥	١٠٠	١٢٥

(ب)

				الأسبوع الأول	الأسبوع الثاني	الأسبوع الثالث	الأسبوع الرابع
١٧٥	٢٠٠	١٥٠	١٧٥				
١٢٥	١٧٥	١٢٥	١٢٥				
١٥٠	١٧٥	٧٥	١٠٠				
١٥٠	١٢٥	١٠٠	١٢٥				

تمثل الأعمدة الأسابيع في شهر
أغسطس وتمثل الصفوف أعداد
الكتب المباعة

(٨) اختلط الأمر على الطالب فبدأ بالصف الثاني ثم بالعمود الثالث والصحيح $\frac{1}{2} = ٤, ٥$.

أي الصف الثالث والعمود الثاني.

$$(٩) س = \frac{٩}{٢}, ص = -\frac{١٧}{٢}$$

$$(١٠) س = \frac{٥}{٣}, ص = \frac{٥}{٦}, ك = ٧, ل = ٥, م = ١ -$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

$$١ \times ٣ (٢)$$

$$٣ \times ٢ (١)$$

(٤) كلاً، الرتبة ليست نفسها

(٣) نعم، العناصر متساوية والرتبة نفسها

$$١, ٣ \times ٢ (٦)$$

$$٠, ٣ \times ٤ (٥)$$

$$\left[\begin{array}{ccccccc} ٩٨ & ٩٦ & ٩٣ & ٨٨ & ٨٥ & ٨٢ \\ ٢٠ & ٣١ & ٣٦ & ٤٣ & ٤٧ & ٥١ \end{array} \right] = \frac{١}{-} (٧)$$

٤٣ مليوناً، يمثل عدد المستخدمين للتليفزيون الأبيض والأسود سنة ١٩٨٤.

(٨)

٥١	٨٢
٤٧	٨٥
٤٣	٨٨
٣٦	٩٣
٣١	٩٦
٢٠	٩٨

٩٣ مليوناً، يمثل عدد مستخدمي التليفزيون الملون سنة ١٩٨٧.

$$(9) س = ٢ ، ص = \frac{٣}{٥}$$

$$(10) س = ٠ ، ك = ١٠ - ، ص = ٣ - ، ل = ٢ -$$

$$(11) س = ٢ ، ص = \frac{٩}{٤} ، ك = ١ - ، ل = ٠ ، ن = \frac{١}{٤} ، م = ٤ -$$

تمرين ٧-٢

جمع وطرح المصفوفات

المجموعة ١ تمارين أساسية

$$\begin{bmatrix} : & : \\ : & : \end{bmatrix} (2)$$

$$\begin{bmatrix} ٠ & ٢ - & ٠ \\ ٢ - & ٠ & ٢ - \end{bmatrix} (1)$$

$$\begin{bmatrix} ٠ & ٦ - \\ ١٢ & ٤ - \\ ١٠ & ٢ - \end{bmatrix} (4)$$

$$\begin{bmatrix} ١ - & ٥ - & ٨ \\ ٣ - & ٦ - & ١١ - \end{bmatrix} (3)$$

(٥) ممكن، لها الرتبة نفسها: 2×2 .

(٦) ممكن، لها الرتبة نفسها: 2×3 .

(٧) غير ممكن، أ من الرتبة 2×4 ، ب من الرتبة 2×3 .

(٨) غير ممكن، ج من الرتبة 3×2 ، د من الرتبة 2×4 .

(٩) ممكن، لها الرتبة نفسها: 2×3 .

$$\begin{bmatrix} ٦٢ & ٩ \\ ١١ - & ١٢٥ \end{bmatrix} (11)$$

$$\begin{bmatrix} ١١ & ١ - & ٤ \\ ٢ & ١ - & ٨ - \end{bmatrix} (10)$$

$$\begin{bmatrix} ٥ & ٢٤ & ١٣ \\ ٢٣ - & ١٣ - & ٤ - \end{bmatrix} (13)$$

$$\begin{bmatrix} ١ & ٢ & ٨ \\ ٧ & ٥ & ٢ - \\ ٠ & ٣ & ١٢ \end{bmatrix} (12)$$

أنشطة/إناث

$$\begin{bmatrix} ٥٧ \\ ٥٨ \\ ٢٩ \\ ٦٠ \end{bmatrix}$$

أنشطة/ذكور

$$\begin{bmatrix} ٥٣ \\ ٥٤ \\ ٣٩ \\ ٤١ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4- \\ 4- \\ 10 \\ 19- \end{bmatrix} \quad (ج)$$

$$\begin{bmatrix} 110 \\ 112 \\ 68 \\ 101 \end{bmatrix} \quad (ب)$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 3- & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3- & 2 \\ 7- & 6 & 5 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} : & : \\ : & : \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad (3)$$

المصنع الثاني

$$\begin{bmatrix} 1200 & 400 \\ 1600 & 600 \end{bmatrix}$$

المصنع الأول

$$\begin{bmatrix} 700 & 500 \\ 1900 & 1300 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 500- & 100+ \\ 300+ & 700+ \end{bmatrix} \quad (ب)$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 2- & 1- \\ 5 & 4- & 2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 6- & 6 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\begin{bmatrix} 6- & 6- \\ 6- & 5 \end{bmatrix} \quad (6)$$

(٩) تنوع الإجابات.

$$\begin{bmatrix} 2- & 0 \\ 1- & 0 \\ 0 & 2- \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 1 & 1- \\ 2- & 6- & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2- & 3- \\ 0 & 0 & 2- \\ 8- & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (10)$$

(١٣) ممكن.

(١٤) ممكن.

(١٥) غير ممكن.

(١٦) غير ممكن.

$$\begin{bmatrix} 12 & 2 & 9 \\ 7 & 11 & 15 \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 1 & 1 \\ 1 & 11 \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 2 \\ 28 & 22 \\ 21 & 6 \end{bmatrix} \quad (20)$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 2 \\ 4 & 6 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad (19)$$

تمرين ٧-٣

ضرب المصفوفات

المجموعة ١ تمارين أساسية

$$\begin{bmatrix} 34 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 12 & 5 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 17 \\ \frac{11}{5} & \frac{11}{5} \\ \frac{14}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

(٧) غير معروف.

(٦) معروف.

(٥) معروف.

(٩) معروف.

(٨) معروف.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 1,5 \\ 2 & 3,5 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 10 & 4 \end{bmatrix} \quad (10)$$

(ب) (١٣)

$$\begin{bmatrix} 24 & 17 \\ 7 & 33 \\ 18 & 69 \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 1 \\ 5 & 1 & 6 \\ 0 & 12 & 3 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 90 \\ 42 & 78 \\ 30 & 30 \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 12 & 3 \\ 5 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad (16)$$

(١٨) [٥, ٩ ١٣, ٢ ١٠, ٣]، تمثل العناصر مجموع مبيعات الأغراض الثلاثة في كل محل.

(ب) أجمع عناصر المصفوفة في (أ).

(ج) ١١,٥٠٠ ديناراً.

(١٩) تنوّع الإجابات. مثل: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(٢٠) س = ٣ - ص = ٩ -

(٢١) نعم.

$\begin{bmatrix} 2- & 1 \\ 18- & 11 \end{bmatrix} = \underline{n} \times \underline{m}$ ≠ $\begin{bmatrix} 17 & 8- \\ 9- & 4 \end{bmatrix} = \underline{k} \underline{l} \underline{a} \underline{m} \underline{n} \times \underline{n}$

(٢٢) كلام (ب).

المجموعة ب تمارين تعزيزية

$$\begin{bmatrix} 0 & 34 \end{bmatrix} \quad (٢)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 8- \\ 8- & 0 \end{bmatrix} \quad (١)$$

$$\begin{bmatrix} 1- & 0 & 1 \\ 1- & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (٤)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 9- \\ 3- & 2 & 8 \end{bmatrix} \quad (٣)$$

(٥) معّرف لأن عدد أعمدة أ يساوي عدد صفوف ب.

(٦) غير معّرف لأن عدد أعمدة ج مختلف عن عدد صفوف أ.

(٧) معّرف لأن عدد أعمدة ب يساوي عدد صفوف ج.

(٨) غير معّرف لأن عدد أعمدة أ مختلف عن عدد صفوف د.

(٩) معّرف لأن عدد أعمدة ج يساوي عدد صفوف د.

$$\begin{bmatrix} 24- & 17 \\ 7- & 33- \\ 18- & 69 \end{bmatrix} \quad (١١)$$

$$\begin{bmatrix} 6- & 9 \\ 3- & 15 \\ 12- & 6 \end{bmatrix} \quad (١٠)$$

$$\begin{bmatrix} 10- & 8 & 16 \\ 10- & 9- & 15 \\ 5- & 11 & 2 \end{bmatrix} \quad (١٣)$$

$$\begin{bmatrix} 1- & 34 \\ 13- & 6 \\ 16 & 7- \end{bmatrix} \quad (١٢)$$

(١٤) كلام ب مصفوفة من الرتبة 2×2 ، ب من الرتبة 3×3 .

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 12 \\ 6 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \underline{b} \times \underline{b} , \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \underline{b} \times \underline{b} , \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \underline{b} , \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \underline{b}$$

مثال: أ

الثلاثاء الأربعاء الخميس

(١٥) العائد اليومي $\begin{bmatrix} 2570 & 1950 & 2100 \end{bmatrix}$

(١٦) س = ٢- ، ص = ٣-

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \underline{\underline{h}} \times \underline{\underline{b}} + \underline{\underline{b}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1- \\ 2- & 3 \end{bmatrix} = \underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{h}}, \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{h}} \times \underline{\underline{b}}$$

$$\therefore \text{ يوجد مساواة} \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \underline{\underline{h}} \times \underline{\underline{b}} + \underline{\underline{b}} \times \underline{\underline{h}}$$

تمرين ٧-٤

مصفوفات الوحدة والنظير الضري (المعكوس)

المجموعة ٤ تمارين أساسية

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2- & 3 \\ 3 & 4- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad (١)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{10}- & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \quad (٢)$$

$$\begin{bmatrix} 1,5- & 2 \\ 1 & 1- \end{bmatrix} \quad (٨) \quad \begin{bmatrix} \frac{11}{14}- & (4) \\ \frac{1}{2}- & \frac{1}{8}- \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{16} \end{bmatrix} \quad (٧) \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1- \end{bmatrix} \quad (٦)$$

(٩) لا يوجد نظير ضري لأن المحدد = $4 \times 6 - (-3) \times (-8) = 0$

$$= \begin{bmatrix} 4- & 0 \\ 1- & 0 \end{bmatrix} \quad (١١)$$

لا يمكن، لأن محدد

$$\begin{bmatrix} 17- & 15- \\ 29 & 26 \end{bmatrix} \quad (١٠)$$

٣٦ (١٣)

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad (١٢)$$

٢ (١٥)

٠ (١٤)

$$\begin{bmatrix} 8 & 23 \\ 16- & 46- \end{bmatrix} = \quad (١٧)$$

كلاً، ناتج الضرب =

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \quad (١٦)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & -5 \end{bmatrix} \quad (19)*$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$S = \frac{1}{\Delta} \quad (20)$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{4}{9} & \frac{2}{27} \\ \frac{2}{9} & \frac{10}{27} \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$120- (10)$$

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 15 \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \quad (12) \text{ كلا، ناتج الضرب}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (14)*$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \quad (13)$$

تمرين ٧-٥

حل نظام من معادلتين خطيتين

المجموعة ١ تمارين أساسية

$$\begin{bmatrix} 5 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S \\ C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

مصفوفة مصفوفة

المعاملات \times المتغيرات = الثوابت

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S \\ C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

مصفوفة مصفوفة

المعاملات \times المتغيرات = الثوابت

$$3S - C = 1 - 2S + 4C \quad (3)$$

$$2S + 4C = 5 - S - 2C \quad (4)$$

$$\begin{matrix} 2 = S \\ 1 = C \end{matrix} \left[\begin{matrix} 5 \\ 6 \end{matrix} \right] \left[\begin{matrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} S \\ C \end{matrix} \right], \left[\begin{matrix} 5 \\ 6 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} S \\ C \end{matrix} \right] \left[\begin{matrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{matrix} \right] \quad (1,2) \quad (5)$$

$$\begin{matrix} 1 = S \\ 0 = C \end{matrix} \left[\begin{matrix} 1 \\ 5 \end{matrix} \right] \left[\begin{matrix} 3 & 16 \\ 1 & 5 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} S \\ C \end{matrix} \right], \left[\begin{matrix} 1 \\ 5 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} S \\ C \end{matrix} \right] \left[\begin{matrix} 3 & 1 \\ 16 & 5 \end{matrix} \right] \quad (0,1) \quad (6)$$

$$0 \neq 80 = 100 - 20 = \text{المحدد} \left[\begin{matrix} 5 & 20 \\ 1 & 20 \end{matrix} \right] \quad (7)$$

نعم،

$$0 = 12 - 12 = \text{المحدد} \left[\begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{matrix} \right] \quad (8)$$

كلاً،

$$0 \neq \frac{5}{36} = 1 - \frac{2}{3} = \text{المحدد} \left[\begin{matrix} 1 & \frac{2}{3} \\ 1 & 1 \end{matrix} \right] \quad (9)$$

نعم،

$$0 = \left| \begin{matrix} 4 & 2 \\ 6 & 3 \end{matrix} \right| = \Delta, 10 = \left| \begin{matrix} 1 & 4 \\ 1 & 6 \end{matrix} \right| = \Delta, 5 = \left| \begin{matrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{matrix} \right| = \Delta \quad (10)$$

$$12 = \left| \begin{matrix} 7 & 2 \\ 1 & 2 \end{matrix} \right| = \Delta, 36 = \left| \begin{matrix} 1 & 7 \\ 5 & 1 \end{matrix} \right| = \Delta, 12 = \left| \begin{matrix} 1 & 2 \\ 5 & 2 \end{matrix} \right| = \Delta \quad (11)$$

$$8 = \left| \begin{matrix} 4 & \frac{1}{2} \\ 2 & \frac{1}{4} \end{matrix} \right| = \Delta, 1 = \left| \begin{matrix} \frac{1}{4} & 4 \\ \frac{3}{8} & 2 \end{matrix} \right| = \Delta, \frac{1}{4} = \left| \begin{matrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{matrix} \right| = \Delta \quad (12)$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

$$\left[\begin{matrix} 7 \\ 2 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} S \\ C \end{matrix} \right] \left[\begin{matrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{matrix} \right] \quad (1)$$

مصفوفة مصفوفة
المعاملات × المتغيرات الثوابت

$$\left[\begin{matrix} 11 \\ 18 \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} S \\ C \end{matrix} \right] \left[\begin{matrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{matrix} \right] \quad (2)$$

مصفوفة مصفوفة
المعاملات × المتغيرات الثوابت

=

$$\begin{array}{l} 3 = س \\ 2 = ص \end{array} \left[\begin{array}{c} 12 \\ 7 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} س \\ ص \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} 12 \\ 7 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} س \\ ص \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{array} \right] \quad (3)$$

$$\begin{array}{l} 8 = س \\ 7 = ص \end{array} \left[\begin{array}{c} 5 \\ 6 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} س \\ ص \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} 5 \\ 6 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} س \\ ص \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{array} \right] \quad (4)$$

$$2, س = 6, ص = \left[\begin{array}{c} 6 \\ 2 \end{array} \right] \quad (5)$$

(٦) لا حل وحيد.

$$22 - = \left| \begin{array}{cc} 7 & \frac{1}{2} \\ 9 & \frac{5}{2} \end{array} \right| = \Delta, 11 - = \left| \begin{array}{cc} \frac{3}{2} & 7 \\ \frac{7}{2} & 9 \end{array} \right| = \Delta, \frac{11}{2} - = \left| \begin{array}{cc} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{2} & \frac{5}{2} \end{array} \right| = \Delta \quad (7)$$

$$10 - = \frac{3}{5}, س = \left| \begin{array}{cc} 4 & \frac{1}{5} \\ 5 & \frac{2}{5} \end{array} \right| = \Delta, \frac{2}{5} - = \left| \begin{array}{cc} \frac{2}{5} & 4 \\ \frac{3}{5} & 5 \end{array} \right| = \Delta, \frac{1}{25} = \left| \begin{array}{cc} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right| = \Delta \quad (8)$$

(٩) ثمن المحاجة: ٢٠٠ فلس، ثمن القلم: ٢٥٠ فلساً.

مراجعة الوحدة السابعة

$$2 \times 6, \left[\begin{array}{cc} 37 & 30 \\ 33 & 40 \\ 14 & 42 \\ 1 & 37 \\ 28 & 39 \\ 2 & 44 \end{array} \right] \quad (1)$$

(ب) ١-

$$\left[\begin{array}{ccc} 2 & 20 & 23 \\ 30 & 12 & 29 \\ 3 & 24 & 21 \end{array} \right] \quad (3)$$

$$\left[\begin{array}{cc} 7 & 2 \\ 4 & 2 \end{array} \right] \quad (2)$$

$$\left[\begin{array}{cc} 30 & 9 \\ 12 & 63 \end{array} \right] \quad (5)$$

$$\left[\begin{array}{cc} 14 & 5 \\ 12 & 6 \\ 52 & 18 \end{array} \right] \quad (4)$$

(٦) غير ممكن؛ عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى لا يساوي عدد الصفوف في المصفوفة الثانية.

(١٣- ٨)

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (٧)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (٩)$$

(٩)

٦ = ١١٢ + ١١٢ - لا يوجد المحدد (١١)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \underline{s} \quad (١٣)$$

$$\begin{bmatrix} 11 \\ 9 \end{bmatrix} = \underline{s} \quad (١٢)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 20 \\ 1 & 26 \end{bmatrix} = \underline{s} \quad (١٥)$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 15 \end{bmatrix} = \underline{s} \quad (١٤)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \underline{s} \quad (١٧)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \underline{s} \quad (١٦)$$

$$s = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ s \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad (٢-٠٠) \quad (١٨)$$

$$2 = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = \Delta, 8 = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \Delta, 4 = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \Delta \quad (٢-٢-٢) \quad (١٩)$$

(٢٠) تنوّع الإجابات.

(٢١) نعم، تتحقّق من عمل الطّلاب.

(٢٢) س = سعر القرنفلة

ص = سعر الأقحوانة

$$10s + 5c = 12,5 \quad (٢٠)$$

$$\begin{bmatrix} 0,75 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12,5 \\ 11,75 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{5}{50} & \frac{8}{50} \\ \frac{10}{50} & \frac{5}{50} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12,5 \\ 11,75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} \quad 11,75 = 8s + 5c$$

سعر القرنفلة الواحدة: ٧٥٠، دينار، سعر الأقحوانة الواحدة: ١ دينار.

تمارين إثرائية

(١) (أ) نعم. محدد $\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$ ؛ محدد $\begin{vmatrix} 1 & b \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{5}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = 1 - (\frac{1}{4} + \frac{5}{4}) = -\frac{1}{2}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

(ج) ليست صحيحة. النظير الضري لنتائج جمع مصفوفتين لا يساوي ناتج جمع النظير الضري لهاتين المصفوفتين.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = b, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 49 \\ 36 & 3 \end{bmatrix} = 2(\frac{1}{2} + \frac{49}{36}) = \frac{1}{2} + \frac{49}{18}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} + \frac{7}{6}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 25 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = 2(\frac{1}{2} + \frac{25}{4}) = \frac{1}{2} + \frac{25}{2}, \quad \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 11 & 15 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2} \times \frac{10}{11}) = \frac{1}{2} - \frac{5}{11}$$

$$\text{الإجابتان مختلفتان.} \quad \begin{bmatrix} 13 & 46 \\ 39 & 24 \end{bmatrix} = 2(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{46}{39}) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 13 & 6 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ 9 & 0 \end{bmatrix} = 2(\frac{1}{2} + \frac{9}{9}) = 2, \quad \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} + \frac{3}{3} = \frac{1}{2}$$

$$, \quad \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ 9 & 0 \end{bmatrix} = 2(\frac{1}{2} + \frac{9}{9}) = 2, \quad \begin{bmatrix} 4 & 22 \\ 2 & 12 \end{bmatrix} = 2(\frac{1}{2} + \frac{22}{12}) = \frac{1}{2} + \frac{11}{6}$$

$$(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = 1.$$

(٣) (أ) س عمر جاد، ص عمر ربيع.

$$\left. \begin{array}{l} 2s - 3c = 5 \\ 2c - 3s = 5 \end{array} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}, \quad \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$. \quad \begin{bmatrix} 19 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ c \end{bmatrix}$$

$$11 = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = \Delta, 19 = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = \text{ص} \Delta, 1 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = \Delta \quad (ه)$$

$$\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} = \frac{3}{-}, \quad \begin{bmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} = \frac{2}{-} \quad (أ) (٤)$$

(ب) ١. عَوْض س + ص بـ س.

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} = \underline{ب} \cdot, \quad \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} = (\underline{م}) \underline{م} \cdot ٢$$

$$\begin{bmatrix} \frac{s^2 + \cancel{ص}}{2} + \cancel{s} \cancel{ص} & s + \cancel{ص} & 1 \\ s + \cancel{ص} & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \cdot ٣$$

$$\underline{م} (س) \times \underline{م} (ص) = \begin{bmatrix} \frac{(s + \cancel{ص})(s + \cancel{ص})}{2} & s + \cancel{ص} & 1 \\ s + \cancel{ص} & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} = \underline{م} (س + ص) \cdot ٤$$


(٥) مثال: $\underline{أ} = ١\pm$, $\underline{د} = ١\pm$, $\underline{ب} = ٠$, $\underline{ج} = ٠$.

تمرّن ٨-١

دائرة الوحدة في المستوى الإحداثي

المجموعة ٤ تمارين أساسية

القياس بالراديان	القياس بالدرجات	(١)
$\frac{\pi}{4}$	٥٤٥	
$\frac{\pi^3}{4}$	٥١٣٥	
$\pi -$	٥١٨٠-	
$\frac{\pi^5}{6} -$	٥١٥٠-	
$\frac{\pi^5}{4} -$	٥٢٢٥-	
$\frac{\pi^5}{6}$	٥١٥٠	



- (٢) $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
- (أ) $\frac{1}{2}$
- (ب) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (ج) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- (د) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (هـ) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$
- (و) ٢

$$\frac{\sqrt{3}}{2} - , \frac{\sqrt{3}}{2} - (٤)$$

$$\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} (٦)$$

(٨) الربع الثاني.

(١٠) الربع الرابع.

(٩) محور السينات السالب.

(١١) الربع الثالث.

الربع الثاني

$$\text{جتا } \theta > 0$$

$$\text{جا } \theta < 0$$

الربع الثالث

$$\text{جتا } \theta > 0$$

$$\text{جا } \theta > 0$$

(١٢) (أ) الربع الأول

$$\text{جتا } \theta < 0$$

$$\text{جا } \theta < 0$$

الربع الرابع

$$\text{جتا } \theta < 0$$

$$\text{جا } \theta > 0$$

(ب) (ب)

(١٣) باستخدام دائرة الوحدة، نرى أن الأضلاع النهاية للزوايا: $0^\circ, 180^\circ, 360^\circ$ تقع على محور السينات وبالتالي «جا» هذه الزوايا تساوي ٠ . و «جتا» هذه الزوايا هي: ١ ، ١ ، ١ على التوالي.

تقع الأضلاع النهاية للزوايا $90^\circ, 270^\circ$ على محور الصادات فتكون $\text{جتا}(90^\circ) = \text{جتا}(270^\circ) = 1$ ، $\text{جا}(90^\circ) = \text{جا}(270^\circ) = -1$.

$$10^\circ (١٦)$$

$$\frac{\pi}{3} (١٥)$$

$$30^\circ (١٤)$$

$$90^\circ (١٩)$$

$$(١٨) (د)$$

$$\frac{\pi}{2} (١٧)$$

(في التمارين ١٤ - ١٩ ، تحقق من رسومات الطلاب).

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(٣) (أ)

(٢) (ب)

(١) (أ)

(٦) (د)

(٥) (ج)

(٤) (أ)

(٩) (أ)

(٨) (ب)

(٧) (د)

تمرين ٨-٢

العلاقات بين الدوال المثلثية (١)

المجموعة أ تمارين أساسية

(د) جا θ

(ج) جتا θ

(ب) -جتا θ

(١) (أ) -جا θ

(ج) -جاس

(ب) -جتاس

(٢) (أ) -ظاس

$$\theta = \frac{1}{\tan} = \frac{1}{(\pi + \theta)} \quad (٣) \quad (أ)$$

$$\theta = \frac{1}{\tan} = \frac{1}{\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)} \quad (ب) \quad (أ)$$

$$\theta = \frac{\theta + \frac{\pi}{2}}{\tan} = \frac{\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)}{\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{\tan} \quad (ج) \quad (أ)$$

$$\theta = \frac{1}{\tan(\theta)} = \frac{1}{\tan(\theta)} \quad (د) \quad (أ)$$

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ - (ج)

١- (ب)

$\frac{1}{2}$ (أ)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ - (ج)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ - (ب)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (أ) (٥)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج)

١ (ب)

$\frac{1}{2}$ (أ) (٦)

(أ) (١٠)

(ب) (٩)

(أ) (٨)

(ب) (٧)

(ب) ٠ (صفر)

(أ) ٢- جتا

$$(أ) س = \sin 2 + \frac{\pi}{3} \quad \text{أو} \quad س = \sin 2 + \frac{\pi}{3} \quad (ك) \in \{\}$$

$$(ب) س = \sin 2 + \frac{\pi}{3} \quad (ك) \in \{\} \quad \pi = \frac{\pi}{3}$$

$$(ج) س = \sin 2 + \frac{\pi}{3} \quad \text{أو} \quad س = \sin 2 + \frac{\pi}{3} \quad (ك) \in \{\}$$

$$(د) س = \sin 2 + \frac{\pi}{3} \quad \text{أو} \quad س = \sin 2 + \frac{\pi}{3} \quad (ك) \in \{\}$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

- | | | | |
|---------|---------|---------|-------------|
| (د) (ب) | (ج) (ب) | (ب) (ب) | (أ) (أ) (أ) |
| (ج) (أ) | (ب) (ب) | (ب) (ب) | (أ) (أ) (أ) |
| | (ه) (أ) | (د) (أ) | (أ) (أ) (أ) |
| | (أ) (أ) | | (أ) (أ) (أ) |
| | | (ب) | (أ) (أ) (أ) |

العلاقات بين الدوال المثلثية (٢)

المجموعة ١ تمارين أساسية

$$\frac{\sqrt{3}}{12} = \theta \tan \quad (1) \quad \text{جتا } \frac{\sqrt{3}}{5} = \theta$$

$$\tan \theta = \sqrt{3}$$

$$\cot \theta = \frac{\sqrt{3}}{12} \quad (2) \quad \text{جتا } \frac{1}{3} = \theta$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (3)$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{4} \quad (4)$$

$$1 \quad (5)$$

$$0 \quad (صفر)$$

$$0 \quad (7)$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad (8)$$

$$\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = \sec^2 \theta - (\sec^2 \theta - 1) = 1 \quad (9)$$

$$1 = \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = \sec^2 \theta - \tan^2 \theta \times 1 \quad (10)$$

$$3 \sec^2 \theta + 4 \operatorname{cosec}^2 \theta = 3(\sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta) = 3 + \operatorname{cosec}^2 \theta \quad (11)$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(٤) (أ)

(٣) (أ)

(٢) (أ)

(١) (أ)

(٨) (د)

(٧) (ج)

(٦) (أ)

(٥) (ب)

$$(٩) \operatorname{جا} \theta (\operatorname{ظتا} \theta + \operatorname{ظا} \theta) = \operatorname{جا} \theta \left(\frac{\operatorname{جتا}^2 \theta + \operatorname{جا}^2 \theta}{\operatorname{جتا} \theta} \right) = \operatorname{جا} \theta \left(\frac{\operatorname{جتا} \theta + \frac{\operatorname{جا}^2 \theta}{\operatorname{جتا} \theta}}{\operatorname{جتا} \theta} \right) = \operatorname{جا} \theta \cdot \frac{1}{\operatorname{جتا} \theta}.$$

$$\frac{1}{\operatorname{جتا} \theta} = \frac{1}{\frac{1 - \operatorname{ظتا} \theta}{\operatorname{جا} \theta}} = \frac{\operatorname{جا} \theta}{1 - \operatorname{ظتا} \theta} = \frac{\operatorname{جا} \theta}{\operatorname{جا} \theta - \operatorname{جتا} \theta} = \frac{\operatorname{جا} \theta}{\frac{\operatorname{جا} \theta}{\operatorname{جا} \theta} - 1} = \frac{\operatorname{جا} \theta}{\operatorname{جا} \theta - 1} \quad (١٠)$$

مراجعة الوحدة الثامنة

(١) (أ) الربع الأول أو الثاني.

(ب) محور السينات السالب.

(ج) الربع الثاني أو الرابع.

(د) الربع الثاني أو الثالث.

(٦) (د)

(ج) ٤

(ب) $\frac{1}{4}$

(٢) (أ) ١٧

(ج) $1,281 - \approx$

(ب) $0,785 - \approx$

(٣) (أ) $0,785 \approx$

(ب) ٢

(٤) (أ)

$$(٥) (أ) 2 = \frac{\operatorname{جتا}^2 \theta - 2}{\operatorname{جتا}^2 \theta} = \frac{\operatorname{جتا}^2 \theta - 2}{\operatorname{جتا}^2 \theta} = \frac{1}{\operatorname{جتا}^2 \theta} + \frac{\operatorname{جا}^2 \theta}{\operatorname{جتا}^2 \theta} - \frac{1}{\operatorname{جتا}^2 \theta} =$$

$$(ب) = \frac{\operatorname{جتا}^2 \theta + \operatorname{جتا} \theta + \operatorname{جا}^2 \theta}{\operatorname{جتا}^2 \theta + 1} = \frac{\operatorname{جتا}^2 \theta + \operatorname{جا}^2 \theta + \operatorname{جتا} \theta}{\operatorname{جتا}^2 \theta + 1}$$

$$(٦) (أ) \operatorname{جتا}^4 \theta - \operatorname{جا}^4 \theta = (\operatorname{جتا}^2 \theta - \operatorname{جا}^2 \theta)(\operatorname{جتا}^2 \theta + \operatorname{جا}^2 \theta) = 1 \times (\operatorname{جتا}^2 \theta - \operatorname{جا}^2 \theta) = \operatorname{جتا}^2 \theta - \operatorname{جا}^2 \theta.$$

$$(ب) = \operatorname{جتا} \theta (\operatorname{ظتا} \theta + \operatorname{ظا} \theta) = \operatorname{جتا} \theta \left(\frac{\operatorname{جتا} \theta}{\operatorname{جتا} \theta} + \frac{\operatorname{جا} \theta}{\operatorname{جتا} \theta} \right) = \operatorname{جتا} \theta \cdot \frac{1}{\operatorname{جتا} \theta} = \frac{1}{\operatorname{جتا} \theta} = \operatorname{قنا} \theta.$$

$$(٧) (أ) س = \operatorname{س} = \operatorname{ك} \pi + \frac{\pi}{4} \quad (\operatorname{ك} \in \mathbb{Z})$$

$$(ب) \operatorname{جا} \operatorname{س} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \operatorname{س} = \operatorname{س} = \operatorname{ك} \pi + \frac{\pi}{3} \quad (\operatorname{ك} \in \mathbb{Z})$$

$$(ج) \operatorname{س} = \operatorname{س} = \operatorname{ك} \pi + \frac{\pi}{4} \quad (\operatorname{ك} \in \mathbb{Z})$$

تمارين إثرائية

(١) إذا كان الجيب وجيب التمام كليهما سالب، تكون الزاوية في الربع الثالث.

الزاوية 60° هي في الربع الأول (كلا) والزاوية -120° في الربع الثالث (نعم).

(د) ٢

(ج) ١

(ب) ٣٧

(أ) $\frac{1}{2}$

(ب) -٠

(أ) (٣)

$$(4) (أ) س = \pi + \frac{\pi}{3} \text{ أو } س = \frac{2\pi}{3} \text{ (كذلك)}$$

$$(ب) س = \frac{3}{2}\pi + \frac{\pi}{3} \text{ أو } س = \frac{11\pi}{6} \text{ (كذلك)}$$

$$(ج) س = \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{8} \text{ (كذلك)}$$

$$(د) س = \frac{\pi}{8} + \frac{5\pi}{6} \text{ (كذلك)}$$

$$(5) \frac{\theta - \operatorname{جتا}(\theta)}{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)} = \frac{\operatorname{جتا}(\theta - 1)}{\operatorname{جتا}(1 - \theta)} + \frac{\operatorname{جتا}(\theta - 1)}{\operatorname{جتا}(1 - \theta)}$$

$$\frac{\theta - \operatorname{جتا}^2(\theta) + \operatorname{جتا}^2(\theta) - 1}{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)} =$$

$$. \theta = \frac{2}{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)} = \frac{(1 - \operatorname{جتا}^2(\theta))}{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)} = \frac{\operatorname{جتا}^2(\theta) - 1}{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)} =$$

$$\frac{5\pi}{6} = \theta, \frac{\pi}{6} = \theta \quad (6)$$

$$(7) \frac{1}{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)} = \frac{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)}{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)} + 1 - 1 + \frac{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)}{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)} = \frac{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)}{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)} - \frac{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)}{\operatorname{جتا}(\theta - \theta)} =$$

$$(8) \frac{\operatorname{جتا}^2(\theta) - \operatorname{جتا}^2(\theta)}{\operatorname{جتا}^2(\theta) - \operatorname{جتا}^2(\theta)} = \frac{\theta^2 - \operatorname{جتا}^2(\theta)}{\operatorname{جتا}^2(\theta) - 1}$$

$$(9) س = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \text{ أو } س = \frac{\pi}{4}$$

$$(10) س = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \text{ أو } س = \frac{\pi}{3} \text{ (كذلك)}$$

$$\pi = \theta \quad (11)$$


$$(12) \frac{5\pi}{4} = \theta \text{ أو } \frac{\pi}{4} = \theta$$

$$(13) \operatorname{جتا}^2(\theta) + \theta = 0, \text{ لا حلّ لها.}$$

$$(14) \pi = \theta, \frac{5\pi}{3} = \theta, \frac{\pi}{3} = \theta$$

$$(15) \frac{5\pi}{3} = \theta, \frac{\pi}{4} = \theta$$

$$\frac{7\pi}{4} = \theta, \frac{11\pi}{3} = \theta$$



المجموعة ١ تمارين أساسية

(٤) (١-١٢)

(٣) (١،٦)


(٢) (١٤)

(١) (١٥)

$$(5) \quad \text{أ} = ٤, \text{ب} = ٣, \text{ج} = ٥$$

$$(6) \quad \text{م} = ٥, \text{ن} = ٦, \text{ك} = ٣, \text{م} = ٥$$

(٧) (أ)



$$(b) \left(\frac{1}{2}, 1 \right)$$

(ج) $\sqrt{61} \approx 7,81$ ، حوالي ١٩,٥ كيلومترًا.

(٨) إن إحداثيات نقطتي طرفي القطعة تكون المعكوس الجمعي في ما بينها.

(٩) (أ) ٥ وحدات.

(ب) قد تتنوع الإجابات، مثال على الإجابة: (٥, ٠), (٠, ٥), (٣, ٤), (٤, ٣), (٣, ٤).

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(٣) (أ)

(٢) (ج)

(١) (د)

(٥) (ج)

(٤) (ب)

$$(6) \quad \text{أ} = ٤, \text{ب} = ٢, \text{ج} = ٦, \text{د} = ١٠$$

$$(7) \quad \text{أ} = \text{م متصرف} : \text{م} = \frac{1}{2}, \text{ب} = \frac{3}{2}$$

$$\text{ن متصرف} : \text{ن} = \frac{11}{2}$$

$$(ب) \quad \text{م} = ٦, \text{ب} = ٤, \text{ج} = ٤, \text{د} = ٨$$

م = المتوسط الحسابي لطولي ب، ج، د

تقسيم قطعة مستقيمة

تمرين ٩-٢

المجموعة ١ تمارين أساسية

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (ب) ن(٤،٧) | (أ) ن $\left(\frac{5}{3}, 2\right)$ |
| (ب) م $\left(\frac{21}{4}, 4\right)$ | (أ) م $(7, -6)$ |
| (ب) د $\left(5, \frac{1}{3}\right)$ | (أ) د $(5, 1), (6, 2), (4, 0)$ |

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(أ) ن(١٥،١٠)

(ب) ن(١٦،٢٥)

(أ) م(٣،٤)

(أ) د = ج = ٤ ، ب = ج = د = ٤



إذا د ب ج متوازي الأضلاع.

(ب) س(٥،١)، ص(١،٧٥)، (١،٧٥)

ع(٣،٢٥)، ل(٣،٢٥)، (٢،٥)

(أ) ن $\left(\frac{9}{4}, \frac{7}{2}\right)$

(ب) ك $\left(\frac{7}{3}, 2\right)$



تمرين ٩-٣(١)

ميل الخط المستقيم

المجموعة ١ تمارين أساسية

(أ) $\frac{5}{3}$ ، تزايد درجة الحرارة $\frac{5}{3}$ درجات مئوية كل ساعة.

(ب) -٥، يهبط المظلي خمسة أمتار في الثانية.

(٥) غير معروف

(٤) صفر

(٣) $\frac{1}{2}$

(٢) -٣

(٦) غير معروف

(٨) صفر

(٧) $\frac{1}{2}$


(٦) ٢

(١٠) ظا(60°) = $\sqrt{3} \approx 1,732$ الميل.


(١١) ظا(45°) = ١ = ميل المستقيم: ص = س - ٧

(١٢) $\bar{6},2$ سم كل شهر.

(١٣) ٥ دينار لكل تذكرة.



(١٥)



(١٤)

(١٦) قد تختلف الإجابات. مثال: $(\frac{3}{4}, 1), (3, 4)$

(١٧) س = ٤

(١٨) ص = ١٢

(١٩) س = ٣

(٢٠) \bar{a} : صفر، \bar{b} : غير معروف، \bar{c} : -1 ، \bar{d} : $\frac{1}{2}$

(٢٤) (أ)

(٢٣) (ب)

(٢٢) (ب)

(٢١) (أ)

(٢٥) وجد سالم صيغة الميل كنسبة التغير الأفقي على التغير العمودي (الرأسي) وهذا خطأ. لإيجاد الميل نوجد نسبة التغير الرأسى على التغير الأفقي.

(٢٦) الميل = صفر، شرط أن تكون س ≠ ٠

(٢٧) نعم، \bar{a} ، \bar{b} \leftrightarrow \bar{c} لها الميل نفسه وهو $\frac{1}{3}$.

(٢٨) كلا، \bar{a} \leftrightarrow \bar{c} ليس لهما الميل نفسه. ميل \bar{a} \leftrightarrow \bar{b} = -2 ، ميل \bar{b} \leftrightarrow \bar{c} = ١

(٢٩) $-1 = \frac{1}{2} \times 2$ ، إذا المستقيمان متوازيان.

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(ج) إنها متساوية.

(ب) $\frac{2}{3}$

(أ) $\frac{2}{3}$

(٢) (أ) ٢، سعر الوجبة لكل شخص هو ٢ دينار.

(ب) ١٠ ليترات في ٧٥ كيلومتراً. معدل صرف الوقود ١ ليتر في ٥,٧ كم.

(٦) ١ -

(٥) $\frac{3}{2}$

(٤) ٢

(٣) $\frac{2}{3}$

(٧) الميل: $s =$

(٨) الميل = ١ أو -1 .

(٩) غير معروف.

(١٠) غير معروف.

(١١) صفر.

(١٢) قد تختلف الإجابات. مثال: $\left(\frac{1}{2}, 1, 2\right)$, $\left(1, -\frac{1}{2}, 1\right)$

(١٣) $s = 0$

(١٤) $s = -6$

(١٥) $s = 6$

$$\text{میل } \overrightarrow{AB} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{میل } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}$$

$$\text{میل } \overrightarrow{CD} = -\frac{1}{2}$$

(١٧) (ب) (١٨) (أ) (١٩) (ب)

(٢٠) (أ) ٥، ١، ١ ديناراً في اليوم.

(ب) ١٥ دينار.

(٢١) الميل = $\frac{-s}{2}$

(٢٢) كلا، \overleftrightarrow{AB} ، \overleftrightarrow{BC} ليس لهما الميل نفسه.

(٢٣) نعم، \overleftrightarrow{AB} ، \overleftrightarrow{BC} لهما الميل نفسه $\frac{3}{2}$.

(٢٤) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

تمرّن ٩-٣ (ب)

میل الخط المستقيم

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) (أ) $s = 3 - 13$

(ب) $s = 2 - s$

(ج) $s = \frac{2}{3} - \frac{5}{3}s$

(٢) (أ) الميل = $\frac{5}{3}$ ، الجزء المقطوع: -١ ، ص = $\frac{5}{3}$ س - ١

(ب) الميل = ٠ ، الجزء المقطوع: ٣ ، ص = ٣

(ج) الميل = ١ ، الجزء المقطوع: ٣ ، ص = س + ٣

(ب) ٥ س - ٤ ص - ٣١ = ٠

(أ) ٤ س + ص - ٢٣ = ٠

(٥) ص = $\frac{1}{2}$ س + ٤

(٤) ص = $\frac{2}{3}$ س - $\frac{17}{3}$

(٧) ص = $\frac{1}{3}$ س + $\frac{3}{2}$

(٦) ص = ٤ س - ٤


المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) (أ) ص = $\frac{1}{3}$ س - ٤


(ب) س = ١

(ج) ص = ٢ س - ٣


(٢) ص = س - ٣




(٣) ص = $\frac{5}{2}$ س + $\frac{13}{2}$



(٤) ص = ١٠



(٥) س = ١



(٦) ص = س - ٣

(٧) (أ) ص = ٧س

(ب) ص = $\frac{4}{3}$ س

(ج) ص = $-\frac{5}{3}$ س + ٥

(٨) ص = ٣س - ٨

تمرين ٤-٩

البعد بين نقطة ومستقيم

المجموعة ١ تمارين أساسية

(٤) كلا

(٣) كلا

(٢) كلا

(١) نعم

$$\frac{\sqrt{10+2}}{5} = \frac{4}{\sqrt{10+2}} \quad (٥)$$

وحدة طول.

$$\frac{4}{\sqrt{13+7}} = \frac{4}{\sqrt{4+9}} \quad (٦)$$

وحدة طول.

$$n = \frac{17}{5} \quad (٧)$$

وحدة طول.

(٨) $\frac{5}{5}\sqrt{11}$ وحدة طول.

(٩) $\frac{26}{13}\sqrt{77}$ وحدة طول.

(١٠) $\frac{37}{37}\sqrt{711}$ وحدة طول.

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(٣) نعم

(٢) كلا

(١) كلا

(٤) $\frac{32}{5}$ وحدة طول.

(٥) $\frac{40}{13}$ وحدة طول.

(٦) $\frac{277}{2}$ وحدة طول.

(٧) $\frac{4}{5}$ وحدة طول.

(٨) $\frac{273}{2}$ وحدة طول.

تمرّن ٥-٩

معادلة الدائرة

المجموعة ١ تمارين أساسية

(د) كلا

(ج) نعم

(ب) كلا

(أ) كلا

(٢) (أ) $s^2 + c^2 = 9$

(ب) $(s - 4)^2 + (c - 5)^2 = 4$

(٣) (أ) $(s - 1)^2 + (c - 3)^2 = 25$

(ب) $s^2 + c^2 = 16$

(٤) (أ) $\sqrt{5}$ وحدة طول، (٣، ٣)

(ب) $\sqrt{272}$ وحدة طول، (١، ١)

(٥) (أ) $(s - 4)^2 + (c - 4)^2 = 16$

(٦) المركز (٤، ١)، $n = 5$

(٧) المركز (٨، ٠)، $n = 9$

(٨) المركز (٢، ٠)، $n = 7$

(٩) النقطة على الدائرة. معادلة المماس: $s - c = 2$

$$٩ = ٢(٣ - ص) + ٣(٢ - ص)$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

- (ج) $ن = ٣$
- (ب) $ن = ٤$
- (أ) $ن = ٢$
- (أ) $س = ٣ + (ص - ٣)$
- (ب) $س = ٤ + (ص - ٤)$
- (أ) $س = ٣ + (ص - ٣)$
- (ب) $س = ٤ + (ص - ٤)$
- (أ) $س = ٣ + (ص - ٣)$
- (ب) $س = ٤ + (ص - ٤)$
- (ج) $س = ٣ + ص = ٤$
- (أ) $س = ٣ + (ص - ٤)$
- (ب) $س = ١ + (ص - ١)$
- (أ) $\bar{N} = ٧$ المركز (١، ٢)، $ن = ٧$
- (أ) $\bar{N} = ٣$ المركز (-١، ١)، $ن = ٣$
- (أ) $س = ٥ - ص = ٥$
- (ج) (٦)
- (أ) $(٢ - ٢)$
- (ب) $(٢ - ٣)$

مراجعة الوحدة التاسعة

$$(١) ص = ١$$

$$(٢) (١، ٥) ؛ (١، ٣)$$

$$\lambda = \frac{٣}{٥}$$

$$(٤) متعامدان، \lambda = \left(\frac{٣}{٥} \right) \left(\frac{٥}{٣} - ١ \right)$$

$$(٥) (٢ + ٤) + (٣ - ٤) = ٥٢$$

$$(٦) (٤، ٧) د$$

$$(ب) د : ٢ س - ص = ١ \leftrightarrow$$

$$(٧) ٥ ص + س - ١٠ = ٠$$

(٨) ج (٤، ٥)

$$(ب) \overleftrightarrow{AB} = \overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{JB} \quad \text{أو} \quad \text{ميل } \overleftrightarrow{AB} = \text{ميل } \overrightarrow{AJ} + \text{ميل } \overrightarrow{JB}$$

(٩) (أ) ق (٨، ١٠)، ك (٥، ٥، ٨)

$$= \frac{5 - 5}{3 - 12} = \frac{8 - 8}{5, 5 - 10} \quad (ب)$$

$$(ج) \text{ ق } k = \frac{9}{3} ; \overrightarrow{B} = \overrightarrow{9} , \text{ إذًا } k = \frac{1}{3} \text{ ميل } \overrightarrow{B}$$


$$(د) \text{ ميل } \overrightarrow{AB} = \frac{3}{3} = 1 , \text{ ميل } \overrightarrow{B} = 0 ; \overrightarrow{AB} \text{ و } \overrightarrow{B} \text{ غير متعامدين.}$$

تمارين إثرائية

(١) (أ) معادلة المنصف العمودي ل \overrightarrow{OB} : $s - c = 3 + 0$ ، \overrightarrow{AB} : $s - c = 2 + 0$

$$(ب) \frac{25}{2} = 2 \left(\frac{7}{2} - \frac{1}{2} \right) + 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \quad (ج)$$

$$0 = 18 + c - s \quad (د) (أ) - (ب)$$



$$(ج) M_3 : 3s - 4c = 5 \quad (د) M_4 : 4s + 3c = 10$$

(د) (٤، ٧)، ب (١، ٢)

$$(ه) M_1 : 4s + 3c = 10 ; M_2 : 4s + 3c = 40 \quad (د)$$

$$(3) \frac{256}{25} = 2^2 + c^2$$

$$(4) (s+1)^2 + (c-3)^2 = \frac{121}{45}$$

$$(5) (s-2)^2 + c^2 = 1$$

$$(6) s^2 + (c-1)^2 = 4 \quad \text{أو} \quad (s-4)^2 + (c-1)^2 = 4 \quad \text{أو} \quad (s-4)^2 + (c+3)^2 = 4$$

$$\text{أو} \quad s^2 + (c+3)^2 = 4$$

(٧) لأن لها الميل نفسه - $\frac{1}{3}$.

(٨) ≈ 38 كم.


تمرين ١٠ - ١

تحليل البيانات

المجموعة ١ تمارين أساسية


الفئة	-٧٦	-٧٢	-٦٨	-٦٤	-٦٠	-٥٦
النكرار	٣	٤	٩	٣	٨	٣
مركز الفئة	٧٨	٧٤	٧٠	٦٦	٦٢	٥٨

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{78 \times 3 + 74 \times 4 + 70 \times 9 + 66 \times 3 + 62 \times 8 + 58 \times 3}{30} = 67,6$$



الفئة	النكرار المتجمع الصاعد	أقل من الحدود العلية للفئة	النكرار	(ب)
-٥٦	٣	٦٠	أقل من ٦٠	٣
-٦٠	٨	٦٤	أقل من ٦٤	٨
-٦٤	٣	٦٨	أقل من ٦٨	١٤
-٦٨	٩	٧٢	أقل من ٧٢	٢٣
-٧٢	٤	٧٦	أقل من ٧٦	٢٧
-٧٦	٣	٨٠	أقل من ٨٠	٣٠


ترتيب الوسيط: $\frac{٣٠}{٢} = ١٥$ ، الوسيط يساوي حوالي ٦٨,٥ بحسب منحنى التكرار المتجمع الصاعد.



الفئة	النكرار	الحد الأدنى للفئة فأكثـر	النكرار المتجمع النازل	(ج)
-٥٦	٣	٥٦ فـأكـثر	٣٠	٥٦ فـأكـثر
-٦٠	٨	٦٠ فـأكـثر	٢٧	٦٠ فـأكـثر
-٦٤	٣	٦٤ فـأكـثر	١٩	٦٤ فـأكـثر
-٦٨	٩	٦٨ فـأكـثر	١٦	٦٨ فـأكـثر
-٧٢	٤	٧٢ فـأكـثر	٧	٧٢ فـأكـثر
-٧٦	٣	٧٦ فـأكـثر	٣	٧٦ فـأكـثر


ترتيب الوسيط: $\frac{٣٠}{٢} = ١٥$ ، الوسيط يساوي حوالي ٦٨,٥ بحسب منحنى التكرار المتجمع النازل.

النسبة	النكرار	أقل من الحدود العليا للفئة	النكرار المتجمع الصاعد	الحد الأدنى للفئة فأكثـر	النكرار المتجمع النازل
-٥٦	٣	٦٠ أقل من	٣	٥٦ فأكثـر	٣٠
-٦٠	٨	٦٤ أقل من	١١	٦٠ فأكثـر	٢٧
-٦٤	٣	٦٨ أقل من	١٤	٦٤ فأكثـر	١٩
-٦٨	٩	٧٢ أقل من	٢٣	٦٨ فأكثـر	١٦
-٧٢	٤	٧٦ أقل من	٢٧	٧٢ فأكثـر	٧
-٧٦	٣	٨٠ أقل من	٣٠	٧٦ فأكثـر	٣




ترتيب الوسيط: $\frac{3}{2} = 1.5$ ، الوسيط يساوي حوالي ١.٥ بحسب تقاطع كل من منحنى التكرار المتجمع النازل ومنحنى التكرار المتجمع الصاعد.

(هـ) الفتة الموالية: ٦٨، المنوال = $68 + \frac{4}{4+3} \times 4 \times 3 \simeq 70$



يبين المدرج التكراري حوالي ٧٠ للمنوال.

(٢) (أ) الفتة المنوالية: $60 - 69 = 60 - 69 + 1 = 1$ ، إذاً المنوال يساوي ٦٩ تقريباً.



يبين المدرج التكراري حوالي ٦٩ للمنوال.

(٦) (أ)

(٥) (ب)

(٤) (ب)

(٣) (أ)

(٩) (د)

(٨) (ج)


(٧) (ب)

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) ٢٣ تقريرًا.


الفئة	-٤٤	-٤٢	-٤٠	-٣٨
التكرار	٦	١٧	١٦	١١
مركز الفئة	٤٥	٤٣	٤١	٣٩

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{٤٥ \times ٦ + ٤٣ \times ١٧ + ٤١ \times ١٦ + ٣٩ \times ١١}{٥٠} = ٤١,٧٢$$




الفئة	التكرار	أقل من الحدود العليا لفئة	أقل من	النهاية
-٣٨	١١	٤٠	٤١	١١
-٤٠	١٦	٤٢	٤٣	١٦
-٤٢	١٧	٤٤	٤٥	١٧
-٤٤	٦	٤٦	٤٦	٤٦

ترتيب الوسيط: $\frac{٥٠}{٢} = ٢٥$ ، الوسيط يساوي حوالي ٤١,٧٥ بحسب منحنى التكرار المتجمع الصاعد.



الفئة	التكرار	أقل من الحدود العليا لفئة	أقل من	النهاية
-٣٨	١١	٣٨	٣٩	٥٠
-٤٠	١٦	٤٠	٤١	٢٧
-٤٢	١٧	٤٢	٤٣	٤٤
-٤٤	٦	٤٤	٤٥	٦


ترتيب الوسيط: $\frac{٥٠}{٢} = ٢٥$ ، الوسيط يساوي حوالي ٤١,٧٥ بحسب منحنى التكرار المتجمع النازل.



الفئة	النكرار	أقل من الحدود العليا للفئة	أقل من الحدود الصاعد	الحد الأدنى للفئة فأكثر	النكرار المتجمع الصاعد	النكرار المتجمع النازل
-38	١١	٤٠	٣٨	٥٠	٣٨ فأكثـر	٥٠
-40	١٦	٤٢	٤٠	٣٩	٤٠ فأكثـر	٣٩
-42	١٧	٤٤	٤٢	٢٣	٤٢ فأكثـر	٢٣
-44	٦	٤٦	٤٤	٦	٤٤ فأكثـر	٦

ترتيب الوسيط: $\frac{50}{2} = 25$, الوسيط يساوي حوالي ٤١,٧٥ بحسب نقطة تقاطع منحنى التكرار المتجمع النازل ومنحنى التكرار المتجمع الصاعد.

$$(هـ) \text{ الفئة المنوالية: } ٤٢ - \text{، المنوال} = \frac{٦}{٦+١٦} \times ٤٢ + ٥ \approx ٤٢,٥.$$



باستخدام المدرج التكراري يساوي المنوال حوالي ٤٢,٢٥.

تمرين ١٠-٢

الأرباعيات

المجموعة ١ تمارين أساسية


$$(أ) (١) ٧ = ٣ - ١٠$$

$$(ب) (٢) ١٢ = ١١ - ٢٣$$

$$(٢) \text{ مجمل الأعداد الخمسة } (٩٥, ٦٥, ٦١, ٥٤, ٥٠).$$

$$(٣) (أ) \text{ الأعداد الخمسة} = (٥٠, ٢٦, ٥, ٢٠, ١٢, ٥, ١١).$$


(ب)



(٤) البيانات: ٣، ٧، ٨، ١٠، ٩، ١١، ٢٠.

الوسيط = $m_2 = 9$ ، الأربعى الأدنى = $m_1 = 7$ ، الأربعى الأعلى = $m_3 = 11$

الأعداد الخمسة: (٢٠، ١١، ٩، ٧، ٣)



(٨) (ب)

(٧) (ب)

(٦) (ب)

(٥) (أ)

(١٠) (د)

(٩) (ج)

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) (أ) مجمل الأعداد الخمسة: (٤٩، ٥٨، ٦٤، ٧٧، ٨٠).

(ب) مجمل الأعداد الخمسة: (١٠٠، ١٠١، ٥، ١٠٣، ١٠٧، ١١٠).

(ج) مجمل الأعداد الخمسة: (١٢، ٥، ١٥، ١٩، ٢٠).

(٢) (أ) البيانات: ٦، ٧، ٨، ١١، ١١، ١٤، ١٣، ١١، ٨، ٦، ٣٣ (مع القيمة المتطرفة)


(ب) مجمل الأعداد الخمسة: (٦، ٧، ٨، ١٤، ١٣، ١١، ١١، ٦، ٧، ٨) (من دون القيمة المتطرفة)

مع القيمة المتطرفة:

مجمل الأعداد الخمسة: (٦، ٧، ٨، ١٤، ١٢).

من دون القيمة المتطرفة:


مجمل الأعداد الخمسة = (٦، ٧، ٨، ١٤، ١١).



(٣) (أ) البيانات: ١، ٣، ٦، ٩، ١٤، ٢٢، ٢٤، ٢٩.

$$\text{مجموع الأعداد الخمسة} = (٢٩, ٢٢, ٩, ٥, ٣, ١).$$

(ب)



يبين مخطط الصندوق الفرق في المساحة بين معدل دخل الفرد السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في المجموعة العربية.

تمرين ٣-١٠

الانحراف المعياري

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) (أ) المتوسط الحسابي $\bar{x} = ٦١$

$(x_i - \bar{x})^2$	$x_i - \bar{x}$	قيمة x_i
٨١	-٩	٥٢
٤	-٢	٦٣
٤٩	-٧	٥٤
٨١	-٩	٧٠
٢٥	-٥	٦٦
$٢٤٠ = \text{المجموع}$		

$$\sigma = \sqrt{\frac{240}{٥}} = ٤٨$$

الانحراف المعياري: $\sigma = ٤٨$

$$٦,٩٣ \approx$$

(ب) المتوسط الحسابي $\bar{x} = ١٠$

$$\sigma = \sqrt{\frac{٢٥٢}{٨}} = ٣١,٥$$

الانحراف المعياري: $\sigma = ٣١,٥$

$$٥,٦ \approx$$

$(x_i - \bar{x})^2$	$x_i - \bar{x}$	قيمة x_i
٨١	-٩	١
٦٤	-٨	٢
٤٩	-٧	١٧
٤	-٢	١٢
٢٥	-٥	١٥
٤	-٢	٨
٠	٠	١٠
٢٥	-٥	١٥
$٢٥٢ = \text{المجموع}$		

(٢) المتوسط الحسابي \bar{S} = ٥٠

$(S_r - \bar{S})^2$	$S_r - \bar{S}$	القيمة S
٤	-٢	٤٨,٠
١٠,٢٤	٣,٢	٥٣,٢
٥,٢٩	٢,٣	٥٢,٣
١١,٥٦	٣,٤-	٤٦,٦
٠,٠١	٠,١-	٤٩,٩
المجموع = ٣١,١٠		

$$\bar{x} = \frac{31,1}{5} = ٦,٢٢$$

$$\sigma = \sqrt{6,22} = ٢,٥$$

(٣)

-٤٥	-٤٠	-٣٥	-٣٠	-٢٥	-٢٠	الفئة
٦	١٤	١٠	٨	٦	٦	التكرار
٤,٥	٤٢,٥	٣٧,٥	٣٢,٥	٢٧,٥	٢٢,٥	مركز الفئة

$$\text{المتوسط الحسابي} = \bar{x} = \frac{47,5 \times 6 + 42,5 \times 14 + 37,5 \times 10 + 32,5 \times 8 + 27,5 \times 6 + 22,5 \times 2}{50} = ٣٦,٦$$

$(S_r - \bar{S})^2$	$S_r - \bar{S}$	القيمة S
١٩٠,٤٤	١٣,٨-	٢٢,٥
٧٧,٤٤	٨,٨-	٢٧,٥
١٤,٤٤	٣,٨-	٣٢,٥
١,٤٤	١,٢	٣٧,٥
٣٨,٤٤	٦,٢	٤٢,٥
١٢٥,٤٤	١١,٢	٤٧,٥
المجموع = ٤٤٧,٦٤		

$$\text{التبالين} = \frac{447,64}{50} = ٨,٩٥٢٨$$

$$\text{الانحراف المعياري} = \sigma = \sqrt{8,9528} = ٢,٣$$

(٦) (ب)

(٥) (أ)

(٤) ٣,٧٦٨

(٨) (ج)

(٧) (ج)

المجموعة ب تمارين تعزيزية

$$(1) (أ) \text{ المتوسط الحسابي } \bar{s} = \frac{42}{7}$$

القيمة s	$s - \bar{s}$	$(s - \bar{s})^2$
5	-1	1
7	1	1
6	0	0
4	-2	4
8	2	4
9	3	9
3	-3	9
المجموع		28

$$\sigma = \sqrt{\frac{28}{7}}$$

الانحراف المعياري: $\sigma = \sqrt{4} = 2$. نلاحظ أن قيم البيانات تتجمع أكثر حول المتوسط الحسابي.

$$(ب) \text{ المتوسط الحسابي } \bar{s} = \frac{320}{8} = 40$$

القيمة s	$s - \bar{s}$	$(s - \bar{s})^2$
34	-6	36
45	5	25
37	-3	9
42	2	4
36	-4	16
43	3	9
44	4	16
39	-1	1
المجموع		116

$$\sigma = \sqrt{\frac{116}{8}} = 14,5$$

الانحراف المعياري: $\sigma = \sqrt{14,5} \approx 3,8$. نلاحظ أن قيم البيانات تتجمع أكثر حول المتوسط الحسابي.

(2) (أ) المتوسط الحسابي $\bar{s} = 2,38$ أي أن المتوسط الحسابي لاستهلاك الطاقة الكهربائية هو 2,38 ميجاواط/ساعة يومياً.

(ب) التباين $\sigma^2 = 1,87$, الانحراف المعياري بواسطة الآلة الحاسبة هو: $\sigma = 1,368$ ميجاواط/ساعة تقريباً.

							(٣) الفئة
							التكرار
							مركز الفئة
-١٠٦	-١٠٢	-٩٨	-٩٤	-٩٠	-٨٦		
٥	٩	٣٢	٣٩	١٠	٥		
١٠٨	١٠٤	١٠٠	٩٦	٩٢	٨٨		


المتوسط الحسابي $\bar{x} = ٩٧,٨$ ستيلرًا؛ التباين $s^2 = ٦٢٥,٩$ ستيلرات.
الانحراف المعياري: $s = ٤,٤$ ستيلرات.

٤-١٠ تمرن طرق العد

المجموعة A تمارين أساسية

$$(1) ٦٦٦٦٦٦٦٦$$

$$(2) ١٢١٢١٢١٢$$



$$(3) ١٢١٢١٢١٢١٢$$

(٤) لأن الرقم الأول من اليسار لديه ٨ إمكانيات وكل من الأرقام الأخرى لديها ١٠ إمكانيات.

$$(5) ٤٤٠٤٤٠٨٢٢٨٦١٢٢$$

$$(6) ٣٦٣٦٦٦$$

$$(7) ٢٠٠٢٢٠٧٦$$

$$(8) ٦٨٠٦٨٠٩٩٣٣$$

$$(9) ٢٣٠٠$$

$$(10) ١١٢٨$$

$$(11) ٢٣٠٠$$

$$(12) ١٧٢٩٦$$

$$(13) ٥٦$$

$$(٤٨) ٣٩٩١$$

المجموعة B تمارين تعزيزية

$$(1) ٤٤$$

$$(2) ١٤٤$$

$$(3) ٢٤$$

المجموعة A تمارين أساسية

$$\frac{1}{9} = \frac{4}{36}; \{(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)\} \quad (1)$$

$$(1,3), (2,4), (3,5), (4,2), (5,1), (6,2), (1,1), (2,1), (3,1), (4,4), (5,3), (6,4) \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{18}{36}; \{(6,6), (4,6), (2,6), (5,5), (3,5), (1,5)\}$$

$$(3,6), (2,6), (1,6), (4,5), (3,5), (2,5), (1,5), (3,4), (2,4), (1,4), (2,3), (1,3), (1,2) \quad (3)$$

$$\frac{5}{12} = \frac{15}{36}; \{(5,6), (4,6)\}$$

$$0,2 \quad (6)$$

$$0,4 \quad (5)$$

$$0,4 \quad (4)$$

$$0,6 \quad (9)$$

$$0,7 \quad (8)$$

$$0,8 \quad (7)$$

$$\frac{4}{9} \quad (12)$$

$$\frac{20}{81} \quad (11)$$

$$0,123 \approx \frac{10}{81} \quad (10)$$

$$\frac{19}{30} \quad (14)$$

$$\frac{1}{9} \quad (13)$$

(١٥) مجموع الاحتمالات أكبر من ١، غير ممكن. إذًا هذه الأحداث لا يمكن أن تحصل معاً.

$$0,58 = 0,4 \times 0,3 - 0,4 + 0,3 \quad (أ) \quad (16)$$

$$0,7 = 0,3 - 0,1 \quad (ب)$$

$$0,12 = L(\bar{A}) \times L(A) \quad (ج)$$

$$0,2 = 0,8 - 0,7 + 0,3 = L(\bar{A} \cup A) - L(\bar{A})L(A) \quad (أ) \quad (17)$$

$$\frac{2}{7} = \frac{L(\bar{A} \cap \bar{B})}{L(\bar{B})} = L(\bar{A}) \quad (ب)$$

$$\frac{2}{3} = \frac{L(B \cap \bar{A})}{L(\bar{A})} = L(B) \quad (ج)$$

$$0,5 = \frac{0,25}{0,5} = \frac{L(B \cap \bar{A})}{L(\bar{A})} = L(B) \quad (د) \quad (18)$$

$$(أ) \quad (21)$$

$$(ب) \quad (20)$$

$$(د) \quad (19)$$

المجموعة B تمارين تعزيزية

$$(1,3), (6,2), (4,2), (3,2), (2,2), (1,2), (5,1), (4,1), (3,1), (2,1), (1,1) \quad (1)$$

$$(3,5), (2,5), (1,5), (5,4), (4,4), (3,4), (2,4), (1,4), (6,3), (5,3), (4,3), (3,3), (2,3) \quad (2)$$

$$\frac{5}{7} = \frac{30}{36}; \{(3,6), (2,6), (1,6), (4,5)\}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{9}{36}; \{(5,5), (5,3), (5,1), (5,1), (3,1), (1,1)\} \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} = \frac{9}{36}; \{(6,6), (4,6), (2,6), (6,4), (4,4), (2,4), (6,2), (4,2), (2,2)\} \quad (3)$$

$$\begin{array}{lll} ٠,٠٩ (٦) & \frac{٥}{٩} (٥) & ٠,٠٠٣٦ \approx \frac{٩!}{٩٠} (٤) \\ ٠,٦٤ (٩) & ٠,٠٦ (٨) & ٠,٠١ (٧) \\ & ٠,٧٢ (١٠) & \end{array}$$

(أ) ب حدثان مستقلان إذا:

$$L(A \cap B) = L(A) \times L(B)$$

$$0,7 \times 0,2 =$$

$$0,14 =$$

$$(B) L(B|A) = L(B) - L(A \cap B)$$

$$(ج) L(A \cup B) = L(A) + L(B) - L(A \cap B)$$

$$0,14 - 0,7 + 0,2 =$$

$$0,76 =$$


$$(د) ٠,٢$$

مراجعة الوحدة العاشرة

(أ) (١)

مركز الفئة	التكرار المجمع الصاعد (رجال)	أقل من الحدود العليا للفئة	الرجال	الفئة (العمر)
٢٥	٤٥٠٠	٣٠	٤٥٠٠	-٢٠
٣٥	٤٩٨٠	٤٠	٤٨٠	-٣٠
٤٥	٥٣٥٠	٥٠	٣٧٠	-٤٠
٥٥	٥٦٤٠	٦٠	٢٩٠	-٥٠
٦٥	٥٨٢٠	٧٠	١٨٠	-٦٠
٧٥	٥٩٣٠	٨٠	١١٠	-٧٠
٨٥	٥٩٦٠	٩٠	٣٠	-٨٠

(ب) \bar{s} = متوسط أعمار الرجال = ٣١ سنة تقريباً.



(ج) ترتيب الوسيط عند الرجال = ٢٩٨٠

- فئة الوسيط - ٢٠

الوسيط ≈ 27 سنة

٥٠٪ من الرجال دون ٢٧ سنة غير متزوجين.

(د) الفئة المنوالية لأعمر الرجال - ٢٠

المنوال يساوي بحسب الرسم البياني حوالي ١٥ سنة.

$$(أ) (٢) \bar{x} = \frac{130}{10}$$

(ب) ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٦، ١٧، ١٧

مجمـل الأعداد الخمسة: (٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣).


(ج) لا يوجد تشتت كبير لهذه الدرجات.

(د) الانحراف المعياري $s = \sqrt{97} = 3$ وهو صغير أي أن القيم تتجمع حول المتوسط الحسابي.

(أ) (٣) البيانات: ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٦، ١٧، ١٧

مجمـل الأعداد الخمسة = (١٧، ١٥، ٥، ١٢، ٨، ٥، ٧).



(ب) يبيـن المخطط عدم وجود تشتت كبير للقيم عن الوسيط ويـوجـد توزيع تماثـلي بين الوسيط والأربعـي الأدنـى والأربعـي الأعلـى.



تمارين إثرائية

الفئة	التكرار	أقل من الحدود العليا للفئة	التكرار المتعادل الصاعد	المحد الأدنى للفئة فأكثـر	التكرار المتعـادل النازـل
-١٠	١	٢٠	١	١٠ فأكثـر	٧٥
-٢٠	٧	٣٠	٨	٢٠ فأكثـر	٧٤
-٣٠	٥	٤٠	١٣	٣٠ فأكثـر	٦٧
-٤٠	٨	٥٠	٢١	٤٠ فأكثـر	٦٢
-٥٠	١١	٦٠	٣٢	٥٠ فأكثـر	٥٤
-٦٠	٢٢	٧٠	٥٤	٦٠ فأكثـر	٤٣
-٧٠	١٧	٨٠	٧١	٧٠ فأكثـر	٢١
-٨٠	٤	٩٠	٧٥	٨٠ فأكثـر	٤

(أ) (١)



$$(ب) ترتيب الوسيط = \frac{1+75}{2} = 38$$

- ٦٠ فئة الوسيط:

قيمة الوسيط بيانيًا: تقريبًا ٦٢,٥ كجم.

$$(ج) المنوال حسابيًا: 60 \times \frac{17}{17+11} + 1 = 66,1 \text{ كجم.}$$

باستخدام المدرج التكراري نجد أن المنوال

تقريبًا يساوي ٦٦ كجم.

$$(د) المتوسط الحسابي: \frac{4375}{75} = 58,3 \text{ كجم.}$$

$$(أ) (هـ) المتوسط الحسابي \bar{s} = \frac{2550}{10} = 255$$

(ب)

$\bar{s} - s^2$	$\bar{s} - s$	القيمة s
٢٥	٥-	٢٥٠
١٠٠	١٠-	٢٤٥
٢٥	٥	٢٦٠
٠	٠	٢٥٥
٢٢٥	١٥-	٢٤٠
١٠٠	١٠	٢٦٥
١٠٠	١٠	٢٦٥
٤٠٠	٢٠-	٢٣٥
٢٢٥	١٥	٢٧٠
١٠٠	١٠	٢٦٥
١٣٠٠		
المجموع		

$$\text{م} = \frac{1300}{10} = 130, \text{م} \approx 130$$

الانحراف المعياري: $s = \sqrt{130} \approx 11,4$ دينارًا.

$$(3) \quad \bar{Q}_3 + \bar{Q}_2 + \bar{Q}_1 = 25$$

$$(4) \quad 7776 \times 6 = 46656$$

$$(5) \quad 125970 = 120 \times 1049$$

$$(ج) \frac{62}{127}$$

$$(ب) \frac{91}{127}$$

$$(أ) \frac{86}{127}$$

$$\frac{1}{16} \quad (7) \quad (أ)$$

(ب)

$$(ج) \quad \frac{1}{8} = \frac{1}{16} \times 2$$

(8) (أ) نستخدم الحروف التالية: خ للتعبير عن اللون الأخضر، ص للتعبير عن اللون الأصفر، ح للتعبير عن اللون الأحمر، ت للتعبير عن التوقف، ت للتعبير عن عدم التوقف أي المرور.

من معطيات المسألة نكتب: $L(T|X) = 0.02$, $L(T|S) = 0.65$

$$L(T|H) = 0.97, \text{ وكذلك } L(X) = 0.06, L(S) = 0.01, L(H) = 0.03$$

$$L(T) = L(T \cap X) + L(T \cap S) + L(T \cap H) = 0.02 + 0.01 + 0.06 = 0.1368$$

$$(ب) \quad L(H|T) = \frac{L(H \cap T)}{L(T)}$$

$$\text{لدينا } L(H \cap T) = 0.009 = 0.03 \times 0.03$$

$$L(T) = 1 - L(\bar{T}) = 1 - 0.1368 = 0.8632$$

$$\text{وبالتالي: } L(\bar{H}|T) = \frac{0.009}{0.1368} = \frac{9}{1368}$$

$$\frac{1}{144} = \frac{1}{10} \cdot 0.0648 \quad (9)$$

$$\frac{7}{9} \quad (10)$$

(11) ليكن ز الحدث: «مواطن مصاب بالزكام»؛ ليكن ط الحدث: «مواطن تلقى لقاحاً».

$$\text{من خلال معطيات المسألة: } L(Z) = \frac{1}{4}, L(\bar{Z}) = \frac{3}{4}; L(\bar{T}|Z) = \frac{1}{10}$$

$$L(Z|\bar{T}) = \frac{L(Z \cap \bar{T})}{L(\bar{T})} = \frac{L(Z) \times L(\bar{T})}{L(\bar{T})}$$

$$\frac{3}{40} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{10}}{\frac{1}{3}} =$$

ملاحظات