كراسة التمارين

في تجربة إلقاء قطعة نقود متماثلة ثلاث مرات متتالية ، أوجد مجموعة القيم للمتغيرات العشوائية التالية ، وحدد فيما إذا كانت متغيرات عشوائية متقطعة أم لا

(أ) المتغير العشوائي سـ الذي يمثل عدد الكتابات

(ب) المتغير العشوائي صـ الذي يمثل ربع عدد الكتابات

(جـ) المتغير العشوائي ع الذي يمثل عدد الكتابات مضافاً له ١

(د) المتغير العشوائي ك الذي يمثل ضعف عدد الكتابات ؟

الحل ...

* فضاء العينة (ف) =

{ (ص ، ص ، ص) ، (ص ، ص ، ك) ، (ص ، ك ، ص) ، (ك ، ص ، ص) ، (ص ، ك ، ك) ، (ك ، ص ، ك) ، (ك ، ك ، ص) ، (ك ، ك ، ك) }

ص ك ك ، ص ك ص ، ص ص ك ، ك ك ك ، ك ك ص ، ك ص ك ، ص ك ك ، ص ص ص

(أ) المتغير العشوائي سـ الذي يمثل عدد الكتابات

عناصر فضاء العينة (ن)	عناصر مدى المتغير العشوائي سـ
(ص ، ص ، ص)	٠
(ص ، ص ، ك)	١
(ص ، ك ، ص)	١
(ص ، ك ، ك)	٢
(ك ، ص ، ص)	١
(ك ، ص ، ك)	٢
(ك ، ك ، ص)	٢
(ك ، ك ، ك)	٣

∴ مدى المتغير العشوائي سـ = { ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ }

نوع المتغير العشوائي : متقطع .

إعداد : وليد دخيل صباح
مدرس رياضيات
٩٦٠٦٤٩٧٩

إحياء صف ثاني عشر أدبي ـ الفصل الثاني

(كراسة التمارين)

#

Scanned with CamScanner

(ب) المتغير العشوائي ص الذي يمثل ربع عدد الكتابات الملك

عناصر فضاء العينة (ف)	عناصر مدى المتغير العشوائي ص
(ص، ص، ص)	$\frac{1}{4} \times 0 = 0$
(ص، ص، ك)	$\frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$
(ص، ك، ص)	$\frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$
(ص، ك، ك)	$\frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$
(ك، ص، ص)	$\frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$
(ك، ص، ك)	$\frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$
(ك، ك، ص)	$\frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$
(ك، ك، ك)	$\frac{1}{4} \times 3 = \frac{3}{4}$

∴ مدى المتغير العشوائي ص = $\{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\}$

نوع المتغير العشوائي : متقطع.

(جـ) المتغير العشوائي ع الذي يمثل عدد الكتابات مضافاً له ١

عناصر فضاء العينة (ف)	عناصر مدى المتغير العشوائي ع
(ص، ص، ص)	١ + ٠ = ١
(ص، ص، ك)	١ + ١ = ٢
(ص، ك، ص)	١ + ١ = ٢
(ص، ك، ك)	١ + ٢ = ٣
(ك، ص، ص)	١ + ١ = ٢
(ك، ص، ك)	١ + ٢ = ٣
(ك، ك، ص)	١ + ٢ = ٣
(ك، ك، ك)	١ + ٣ = ٤

∴ مدى المتغير العشوائي ص = {١، ٢، ٣، ٤}

* نوع المتغير العشوائي ص : متقطع.

Scanned with CamScanner

(ي) المتغير العشوائي ك الذي يمثل مجموع عدد الكتابات ؟

الحل

عناصر فضاء العينة (ف)	عناصر مدى المتغير العشوائي ك
(ص، ص، ص)	٠ = ٠ × ٢
(ص، ص، ك)	٢ = ١ × ٢
(ص، ك، ص)	٢ = ١ × ٢
(ص، ك، ك)	٤ = ٢ × ٢
(ك، ص، ص)	٢ = ١ × ٢
(ك، ص، ك)	٤ = ٢ × ٢
(ك، ك، ص)	٤ = ٢ × ٢
(ك، ك، ك)	٦ = ٣ × ٢

∴ مدى المتغير العشوائي ك = {٠، ٢، ٤، ٦}

نوع المتغير العشوائي ك : متقطع.

وليد وطفي صبار
٩٦٠٦٤٩٧٩
مدرس رياضيات

إصدار ١٢ أدبي
فصل ثاني
(كراسة التمارين)

Scanned with CamScanner

في تجربة إلقاء قطعة نقود متماثلة مرتين متتاليتين ، إذا كان المتغير العشوائي س
يعبر عن عدد الصور فأوجد

(أ) فضاء العينة (ف)

(ب) مدى المتغير العشوائي س

(ج) احتمال وقوع كل عنصر من عناصر فضاء العينة ف

د (س = ر) = ل (س = ر)

(د) دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي س

الحل

(أ) فضاء العينة (ف) = { (ص ، ص) ، (ص ، ك) ، (ك ، ص) ، (ك ، ك) }

(ب) مدى المتغير العشوائي س = (عدد الصور)

عناصر فضاء العينة (ن)	مدى المتغير العشوائي س
(ص ، ص)	٢
(ص ، ك)	١
(ك ، ص)	١
(ك ، ك)	٠

* مدى المتغير العشوائي س = { ٠ ، ١ ، ٢ }

(ج) احتمال وقوع كل عنصر من عناصر فضاء العينة (ف)

د (٠) = ل (س = ٠) = $\frac{١}{٤}$ * د (١) = ل (س = ١) = $\frac{٢}{٤}$

د (٢) = ل (س = ٢) = $\frac{١}{٤}$

(د) دالة التوزيع الاحتمالي د :

س	٠	١	٢
د (س)	$\frac{١}{٤}$	$\frac{٢}{٤}$	$\frac{١}{٤}$

وليد وهيل
٩٦٠٦٤٩٧٩
إحصاء صف ١٢ أدبي لفصل الثاني
(دراسة التجارية)

Scanned with CamScanner

إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي س هي

س	-١	٠	١	٢	٣
د(س)	أ	٢ب	ك	٢أ	٣ب

فأوجد قيمة ك ؟

الحل

∵ د(-١) + د(٠) + د(١) + د(٢) + د(٣) = ١

أ + ٣ب + ك + ٢أ + ٣ب = ١

٩ب + ك = ١

ك = ١ - ٩ب

ك = ١ب

وليد وهبي
٩٦٠٦٤٩٧٩
مدرس رياضيات

اعداد صف ١٢ أدبي لمفضل الشامي
(كراسة التمارين)

*

Scanned with CamScanner

إذا كان س متغيراً عشوائياً متقطعاً مداه صفر: {١، ٢، ٣، ٤}

وكان د(١) = ١ر ، د(٢) = ٤ر ، د(٤) = ؟ ر

فأوجد د(٣) ثم اكتب دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي س

الحل

∵ د(١) + د(٢) + د(٣) + د(٤) = ١

١ر + د(٢) + ٤ر + ٢ر = ١

٧ر + د(٢) = ١

د(٢) = ١ - ٧ر

د(٢) = ٣ر

دالة التوزيع الاحتمالي د:

س	١	٢	٣	٤
د(س)	١ر	٣ر	٤ر	٢ر

وليد وفيق صبار

مدرس رياضيات

٩٦٠٦٤٩٧٩

احصاء صف ١٢ أدبي

الفصل الثاني

(دراسة التجارين)


Scanned with CamScanner

صندوق يحوي ١٠ كرات متماثلة منها ٦ كرات حمراء، ٤ كرات بيضاء سحبت ٥ كرات عشوائياً معاً من الصندوق. إذا كان المتغير العشوائي س يمثل عدد الكرات البيضاء المأخوذة فأوجد ما يلي (أ) عدد عناصر فضاء العينة ن(ف)

(ب) مدى المتغير العشوائي س.

(ج) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي س.

(د) دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي س.



(أ) عدد عناصر فضاء العينة ن(ف)

$= {}^{10}\text{ق}_4 = 210$

(ب) مدى المتغير العشوائي = {٠، ١، ٢، ٣، ٤}

(ج) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي س:

$$د(٠) = ل(س = ٠) = \frac{{}^{6}\text{ق}_4 \times {}^{4}\text{ق}_0}{{}^{10}\text{ق}_4} = \frac{15}{210}$$

$$د(١) = ل(س = ١) = \frac{{}^{6}\text{ق}_3 \times {}^{4}\text{ق}_1}{{}^{10}\text{ق}_4} = \frac{80}{210}$$

$$د(٢) = ل(س = ٢) = \frac{{}^{6}\text{ق}_2 \times {}^{4}\text{ق}_2}{{}^{10}\text{ق}_4} = \frac{90}{210}$$

$$د(٣) = ل(س = ٣) = \frac{{}^{6}\text{ق}_1 \times {}^{4}\text{ق}_3}{{}^{10}\text{ق}_4} = \frac{24}{210}$$

$$د(٤) = ل(س = ٤) = \frac{{}^{6}\text{ق}_0 \times {}^{4}\text{ق}_4}{{}^{10}\text{ق}_4} = \frac{1}{210}$$

(د) دالة التوزيع الاحتمالي د:

س	٠	١	٢	٣	٤	المجموع
د(س)	$\frac{15}{210}$	$\frac{80}{210}$	$\frac{90}{210}$	$\frac{24}{210}$	$\frac{1}{210}$	١

وليد رضيل
٩٦٠٦٤٩٧٩
صف ١١ أدبي / رضيل مازن
كراسة التمارين

Scanned with CamScanner

إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي سـ ص :

س	٠	١	٢	٣
د(س)	٢ر	٣ر	٤ر	١ر

فأوجد التوقع م للمتغير العشوائي سـ .

الحل

التوقع م = ∑ س د(س)

= ٠ × ٢ر + ١ × ٣ر + ٢ × ٤ر + ٣ × ١ر

∴ التوقع م = ١٫٤

#

وليد وهبي
٩٦٠٦٤٩٧٩
مدرس رياضيات

إحصاء صف ١٢ أدبي وفصل ٨ ثاني
كراسة التمارين

Scanned with CamScanner

٤ بطاقات متماثلة مرقمة بالأرقام ١، ٢، ٣، ٤ وضعت في كيس، سحبت البطاقة عشوائياً ثم إذا كان س = الرقم المدون على البطاقة المسحوبة من الكيس - فأوجد

(أ) فضاء العينة (ف)

(ب) مدى المتغير العشوائي س.

(ج) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي س.

(د) دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي المتقطع س.

(هـ) التوقع ∧ للمتغير العشوائي س

الحل

(أ) فضاء العينة (ف) = {١، ٢، ٣، ٤}

(ب) مدى المتغير العشوائي س = {١، ٢، ٣، ٤}

(ج) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي س

د(١) = ل(س = ١) = $\frac{١}{٤}$

د(٢) = ل(س = ٢) = $\frac{١}{٤}$

د(٣) = ل(س = ٣) = $\frac{١}{٤}$

د(٤) = ل(س = ٤) = $\frac{١}{٤}$

(د) دالة التوزيع الاحتمالي

س	١	٢	٣	٤
د(س)	$\frac{١}{٤}$	$\frac{١}{٤}$	$\frac{١}{٤}$	$\frac{١}{٤}$

(هـ) التوقع :

التوقع (∧) = مجـ س . د(س)

= ١ × $\frac{١}{٤}$ + ٢ × $\frac{١}{٤}$ + ٣ × $\frac{١}{٤}$ + ٤ × $\frac{١}{٤}$

التوقع ∧ = $\frac{١٠}{٤}$ = $\frac{٥}{٢}$ = ٢,٥

وليد رضيل
٩٦٠٦٤٩٧٩

Scanned with CamScanner

الجدول التالى يمثل دالة التوزيع الاحتمالى لمتغير عشوائى متقطع س.

س	٧	٨	٩	١٠
د(س)	$\frac{١}{٨}$	$\frac{٣}{٨}$	$\frac{٣}{٨}$	$\frac{١}{٨}$

أوجد (أ) التوقع م (ب) التباين $ك^{٢}$ (ج) الانحراف المعيارى (ك)

الحل

(أ) التوقع م = $\sum$ س . د(س)

$= ٧ \times \frac{١}{٨} + ٨ \times \frac{٣}{٨} + ٩ \times \frac{٣}{٨} + ١٠ \times \frac{١}{٨} = \frac{١٧}{٢} = ٨,٥$

(ب) التباين $(ك^{٢})$ = $\sum س^{٢}$. د(س) - $م^{٢}$

$= ٧^{٢} \times \frac{١}{٨} + (٨)^{٢} \times \frac{٣}{٨} + (٩)^{٢} \times \frac{٣}{٨} + (١٠)^{٢} \times \frac{١}{٨} - (٨,٥)^{٢}$

التباين $(ك^{٢})$ = ٠,٧٥

(ج) الانحراف المعيارى ك = $\sqrt{\text{التباين}}$ = $\sqrt{٠,٧٥}$ = ٠,٨٧

محمد رضا
٩٦٠٦٤٩٧٩
مدرس رياضيات

اعداد صف ثانى عشر أدبى
الفصل الثانى
(كراسة التمارين)

Scanned with CamScanner